

ТАБАКОКУРЕНИЕ





Список стран по потреблению сигарет на душу населения

Позиция	Страна	Количество сигарет на взрослого человека в год
1	Греция	3017
2	Словения	2537
3	Украина	2526
4	Болгария	2437
5	Чехия	2368
6	Македония	2336
7	Россия	2319
8	Молдова	2239
9	Испания	2225
10	Босния и Герцеговина	2145

Статистика в Беларуси

- ▣ Курит 32,2%, из них:
 - ▣ Постоянно курит 22,9%
 - ▣ От случая к случаю 9,3%
 - ▣ Курили ранее , но бросили 13,3%

- ▣ В Беларуси курят примерно 64% мужчин и 20% женщин.

Соотношение курящих к некурящим в различных слоях населения

- ▣ Временно не работающие 57,8%
- ▣ Рабочие промышленности, транспорта, строительства 55,5%
- ▣ Предприниматели 51,1%
- ▣ Рабочие сельского хозяйства 37,2%
- ▣ Домохозяйки 12,7%
- ▣ Неработающие пенсионеры 12,7%

Причины курения школьников



- ▣ 1. Курят друзья 20%
- ▣ 2. Снять стресс 12,1%
- ▣ 3. Это круто 10,1%
- ▣ 4. Хочу быть взрослым 10,1%
- ▣ 5. Нравится 8,6%
- ▣ 6. Сигареты доступны 7,5%
- ▣ 7. Скучно 7,3%
- ▣ 8. Потому что запрещают 5,5%
- ▣ 9. Назло взрослым 5,3%
- ▣ 10. Родители курят 4,8%
- ▣ 11. По «телику» все курят 4,6%
- ▣ 12. Из-за рекламы 3,7%

Курение как социальная проблема



Пассивное курение



- ❑ Риск смерти от сердечного приступа некурящих, проживающих с курящими, увеличивается до 30%.
- ❑ Пассивное курение у детей приводит к увеличению заболеваний астмы, бронхита, ушных инфекций и синдрома внезапной смерти.

Смертность от курения в РБ


- Ежегодно из-за курения в Беларуси умирают 15,5 тыс. человек, в том числе 15 тыс. мужчин и 500 женщин. Для сравнения: в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно в Беларуси гибнет около двух тысяч человек.
- Средняя потеря продолжительности жизни курящих белорусов для всех возрастов составляет 18 лет, а для возрастной группы 35—69 лет — 21 год.
- Как утверждают медики, курение является одной из самых частых причин смерти, которую человек в силах предотвратить. В мире ежегодно болезни, вызванные употреблением табака, уносят около 3 млн. жизней. Только в странах Европы умирает примерно 1,2 млн. человек. Это 14% всех смертей в регионе.

Последствия от курения



Атеросклероз

- ▣ Атеросклероз(сужение мелких сосудов, повышение давления, аневризма).



Эмфизема легких

□ .



Рак

■ легкого 90%

■ полости рта 92%


■ гортани 84%

■ пищевода 78%


■ почек 48%

■ мочевого пузыря 47%

■ поджелудочная железа, желудок, шейка матки 29%



Рак легких




Рак полости рта



Рак печени



Рак почек



Рак шейки матки



Кариес, гингивит



WARNING:

SMOKING CAUSES MOUTH DISEASES
QUIT: 1800-438-2000

Забеливание табачного синдрома плода



Бесплодие

- Бесплодие — в биологии — потеря растениями и животными способности размножаться половым путем.
- Бесплодие (лат. Sterilitas) — в медицине — неспособность лица репродуктивного возраста к воспроизводству потомства.
- Супружескую пару считают бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни (половые контакты не реже 1 раза в неделю) без использования средств и методов контрацепции. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения «...около 8 % супружеских пар в течение репродуктивного периода жизни сталкиваются с проблемой бесплодия». У человека различают абсолютное бесплодие, предопределённое неизлечимыми изменениями в половом аппарате мужчины или женщины (дефекты развития, оперативное удаление половых желёз, травмы и ин), и относительное, причины которого могут быть устранены. Бесплодие называют первичным, если беременности никогда не было, и вторичным, если раньше у женщины была хотя бы одна беременность, чем бы она не закончилась (родами, внематочной беременностью, выкидышем и т.д.). Бесплодие бывает как и женское, так и мужское.

Выкидыши и преждевременные роды



И многие другие заболевания



Профилактика курения



