**Добро пожаловать
в «Физику атома
и атомных явлений»!**

Тема 1 Введение в дисциплину

Цель: Общее знакомство с физикой атома и атомных явлений и структурой дисциплины

- 1. Цели и предмет дисциплины*
- 2. Историческая справка*
- 3. Модели атома в доквантовой теории*
- 4. Трудности классической и становление квантовой физики*

1. Цели и предмет дисциплины

Атомная физика – раздел физики, в котором изучают строение и свойства атомов и элементарные процессы, протекающие на атомном уровне.

Предмет атомной физики – изучение физических явлений, происходящих на атомно-молекулярном уровне, моделей строения атомов, ионов и молекул, объяснение их основных свойств (оптических, химических и т.д.) – как в отсутствие, так и при наличии внешних полей.

Целью курса является изучение теоретических и экспериментальных основ атомной физики и их применение для решения конкретных физических задач, относящихся к данной дисциплине.

Задачи атомной физики

- анализ развития атомистических и становления квантовых представлений;
- изучение важнейших экспериментальных фактов атомной физики и их взаимосвязи;
- выявление специфики микроявлений и несостоятельности классической теории для их объяснения;
- изучение основ квантовой механики и методов решения квантово-механических задач;
- систематическое изучение и объяснение на основе квантовой теории строения и свойств атомов и молекул, их поведения во внешних полях и во взаимодействии друг с другом

Задачи атомной физики

В физике атома и атомных явлений изучают:

- *строение атома как квантовой системы, состоящей из ядра и электронов;*
- *структуру энергетических уровней атомов и их характеристики;*
- *излучательные и безызлучательные квантовые переходы в атоме;*
- *атомные столкновения;*
- *электрические и магнитные свойства атомов и влияние на них внешних полей*

Чёткой границы между атомной физикой и другими разделами физики не существует, и в соответствии с международной классификацией, атомная физика включена в область атомной, молекулярной физики и оптики

Задачи атомной физики

Прямые

Теоретическое и экспериментальное изучение:

- строения атома как квантовой системы;
- структуры энергетических уровней атомов и их характеристик;
- излучательных и безызлучательных квантовых переходов в атоме;
- атомных столкновений;
- электрических и магнитных свойств атомов ;
- влияния внешних полей на свойства атомов;
- изучение строения и свойств молекул.

Обратные

На основе экспериментальных данных о спектрах атомных систем:

- идентифицировать вещество;
- установить его структуру;
- получить информацию о наличии или отсутствии магнитных полей у космических объектов и т.п.

Тема 1 Введение в дисциплину

Объекты атомной физики

Характерные параметры типичных объектов атомной физики

Расстояния	$\sim 10^{-10}$ м (порядка размеров атома)
Энергии связи, характерные энергии элементарных процессов	порядка нескольких электрон-вольт
$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$	

Тема 1 Введение в дисциплину

Физика твёрдого тела

Ядерная физика

Физика
элементарных частиц

Химия

Физика наноструктурных
материалов

Другие области науки

Квантовая механика как раздел
теоретической физики

Физика атома – фундамент для ряда других наук

Полезно повторить

**Начиная
изучать
ФА, нужно
знать**

Основы ньютоновой и
элементы релятивистской
механики

Распределение
Максвелла и Больцмана

Законы сохранения
энергии, импульса,
момента импульса

Электрический и
магнитный момент
частицы и системы

Механизм и
закономерности
столкновения частиц

Дифракция и
интерференция волн

Высшая математика
и теория функций

Представления о
квантовых явлениях

И не
только
это...

**Занятия: лекций 58(42 + 16 УСР) практических 48,
физпрактикум 56; 6 тестов; 2 КР + 1 ДКР; 2 зачета, экзамен**
Основные учебные пособия:

- 1. Годлевская, А.Н. Физика атома и атомных явлений : учеб. пособие / А.Н. Годлевская, В.Г. Шолох; под ред. А.А. Сокольского. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 307 с.**
- 2. Годлевская, А.Н. Физика атомов и атомных явлений : практич. пособие для студентов физич. специальностей вузов / А.Н. Годлевская, В.Г. Шолох. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – 111 с.**
- 3. Годлевская, А.Н. Физика атомов и атомных явлений : Развитие квантовых представлений: практическое пособие для студентов специальностей 1-31 04 01 «Физика (по направлениям) / А. Н. Годлевская, В. Г. Шолох; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 48 с.**
- 4. Годлевская, А.Н. Физика атомов и атомных явлений : Квантовые модели и экспериментальные основы спектроскопии в атомной физике : практическое пособие для студентов специальностей 1-31 04 01 «Физика (по направлениям) / А. Н. Годлевская, В. Г. Шолох; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 48 с.**
- 5. Годлевская, А.Н. Физика атомов и атомных явлений : Состояния и спектры многоэлектронных атомов и молекул : практическое пособие для студентов специальностей 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)» / А. Н. Годлевская, В. Г. Шолох; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 41 с.**

2. Историческая справка

Древний мир

Демокрит, Эпикур: «Атом – неделимая частица»

Начало XIX века

Дж. Дальтон (англ.), А. Авогадро (итал.), Я. Барцелиус (шв.):
«Атом – мельчайшая частица химического элемента»

Середина XIX века

С. Канницаро (итал.): «Атом не тождественен молекуле»

1833 – 1834 гг.

М. Фарадей (англ.): открытие законов электролиза, установление дискретности электрического заряда

Атом имеет сложное строение

1869 **Д.И. Менделеев (русск.)** –
Создание периодической
системы элементов

1895 **К. Рентген (нем.)** –
Открытие рентгеновских лучей

1896 **А. Беккерель (фр.)** –
Открытие радиоактивности

1897 **Дж. Дж. Томсон (англ.)** –
Открытие электрона, определение
его заряда и удельного заряда
(с учениками)

1909 **А. Милликен (амер.),
А.Ф. Иоффе (Россия)** – Определение
удельного заряда электрона

1920 **Ф. Содди, Дж. Томсон,
Ф. Астон (все – англ.)** –
Открытие изотопов

Э. Резерфорд (англ.) – 1913 –
Открытие ядер водорода;
1920 – ввёл понятие «протон»

1930 **Дж. Чедвик (англ.)** –
Открытие нейтрона

1932 **В.К. Гейзенберг
(нем.), Д.Д. Иваненко
(СССР)** – Уточнение
состава атомного ядра

3. Модели атома в доквантовой теории

Дж.Дж. Томсон
(1856 - 1940)

Э. Резерфорд
(1871 - 1931)

Н. Бор
(1885 - 1962)

1911
Модель Резерфорда

1913
Модель Бора

1904
Модель Томсона

Модель атома Томсона

Джозеф Джон Томсон
1856 – 1940
Нобелевская премия
по физике, 1906

В положительно заряженной материи атома электроны колеблются около положений равновесия. Их колебания сопровождаются излучением электромагнитных волн.

На основе модели удалось :

- *оценить размер атома;*
- *объяснить линейчатый характер атомных спектров;*
- *объяснить дисперсию света*

Недостатки модели:

- *гипотетическая;*
- *только качественная;*
- не удалось объяснить:*
 - *закономерности в спектрах атомов и молекул;*
 - *факт существования атома*

Модель атома Резерфорда

*Э. Резерфорд
(1871 - 1931)
Нобелевская
премия по химии,
1908*

На основе ядерной модели атома Резерфорда (1911):

- дано объяснение опытов Резерфорда;*
- описана структура атома;*
- создана модель атома Бора*

Модель несостоятельна при объяснении:

- стабильности атомов;*
- линейчатого характера атомарных спектров*

4. Трудности классической и становление квантовой физики

Закон теплового излучения Кирхгофа (1859)

Густав Кирхгоф
(Gustav Robert
Kirchhoff)
1824 – 1887

$$\frac{E_\lambda}{A_\lambda} = I_\lambda = \frac{c}{8\pi} \cdot \rho_\lambda$$

Т.к. I_λ и ρ_λ не зависят от природы тела, то отношение E_λ/A_λ является универсальной функцией температуры T и длины волны излучения λ (или частоты ν)

E_λ – излучательная способность тела (энергия, излучаемая с единицы площади поверхности за единицу времени);

A_λ – поглощательная способность тела (доля всей падающей на тело энергии, которая остаётся внутри тела и превращается в тепло);

I_λ – поверхностная яркость тела, находящегося в равновесии с излучением;

ρ_λ – спектральная плотность равновесного излучения

Трудности классической и становление квантовой физики

Для АЧТ $A_\lambda = 1$ и $E_\lambda = I_\lambda$.
 Если в условиях равновесного излучения для АЧТ известна излучательная способность E_λ , то можно найти универсальную функцию ρ_λ

$$\rho_\lambda = \frac{8\pi}{c} E_\lambda$$

Условия, близкие к ТДР, реализуются в условиях, когда излучающее тело (например, внутренние слои звезды) окружено сильно непрозрачным слоем газа (атмосферой звезды)

Спектр излучения АЧТ зависит только от температуры

Трудности классической и становление квантовой физики

Джон Стретт
(лорд Рэлей)
1842 – 1919

Джеймс Джинс
1877 – 1946

Макс Планк
1858–1947
(Нобелевская премия
по физике 1918)

$$\varepsilon = h\nu$$

$$\rho_\nu = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

$$\rho_\lambda = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/kT\lambda} - 1}$$

$$\rho_\lambda d\lambda = \frac{8\pi kT}{\lambda^4} d\lambda$$

$$\rho_\nu = C_1 \nu^3 \exp(-C_2 \nu/T)$$

Вильгельм Вин
1864 – 1928
Нобелевская премия по
физике, 1911

a – формула Рэля – Джинса; *б* – формула Вина;
в – экспериментальное распределение;
г – формула Планка

**Распределение спектральной плотности
энергии равновесного излучения**

Модель атома Бора

В **1913** году в «трилогии»
On the Constitution of Atoms and
Molecules (Part 1, 2)
сформулировал квантовые
постулаты и предложил теорию
строения атома

1922 – Нобелевская премия
по физике «за заслуги в исследовании
строения атомов и испускаемого ими
излучения»

Нильс Бор (Niels Bohr)
1885–1962

Модель атома Бора

Предпосылки для её создания:

- квантовая гипотеза Планка (1900);
- фотонная теория света Эйнштейна (1905);
- обнаружение в спектре атома водорода серий Бальмера (1885), Лаймана (1906), Пашена (1909);
- ядерная модель атома Резерфорда (1911);
- квантовые постулаты Бора (1913)

- Атомы могут длительное время, не испуская и не поглощая энергии, находиться в определенных *стационарных состояниях*; соответствующие этим состояниям значения энергии $E_1, E_2, E_3, \dots$ образуют *дискретный спектр*.
- Испускание или поглощение атомом электромагнитного излучения происходит при переходе атома из одного стационарного состояния в другое. Частота этого излучения равна

$$\nu = \frac{|E_n - E_k|}{h}$$

Атом имеет сложное строение

1869 **Д.И. Менделеев (русск.)** –
Создание периодической
системы элементов

1895 **К. Рентген (нем.)** –
Открытие рентгеновских лучей

1896 **А. Беккерель (фр.)** –
Открытие радиоактивности

1897 **Дж. Дж. Томсон (англ.)** –
Открытие электрона, определение
его заряда и удельного заряда
(с учениками)

1909 **А. Милликен (амер.),
А.Ф. Иоффе (Россия)** – Определение
удельного заряда электрона

1920 **Ф. Содди, Дж. Томсон ,
Ф. Астон (все – англ.)** –
Открытие изотопов

Э. Резерфорд (англ.) – 1913 –
Открытие ядер водорода;
1920 – ввёл понятие «протон»

1930 **Дж. Чедвик (англ.)** –
Открытие нейтрона

1932 **В.К. Гейзенберг
(нем.), Д.Д. Иваненко
(СССР)** – Уточнение
состава атомного ядра

Строение атома

Ядро состоит из протонов и нейтронов

(протон открыт Э. Резерфордом, 1913;
нейтрон открыт Дж. Чедвиком, 1932)

Электронная оболочка состоит из электронов, движущихся в электрическом поле ядра.

Состояние электронов в атоме описывается с использованием методов квантовой механики. Изменение состояния атома может произойти, например, в результате поглощения или испускания фотона или при столкновении с другим микрообъектом.

*Число протонов в ядре –
зарядовое число Z –
равно числу электронов в атоме
и порядковому номеру элемента
в периодической системе
элементов Д.И. Менделеева.*

*Число нуклонов в ядре равно
относительной атомной массе A
химического элемента.*

Элементарные структурные составляющие атома

Электрон

Стабильная элементарная частица

Электрический заряд

$$q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Масса покоя

$$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$$

Удельный заряд

$$e/m = 1,76 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Фермион; спиновое квантовое число

$$s = \frac{1}{2}$$

Проекция спинового момента S_z

$$= \pm \hbar/2$$

Модуль магнитного момента примерно равен магнетону Бора

$$\mu_e \approx -\mu_B \approx$$

$$\approx -0,579 \cdot 10^{-4} \text{ эВ/Тл}$$

Имеет античастицу – позитрон (e^+)

Протон

Стабильная элементарная частица

Электрический заряд

$$q_p = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Масса покоя

$$m_p \approx 1836m_e \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$$

Фермион; спиновое квантовое число

$$s = \frac{1}{2}$$

Модуль магнитного

$$\mu_p \approx 8,803 \cdot 10^{-8} \text{ эВ/Тл}$$

Входит в состав ядра атома

Имеет античастицу – антипротон (p^-)

Нейтрон

Элементарная частица

Время жизни

в свободном состоянии

$$\tau \approx 886 \text{ с}$$

Электрический заряд $q_n = 0$

Масса покоя

$$m_n \approx 1839m_e \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$$

Фермион; спиновое квантовое число

$$s = \frac{1}{2}$$

Модуль магнитного

$$\mu_n \approx -6,030 \cdot 10^{-8} \text{ эВ/Тл}$$

Входит в состав ядра атома

Имеет античастицу – антинейтрон

30 апреля 1897 г. –
день рождения электрона

Общее название протонов и
нейтронов – нуклоны

ФОТОН

Энергия $\varepsilon = h\nu = hc / \lambda = mc^2$

Импульс $|\vec{p}| = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = mc$

Масса $m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$; *масса покоя равна нулю*

Заряд равен нулю

Спин равен $1\hbar$

Проекции спина на направление движения $\pm 1\hbar$

Ельяшевич, М.А.

**От возникновения квантовых
представлений до становления
квантовой механики /**

М.А. Ельяшевич. // УФН. – 1977.

– Т. 122. – Вып. 4. – С. 673 – 717.

Литература для самоподготовки

1. Годлевская, А.Н. Физика атома и атомных явлений : учеб. пособие / А.Н. Годлевская, В.Г. Шолох; под ред. А.А. Сокольского. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 07 с.
2. Сивухин , Д.В. Общий курс физики: Атомная и ядерная физика / Д.В. Сивухин. – Т. V, ч. I. – М.: Наука, 1986. – 416 с.
3. Матвеев, А.Н. Атомная физика: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н. Матвеев. – М.: Высш. шк., 1989. – 439 с.
4. Шпольский, Э.В. Атомная физика. В 2 т. – Т.1. Введение в атомную физику / Э.В. Шпольский. – М.: Наука, 1974. – 575 с.
5. Добрецов, Л.Н. Атомная физика : учебное пособие для втузов / Л.Н. Добрецов. – М.: Физматгиз, 1960. – 348 с.
6. Ельяшевич, М.А. От возникновения квантовых представлений до становления квантовой механики / М.А. Ельяшевич. // УФН. – 1977. – Т. 122. – Вып. 4. – С. 673 – 717.

Вопросы для самопроверки

Тема 1

1. Каково место физики атома и атомных явлений среди других разделов физики?
2. Каковы объекты изучения физики атома и атомных явлений?
3. Каковы цель и задачи физики атома и атомных явлений?
4. Каковы основные исторические этапы развития представлений о структуре и свойствах атома?
5. В чем сущность моделей атома Дж. Дж. Томсона и Э. Резерфорда? Каково значение этих моделей в физике? Каковы их главные недостатки?
6. Какие основные затруднения классической физики и какие научные открытия конца XIX – начала XX века обусловили создание квантовой механики?
7. Какие представления были положены Н. Бором в основу предложенной им модели атома?
8. Каково содержание постулатов Бора?
9. Каковы основные свойства электрона, протона, нейтрона и фотона?

*Желаю успехов в изучении
физики атома
и атомных явлений!*