

МЕХАНИЗМ БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ИОНАХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТЕКЛАХ И КРИСТАЛЛАХ

Е. Б. Свешникова, Н. Т. Тимофеев, А. О. Иванов, С. Г. Луитер
и Ю. К. Федоров

УДК 535.373.2 : 548.0

Сопоставлены предсказания индуктивно-резонансной теории безызлучательных переходов с экспериментальными данными о константах скоростей безызлучательных переходов (k_6) в ионах РЗЭ для фосфатных стекол и кристаллов, а также для кристаллов ортоалюмината иттрия, иттриево-алюминиевого граната и окиси иттрия. Расчет в диполь-дипольном приближении и при предположении о чисто электронной природе перехода в ионе РЗЭ дает правильный порядок величин k_6 в четырех из пяти исследованных переходов в ионах РЗЭ в фосфатных стеклах и кристаллах. Учет квадруполь-дипольного приближения не устраняет наблюдающиеся отклонения предсказаний теории от экспериментальных данных. Показано, что учет вибронного крыла спектров люминесценции Er^{3+} и Ho^{3+} в ортоалюминате иттрия позволяет в рамках индуктивно-резонансной теории предсказывать экспериментальные величины k_6 с точностью до порядка. Сделан вывод, что для расчета k_6 ионов РЗЭ по индуктивно-резонансной теории модель взаимодействия чисто электронного перехода в ионе с обертонами высокочастотных колебаний основы пригодна лишь для систем с предельной частотой колебательного кванта, большей 900 см^{-1} . Для основ с низкой ангармоничностью и предельной частотой колебательного кванта меньшей 900 см^{-1} расчет k_6 по индуктивно-резонансной теории дает приличное согласие с экспериментом лишь при учете закона спада вибронного крыла спектра люминесценции иона.

Большинство теорий безызлучательных переходов использует оператор неадиабатичности в качестве возмущения, вызывающего безызлучательный переход [1, 2].

В размене электронной энергии возбужденного иона с наибольшей вероятностью участвуют высокочастотные колебания основы. Если предположить, что адиабатический потенциал, соответствующий высокочастотным колебаниям, не зависит от состояния возбужденного иона, и эти колебания не участвуют в формировании вибронного спектра и в достаточной степени локализованы, то безызлучательный переход можно рассматривать как перенос энергии от вибронного осциллятора к обертонам и составным частотам высокочастотных колебаний основы [3]. Если при разложении оператора электронно-колебательного взаимодействия по мультиполям можно ограничиться дипольным приближением, то вероятность безызлучательного перехода k_6 легко может быть рассчитана по известной формуле Ферстера для переноса энергии. Такой подход был успешно применен в [4, 5] для количественного расчета k_6 в ионах редкоземельных элементов (РЗЭ) и переходных металлов (ПМ) в растворах [6] и для РЗЭ [7]. Причем оказалось, что в растворах учет вибронного взаимодействия при расчете k_6 необходим для систем со средней силой вибронной связи [6] и не существен в случае слабой вибронной связи [4]. В последнем случае в силу большой ангармоничности высокочастотных колебаний растворителя вклад вибронной части спектра люминесценции иона в интеграл перекрытия спектра люминесценции иона и спектра поглощения колебаний растворителя мал. Учет вибронного взаимодействия в ионе становится необходимым для правильного расчета k_6 в системах, где крутизна спада интенсивности люминесценции в зависимости от частоты в области вибронных повторений сравнима или

меньше, чем крутизна спада коэффициента поглощения обертонов колебаний окружения. В системах со слабой вибронной связью ошибка при расчете k_6 по индуктивно-резонансному механизму в модели разделенных колебаний и без учета вибронной связи в ионе должна возрастать по мере уменьшения ангармоничности и частоты наиболее высокочастотных колебаний основы. Из-за отсутствия данных о законе спада интенсивности вибронного крыла люминесценции ионов в разных основах при расчете k_6 ионов РЗЭ в диполь-дипольном и квадруполь-дипольном приближении мы вынуждены будем ограничиться чисто электронным приближением и рассмотрим возможности применения этого приближения к кристаллам, частоты наиболее высокочастотных колебаний которых варьируются в несколько раз.

В данной работе теория индуктивно-резонансного переноса энергии использована для расчета вероятностей безызлучательных переходов в активированных ионами РЗЭ фосфатных стеклах состава $\text{Ba}(\text{PO}_3)_2$, кристаллах YAlO_3 , $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ и Y_2O_3 .

Методика

Фосфатные стекла $\text{Ba}(\text{PO}_3)_2$, активированные ионами Pr^{3+} (0.45 мол %), Er^{3+} (0.45 мол %) и Ho^{3+} (0.11 мол %) были обезвожены в процессе варки тридцатиминутной продувкой аргоном. Контроль за концентрацией оставшейся воды осуществлялся по спектру ИК-поглощения стекла в области первого обертона. Концентрация была снижена до величин, не влияющих на $\tau_{\text{люм}}$ исследуемых образцов. Об этом свидетельствует тот факт, что $\tau_{\text{люм}}$ уровней $^4S_{3/2}$ и $^4I_{11/2}$ Er^{3+} в наших образцах, в осушенных фосфатных стеклах несколько другого состава [8] и в фосфатных кристаллах [9] близки (табл. 1). Переход $^4I_{11/2}$ —

Таблица 1

Сравнение экспериментальных величин вероятностей безызлучательных переходов в ионах РЗЭ в фосфатном стекле $\text{Ba}(\text{PO}_3)_2$ и кристалле YPO_4 [7] с величинами, рассчитанными в диполь-дипольном и квадруполь-дипольном приближении

Электронный переход	ΔE , см ⁻¹ стекло	$A_{\text{изл}}^d$, с ⁻¹	$A_{\text{изл}}^q$, с ⁻¹	$k_6^d \cdot 10^{-5}$, с ⁻¹	$k_6^q \cdot 10^{-5}$, с ⁻¹	$k_6^{\text{эксп}} \cdot 10^{-5}$, с ⁻¹ стекло ^a	$k_6^{\text{эксп}} \cdot 10^{-5}$, с ⁻¹ кристалл ^b
$\text{Pr}^{3+} ({}^3P_0 - {}^1D_2)$	3850	1.0	$7 \cdot 10^{-6}$	0.12	60	35 28*	14
$\text{Er}^{3+} ({}^4I_{11/2} - {}^4I_{13/2})$	3870	18	$5 \cdot 10^{-7}$	4.1	10	9.0 10 [6]	2.0
$\text{Er}^{3+} ({}^4S_{3/2} - {}^4F_{9/2})$	3030	0.5	—	1.1	—	15 26 [6]	13
$\text{Ho}^{3+} ({}^5S_2, {}^5F_4 - {}^5F_5)$	2960	9.0	$3 \cdot 10^{-6}$	26	1000	100 45*	23
$\text{Ho}^{3+} ({}^5F_5 - {}^5I_4)$	2500	8.0 ^в	$7 \cdot 10^{-10}$	600	7.0	60	—

Примечание. ^a Звездочкой отмечены величины, полученные при 77 К. Остальные величины k_6 в стекле измерены при 300 К. ^b Все значения k_6 в кристалле взяты из [7], где они были измерены при 4.2 К. ^в Величина $A_{\text{изл}}^d$ этого перехода в стекле принята равной $A_{\text{изл}}^d$ в YAlO_3 [19].

$^4I_{13/2}$ в ионе Er^{3+} особо чувствителен к следам воды [10] из-за хорошего резонанса этого перехода с поглощением основного тона ОН-колебаний, поэтому нечувствительность этого перехода к остаточной воде в нашем стекле позволяет утверждать, что и для других переходов в исследуемых ионах нами получены надежные данные о влиянии основы на $\tau_{\text{люм}}$ ионов. Орто-алюминаты иттрия, активированные ионами Er^{3+} (0.5 и 1 ат %), были выращены по методу Чохральского. $\tau_{\text{люм}}$ Ho^{3+} и Er^{3+} измерялось при возбуждении второй гармоникой неодимового лазера ЛТИПЧ-6, регистрация затухания люминесценции осуществлялась с помощью ФЭУ-83 и осциллографа С8-12, $\tau_{\text{люм}}$ уровня 3P_0 иона Pr^{3+} в фосфатном стекле было измерено методом однофотонного счета люминесценции на установке, описанной в [11].¹ Во всех исследованных системах

¹ Мы благодарны И. П. Котляру за предоставленную нам возможность провести это измерение.

$\tau_{\text{люм}} \approx 1/k_6$. Согласно [8], в области используемых концентраций ионов нет необходимости рассматривать влияние межионного взаимодействия на $\tau_{\text{люм}}$ ионов. При расчете величины k_6 по формуле Ферстера или аналогичной ей формуле Галанина—Франка (1) необходимо знать спектр поглощения основы в области частот безызлучательного электронного перехода и спектр люминесценции, соответствующий этому переходу. Спектры поглощения основы были измерены в ИК области на спектрофотометрах Spesord-751R и Cary-17 в наборах образцов разной толщины (рис. 1). Поглощение кристалла YAlO_3 измерено в образцах толщиной от 0.02 до 4.7 см. Для анизотропного кристалла YAlO_3 поглощение было измерено в двух доступных для измерения в наших образцах направлениях (перпендикулярно и параллельно оси роста кристалла). Существенных различий в величинах коэффициента поглощения основы в этих двух направлениях не отмечается.

Для большей полноты картины исследование безызлучательных переходов в ионах РЗЭ, введенных в кристалл YAlO_3 , было дополнено эксперименталь-




Рис. 1. Спектры многофононного поглощения исследуемых основ при 293 К.
а — кристалл YAlO_3 , б — стекло $\text{Ba}(\text{PO}_3)_2$.

Рис. 2. Сопоставление зависимости от энергетической щели между ближайшими уровнями константы безызлучательного перехода в ионах РЗЭ в кристаллах Y_2O_3 (а) и интеграла перекрытия спектра люминесценции иона и спектра поглощения основы (б).

ными данными о безызлучательных переходах в ионах РЗЭ в кристаллах $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ [12] и Y_2O_3 [13]. Расчет ионов РЗЭ в этих матрицах проводился на основе данных об их спектрах поглощения [14, 15]. При этом спектр поглощения кристаллов в области частот, больших удвоенной частоты высокочастотного колебания основы (рис. 1), прилично описывается линейной зависимостью $\lg \alpha$ от частоты, что позволяет аппроксимировать спектр в область, недоступную для измерения в образцах имеющейся толщины. Для расчета безызлучательной вероятности электронного перехода необходимо знать величину соответствующей излучательной вероятности $A_{\text{изл}}^d$. $A_{\text{изл}}^d$ для электрических дипольных переходов были рассчитаны на основании теории Джадда—Оффельта [16, 17]. При расчете использовались спектры поглощения ионов РЗЭ в исследуемых образцах, измеренные на спектрофотометре Cary-17, а также величины матричные элементы $U^{(\lambda)}$ для Er^{3+} [18], Ho^{3+} [19], Eu^{3+} [20], Pr^{3+} [21] и феноменологические параметры Джадда, рассчитанные для некоторых ионов в кристаллах YAlO_3 [22] и фосфатных стеклах [23]. Форма полосы люминесценции $I_{\text{н}}(\nu)$ исследуемого электронного перехода аппроксимировалась в стеклах равнобедренным треугольником, а в кристаллах — прямоугольником с шириной основания, равной при низкой температуре величине штарковского расщепления нижнего уровня.

Результаты и их обсуждение

Мы провели сопоставление экспериментальных данных о k_0 ионов РЗЭ в фосфатном стекле и $YAlO_3$ и расчета k_0 по теории переноса энергии на колебания среды в диполь-дипольном и квадруполь-дипольном приближении при предположении о чисто электронной природе перехода в доноре.

В диполь-дипольном приближении k_0 было рассчитано по формуле Галанина—Франка, аналогичной формуле Ферстера и описывающей затухание диполя в непрерывной поглощающей среде

$$k_0 = \frac{A_{изл}^d}{16\pi^4 n^4 a^3} \int I^n(\tilde{\nu}) \alpha(\tilde{\nu}) \tilde{\nu}^{-4} d\tilde{\nu}, \quad (1)$$

где $a=2.5 \text{ \AA}$ — радиус начальной непоглощающей сферы, равный расстоянию РЗЭ—кислород, $\alpha(\tilde{\nu})$ — линейный коэффициент поглощения среды в области электронного перехода, $I^n(\tilde{\nu})$ — нормированный спектр люминесценции, соответствующий безызлучательному электронному переходу. Результаты этих вычислений приведены в табл. 1 и 2. Согласно [24], соотношение констант пере-

Таблица 2

Сравнение экспериментальных величин вероятностей безызлучательных переходов в ионах РЗЭ в кристалле $YAlO_3$ с рассчитанными по теории переноса энергии в диполь-дипольном $k_0^{dd}(\text{эл})$ и квадруполь-дипольном $k_0^{qd}(\text{эл})$ приближении при предположении об отсутствии вибронного взаимодействия в ионе и в диполь-дипольном приближении с учетом вибронной структуры спектров люминесценции ионов $k_0^{dd}(\text{вибр})$

Электронный переход	$\Delta E, \text{ см}^{-1}$	$A_{изл}^d, \text{ с}^{-1}$	$A_{изл}^q, \text{ с}^{-1}$	$k_0^{dd}(\text{вибр}), \text{ с}^{-1}$	$k_0^{qd}(\text{эл}), \text{ с}^{-1}$	$k_0^{dd}(\text{эл}), \text{ с}^{-1}$	$k_0^{\text{эксп}}, \text{ с}^{-1}$
$\text{Ho}^{3+} ({}^5F_5 - {}^5I_4)$	2150	8.5	$6.0 \cdot 10^{-10}$	$3.3 \cdot 10^6$	$5.5 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^3$	$3.3 \cdot 10^5$
$\text{Eu}^{3+} ({}^5D_2 - {}^5D_1)$	2450	8.7	$2.0 \cdot 10^{-7}$	—	$5.0 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^4$	$4 \cdot 10^4$
$\text{Er}^{3+} ({}^4F_{9/2} - {}^4I_{9/2})$	2600	1.4	$1.4 \cdot 10^{-6}$	$1.6 \cdot 10^4$	$1.5 \cdot 10^2$	$2 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^4$
$\text{Er}^{3+} ({}^4S_{3/2} - {}^4F_{9/2})$	3000	0.8	—	$9.0 \cdot 10^2$	4.0	—	$4 \cdot 10^3$
$\text{Ho}^{3+} ({}^5I_6 - {}^5I_7)$	3250	49	$3.0 \cdot 10^{-7}$	$5.1 \cdot 10^3$	45	30	$1.8 \cdot 10^3$
$\text{Er}^{3+} ({}^4I_{11/2} - {}^4I_{13/2})$	3500	25	$1.1 \cdot 10^{-6}$	62	4.0	16	$6 \cdot 10^2$

Примечание. * Для Ho^{3+} и Eu^{3+} величины $k_0^{\text{эксп}}$ взяты из [29].

носа энергии по диполь-дипольному (dd) и квадруполь-дипольному (qd) механизму приближенно описывается формулой

$$k_0^{qd} \approx \frac{A_{изл}^q k_0^{dd}}{A_{изл}^d a^2 \tilde{\nu}^2}, \quad (2)$$

где $A_{изл}^q$ — излучательная вероятность соответствующего квадрупольного перехода, рассчитанная по формуле [25, 26]

$$A_{изл}^q = \frac{8\pi^2 e^2}{mc} \tilde{\nu}^5 n (n^2 + 2) \frac{1}{2J' + 1} T_2^{(1)} \langle \psi_{J'} \| U^{(2)} \| \psi_J \rangle^2, \quad (3)$$

где

$$T_2' = \frac{112}{225} \frac{\pi^3}{\beta} a_0^3 \langle f | r^2 / a_0^3 | f \rangle^2.$$

В этих формулах a_0 — боровский радиус, β — константа тонкой структуры ($1/\beta=137$), величины радиальных интегралов $\langle r^2/a_0^2 \rangle$ взяты из [25], $\langle U^{(2)} \rangle$ — матричные элементы единичных тензорных операторов [18–21], J' — полный момент возбужденного состояния иона. Результаты вычислений по формулам (2) и (3) приведены в табл. 1 и 2.

Наблюдаемая близость величин k_0 ионов Pr^{3+} , Er^{3+} и Ho^{3+} в фосфатных стеклах и кристаллах [9] вполне оправдана с позиций механизма переноса энергии для переходов в области обертонов высокочастотных колебаний $P=O$

групп (т. е. для $\Delta E > 2200 \text{ см}^{-1}$), поскольку переход к кристаллической матрице не приводит к значительным изменениям спектра основы [27, 28], происходит лишь структуризация полос поглощения в этой области. Для четырех из пяти исследованных переходов (табл. 1) dd приближение дает приличное согласие с экспериментом. Согласно результатам расчета и эксперимента с точностью до порядка следует признать удовлетворительным, учитывая низкую точность расчета $A_{изл}^d$ слабых переходов в первом приближении по методу Джадда—Офельта и ошибки, вызванные нашим незнанием истинной формы полосы люминесценции перехода. К систематическому занижению k_6^{dd} в 2—3 раза должен вести выбор радиуса начальной сферы равным длине связи ион РЗЭ—кислород, поскольку ближайшие колебательные осцилляторы находятся непосредственно на границе этой сферы, а не размазаны равномерно, как предполагает модель непрерывной среды. Ранее [5, 7] было показано, что dd приближение правильно, с точностью до порядка описывает величины k_6 в ионах Er^{3+} и Nd^{3+} в боратных, силикатных и германатных стеклах. Таким образом, независимо от агрегатного состояния в системах, обладающих частотой высокочастотных колебаний 1000 см^{-1} и больше, при расчете k_6 ионов РЗЭ в подавляющем большинстве случаев разумным оказывается приближение о взаимодействии чисто электронного дипольного перехода в ионе с диполем колебаний среды.

Рассмотрим теперь три кристалла (YAlO_3 , $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$, Y_2O_3), в которых предельная частота колебаний варьируется в области 550—750 см^{-1} . Измеренные величины $\tau_{\text{люм}}^4S_{3/2}$ и $^4I_{11/2}$ уровней Er^{3+} в YAlO_3 совпали с данными Вебера [29], $\tau_{\text{люм}}^{\text{Eu}^{3+}}$ и Ho^{3+} взяты из той же работы. Из табл. 2 видно, что оба мультипольных механизма плохо предсказывают величины $k_6^{\text{расч}}$ ионов РЗЭ в YAlO_3 , причем расхождение результатов расчета и эксперимента растет по мере роста ΔE . Эта тенденция становится еще более заметной для кристалла Y_2O_3 (рис. 2), если сравнить в полулогарифмическом масштабе зависимость от ΔE $k_6^{\text{расч}}$ и интеграла перекрытия спектров (экстраполированные величины $\alpha(\nu)$ кристалла Y_2O_3 взяты из [15]). Расчет k_6^{dd} для перехода $^4S_{3/2} \rightarrow ^4F_{9/2}$ в ионе Er^{3+} в $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ на основе данных о спектре поглощения этого кристалла [14] и $A_{изл}^d$ перехода $^4S_{3/2} \rightarrow ^4F_{9/2}$ в YAlO_3 также дал значение k_6 , заниженное по сравнению с экспериментальным [12] на 2 порядка. Таким образом, во всех трех кристаллах нарушается пропорциональность величин k_6 и интеграла перекрытия спектра люминесценции бесфононной линии перехода в ионе РЗЭ со спектром поглощения матрицы.

Следует отметить, что обе наблюдавшиеся нами тенденции в поведении $k_6^{\text{расч}}$ (ухудшение согласия с экспериментом по мере уменьшения частоты наиболее высокочастотного оптического фонона в ряду кристаллов и по мере роста энергетического зазора между уровнями для данного кристалла) прекрасно объясняются при предположении, что вибранный спектр вносит существенный вклад в интеграл перекрытия.

О необходимости учета вибронного крыла спектра люминесценции ионов РЗЭ в YAlO_3 свидетельствует наблюдавшаяся нами тенденция к более медленному спадающему интенсивности вибронного крыла в спектрах люминесценции и спектрах возбуждения люминесценции ионов Er^{3+} и Ho^{3+} в этой основе по сравнению со спектром поглощения самой основы. В нашей следующей статье будет подробно обсужден способ расчета k_6 ионов РЗЭ в YAlO_3 с учетом экстраполированного в многофононную область вибронного крыла их спектров люминесценции. В табл. 2 приведены результаты этих расчетов для ионов Er^{3+} и Ho^{3+} . Как видно из таблицы, такой способ расчета дает согласие с экспериментом в пределах порядка. Подводя итог изложенному, можно сказать, что индуктивно-резонансная теория безызлучательных переходов позволяет предсказывать порядок величин k_6 ионов РЗЭ в основах с любой предельной частотой высокочастотного кванта. Однако модель взаимодействия с колебаниями основы чисто электронного перехода в ионе пригодна лишь для основ с сильно локализованными высокочастотными колебаниями с $h\nu_{\text{кол}} \geq 900 \text{ см}^{-1}$. Для кристаллов с $h\nu_{\text{кол}} \leq 750 \text{ см}^{-1}$ расчет k_6 требует учета взаимодействия вибронного перехода в ионе с колебаниями основы.

В заключение мы хотим поблагодарить В. Л. Ермолаева, стимулировавшего постановку этой работы.

Литература

- [1] Ю. Е. Перлин. УФН, 80, 553, 1963.
- [2] Т. Миукава, D. L. Dexter. Phys. Rev., 81, 2961, 1970.
- [3] В. Л. Ермолаев, Е. Н. Бодунов, Е. Б. Свешникова, Т. А. Шахвердов. Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. Наука, Л., 1977.
- [4] Е. Б. Свешникова, С. П. Наумов, Т. А. Шахвердов. Опт. и спектр., 42, 920, 1977.
- [5] Е. Б. Свешникова, Н. Т. Тимофеев, В. М. Злотарев. Изв. АН СССР, сер. физ., 44, 722, 1980.
- [6] V. L. Ermolaev, E. B. Sveshnikova. J. Luminesc., 20, 387, 1979.
- [7] V. L. Ermolaev, E. B. Sveshnikova. In: Ultrafast relaxation and secondary emission, 169. Tallin, 1978.
- [8] C. B. Laune, W. H. Lowdermilk, M. J. Weber. Phys. Rev. B, 16, 10, 1977.
- [9] E. D. Reed, H. W. Moos. Phys. Rev. B, 8, 980, 1973.
- [10] Н. Т. Тимофеев, Е. Б. Свешникова. Опт. и спектр., 51, 833, 1981.
- [11] В. Л. Ермолаев, И. П. Котляр, З. Н. Тураева, Т. А. Шахвердов. ЖПС, 32, 869, 1980.
- [12] Г. М. Зверев, Г. Я. Колодный, А. М. Онщенко. ЖЭТФ, 60, 920, 1971.
- [13] M. J. Weber. Phys. Rev., 171, 283, 1968.
- [14] G. A. Slack, D. W. Oliver, R. M. Chrenko, S. Roberts. Phys. Rev., 177, 1308, 1969.
- [15] J. A. Harrington, G. Greskovich. J. Appl. Phys., 48, 1584, 1977.
- [16] B. R. Judd. Phys. Rev., 127, 750, 1962.
- [17] G. S. Ofelt. J. Chem. Phys., 37, 511, 1962.
- [18] M. J. Weber. Phys. Rev., 157, 262, 1967.
- [19] M. J. Weber, B. Matsinger, V. L. Donlan, G. T. Jurrat. J. Chem. Phys., 57, 562, 1972.
- [20] H. M. Crosswhite. Optical properties of ions in crystals, N. Y., 1967.
- [21] P. Rappalardo. J. Luminesc., 14, 159, 1976.
- [22] M. J. Weber, T. E. Varitimos, B. Matsinger. Phys. Rev. B, 8, 47, 1973.
- [23] R. Reisfeld. Structure and bonding, 22, 123, 1975.
- [24] В. М. Агранович, М. Д. Галанин. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. Наука, М., 1978.
- [25] C. K. Jørgenson, B. R. Judd. Mol. Phys., 8, 281, 1964.
- [26] М. А. Ельяшевич. Спектры редких земель. Изд. тех. теор. лит., М., 1953.
- [27] A. J. Freeman, R. E. Watson. Phys. Rev., 127, 2058, 1962.
- [28] А. М. Морозов, Л. Г. Морозова, А. К. Трофимов, П. П. Феофилов. Опт. и спектр., 39, 1106, 1970.
- [29] M. J. Weber. Phys. Rev. B, 8, 54, 1973.

Поступило в Редакцию 13 октября 1980 г.