

А. В. Васильев

Науч. рук. А. С. Соколов,

ст. преподаватель

ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В БЕЛАРУСИ В 2000–2021 ГОДАХ

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией является не только острой медико-социальной проблемой, но и одним из индикаторов развития здравоохранения и уровня социального благополучия в стране в целом. На рисунке 1 отражена двадцатилетняя динамика этого показателя. До 2012 г. он демонстрировал относительно медленный рост, затем начал

резко повышаться, причём заметно увеличилась разница между заболеваемостью мужчин и женщин. С 2017 г. началось интенсивное его падение с сокращением межполовых различий, но в 2021 г. вновь наметился рост.




Рисунок 1 – Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2020–2022 гг., человек на 100 000 человек населения

Если рассматривать изменение возрастной структуры первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией, то можно отметить её заметное «постарение». Так, если среди всего населения с впервые выставленным диагнозом в 2000 г. 16,2 % составляли лица от 15 до 19 лет, 67,4 % – от 20 до 29 лет, 14,9 % – от 30 до 39 лет и всего 0,8 % – 40 лет и старше, то в 2021 г. лица от 15 до 19 лет составили всего 4,2 % от всех заболевших впервые, от 20 до 29 лет – 28,1 %, а максимальная доли приходится на возраст 30–39 лет – 47,2 %. Также огромный рост данный показатель показывает в возрасте 40 лет и старше – его значение выросло до 19,8 %. Причём подобное изменение возрастной структуры показывает приблизительно одинаковую тенденцию и для мужчин, и для женщин.