

В. В. КОВАЛЬСКИЙ, С. В. ЛЕТУНОВА, Р. Д. АЛТЫНБАЕВА

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К СЕЛЕНУ И ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕНРЕДУКТАЗЫ У *BACILLUS MEGATERIUM*

(Представлено академиком А. А. Имшенецким 21 I 1970)

При изучении геохимической экологии почвенных микроорганизмов установлена характерная приспособляемость их к определенным концентрациям в почве микроэлементов Co, Cu, Mo, V, U, B, Se (¹⁻³).

Получение информации о генетической природе процессов приспособления представляется важной экологической задачей.

Целью данного исследования была попытка генетической трансформации у *Bac. megaterium* признака устойчивости к высокому содержанию селена в среде и образования селенредуктазы.

Методика. Исследования проводились с двумя штаммами *Bac. megaterium*. Штамм 8, изолированный из почвы с высоким содержанием Se ($4,9 \cdot 10^{-5}\%$, Тувинская АССР), приспособлен к избытку Se в естественной среде обитания. Предельная концентрация этого элемента для роста 500 мг/л, оптимальная — в пределах от 10 до 100 мкг/л. Штамм 101, выделенный из почвы с низким содержанием Se ($1,2 \cdot 10^{-6}\%$, Московская обл.) и адаптированный к этой концентрации, растет при предельной концентрации 180 мг/л с оптимумом роста при 5 мкг/л. Известно, что микроорганизмы обладают способностью с помощью фермента селенредуктазы восстанавливать растворимые соединения Se до нерастворимого элементного состояния (^{3, 4}).

Ранее нами было показано, что штамм 8, выращенный на среде Чапека без добавления Se, при последующем инкубировании с селенитом восстанавливает его. Редуцирующая способность возрастает по мере увеличения содержания Se в среде. Таким образом, у штамма 8 селенредуктаза обнаруживается постоянно, независимо от наличия селена в питательной среде, и, по-видимому, является конститутивным ферментом. Очевидно, штамм 8 приспособился к избытку Se в почве путем его восстановления до элементарного состояния.

У штамма 101, выделенного из почвы, бедной селеном, селенредуктаза появляется только при выращивании на среде с добавлением Se и является адаптивным индуцируемым ферментом.

Таким образом, два штамма *Bac. megaterium*, изолированные из почв с различным содержанием селена, характеризуются неодинаковыми устойчивостью к селену и активностью селенредуктазы. Представляло интерес трансформировать эти признаки у штамма 101 (реципиент) путем прибавления к среде ДНК, выделенной из штамма 8 (донор). Выделение трансформационной ДНК проводилось по методу Кирби в модификации Георгиева (⁵). Культура выращивалась 18 час. на МПБ, после чего центрифугировалась при 3 тыс. об/мин. в течение 20 мин. Клетки, промытые на холоде раствором 0,1 М NaCl и 0,01 М лимоннокислого натрия в фосфатном буфере, лизировались яичным лизоцимом в течение 20 мин. при 37°. Для разрушения протопластов применялся дюпанол (конечная концентрация 1%). Депротеинизация проводилась смесью водонасыщенного фенола (рН 8) и хлороформа (2:1), осаждение ДНК — абсолютным этиловым спиртом. Очи-

шенная ДНК растворялась в 0,015 М NaCl. Хранился раствор ДНК в 2 М NaCl при -4° . Концентрация ДНК определялась по Бартону (⁶).

Компетентные клетки получали по методу, описанному Прозоровым (⁷). Вместо среды Спидайзена нами применялась среда Чапека. Штамм-реципиент выращивался 18 час. на косяке Чапека. Затем налет смывался 10 мл этой среды, суспензия переносилась в стерильную коническую колбу на 250 мл и прогревалась в водяной бане при 37° 10 мин. Культура выращивалась при аэрации в течение 4 час., после чего разводилась в 10 раз свежей средой Чапека, к которой добавляли Se 0,5 мг/л. После прогрева при 37° 10 мин. культура снова выращивалась 90 мин., затем смешивались одинаковые объемы компетентных клеток и раствора трансформационной ДНК (5 μ г/мл) и инкубировались 30 мин. После инкубации добавляли

Таблица 1

Рост *Bacillus megaterium* (число колоний) при различном содержании селена в питательной среде Чапека

№№ штаммов <i>Bac. megaterium</i>	№№ опытов	При 0 мг/л	При 180 мг/л	При 200 мг/л	При 500 мг/л
8	1	++++	++++	++++	36
	2	++++	++++	++++	20
	3	++++	++++	++++	5
101	1	++++	57	0	0
	2	++++	17	0	0
	3	++++	41	0	0

Примечание. +++ — сплошной рост.

раствор ДНКазы (конечная концентрация 150 μ г/мл) для разрушения ДНК, не проникшей в клетки. Полученная суспензия высевалась на среду Чапека с добавлением Se 0; 100; 160; 180; 200 мг/л. Бактерии выращивались 3 суток при 28° .

Трансформанты подсчитывались на среде с добавлением Se 200 мг/л, так как при этой концентрации штамм-реципиент не растет. Подсчет общего числа клеток проводился из этой же суспензии на среде Чапека без добавления селена (при разведениях: 1/10; 1/100; 1/1000; 1/10000), а также методом прямого счета в камере Тома.

Культуры трансформантов отсеивались в пробирки со скошенной агаризованной средой Чапека. Для проверки селенредуктазной активности донор, реципиент и трансформанты выращивались 5 суток при 25° на жидкой среде Чапека без добавления Se. Затем по методу Фальконе и Никерсона (⁴) определялась их редуцирующая способность при различных концентрациях селена в инкубационной смеси (0; 2; 10; 20; 100; 200; 1000 μ г/мл) (*). В опытах по трансформации очень важны контроли. В наших опытах постоянно контролировали стерильность ДНК (высев ДНК без добавления клеток реципиента), а также присутствие загрязнений и клеток ревертантов в культуре реципиента (высев клеток из культуры реципиента без добавления ДНК).

Результаты. В начале работы были определены концентрации селена, при которых возможен рост исследованных штаммов *Bac. megaterium* (табл. 1). Из табл. 1 видно, что штамм 8, выделенный из почвы, обогащенной селеном (Тувинская АССР), способен расти при предельной концентрации селена в среде 500 мг/л, в то время как штамм 101, изолированный из почвы с низким содержанием селена (Московская обл.), переносит лишь 180 мг/л. При 200 мг/л роста нет, почему в дальнейших исследованиях для подсчета числа трансформантов использовалась жидкая питательная среда Чапека с добавлением Se 200 мг/л.

* Метод основан на определении увеличения оптической плотности за счет восстановления селенита (появление розовой окраски).

Нами была сделана попытка наведения метки устойчивости к Se у штамма 101 с помощью ДНК штамма 8. Известно (⁸, ⁹), что при трансформации устойчивости к бактериоцидным и бактериостатическим веществам следует делать засев суспензии (ДНК + реципиент) на среды для подсчета трансформантов не сразу после обработки ее ДНКазой, а спустя 1,5—2 часа. Поскольку высокие концентрации селена являются для реципиента (штамма 101) бактериоцидными, в первых четырех опытах засев суспензии




Рис. 1. Восстановление селенита *Bacillus megaterium*. 1 — донор (штамм 8), 2—4 — трансформанты (соответственно Т-8, Т-6, Т-5)

проводился через 5 мин. и через 2 часа после обработки ДНКазой. Установлено, что наибольшее число трансформантов появляется после двухчасовой инкубации:

Продолжительность инкубации, мин.	Число трансформантов на одну чашку в четырех опытах
5	183; 432; 330; 213
120	332; 735; 1320; 395

В последующих опытах засев суспензии на агаризованную среду Чапека с добавлением 200 мг селена на литр для подсчета колоний трансформантов проводился через 2 часа после добавления ДНКазы. В табл. 2 представлены данные, иллюстрирующие трансформацию устойчивости к селену.

Из табл. 2 видно, что в наших опытах процент трансформантов (от общего числа клеток) колеблется от 0,05 до 1,08%. Прозоров (⁷) и Парийская (¹⁰) получили у *Bac. subtilis* от 0,05 до 0,08% трансформантов, Мацелюх (¹¹) у актиномицетов — от 0,1 до 0,74%.

Таблица 2

Трансформация устойчивости к селену.

Контроли: ДНК — нет роста на среде Чапека; донор — хороший рост на среде Чапека без селена и с добавлением Se 200 мг/л; реципиент — хороший рост на среде без селена; при содержании Se 200 мг/л рост отсутствует

№№ опытов	Число клеток (в млн/мл)	Число трансформантов (в тыс/мл)	В процентах	№№ опытов	Число клеток (в млн/мл)	Число трансформантов (в тыс/мл)	В процентах
1	3,68	6 640	0,18	7	6,43	15 600	0,24
2	7,28	14 700	0,22	8	4,52	4820	0,10
3	2,43	26 400	1,08	9	4,06	3500	0,08
4	5,96	7 900	0,13	10	7,09	4000	0,05
5	7,10	19 300	0,27	11	4,01	5750	0,14
6	4,63	21 000	0,45	12	4,40	6400	0,14

Таким образом, нам удалось получить культуры трансформантов, устойчивые к высокому содержанию селена в среде (200 мг/л). Трансформанты отсевались на косяки Чапека. Представляло интерес изучить их способность синтезировать селенредуктазу на среде без добавления селена.

На рис. 1 представлены данные по определению редуцирующей способности у донора и трансформантов. Реципиент (штамм 101), выращенный на среде Чапека без селена, при последующем инкубировании с селенитом

не восстанавливает его. У донора (штамм 8) при этих же условиях обнаруживается селенредуктаза. Трансформанты, подобно донору, обладают селенредуктазной активностью, хотя и в меньшей степени, чем донор.

Интересно отметить, что при трансформации возникают трансформанты с различной степенью выраженности наведенного свойства. У трансформанта Т-8 максимальная D_{50} (при содержании Se в инкубационной смеси 20 мкг/мл) равна 0,09, тогда как у трансформанта Т-5 — лишь 0,03. Селенредуктазная активность сохранялась в течение длительного времени (к настоящему времени они пересевались уже 50 раз) (табл. 3).

Таким образом показано, что в основе регуляции приспособленности *Bac. megaterium* к экстремальным геохимическим факторам среды — повышенному содержанию селена в почве — и образования селенредуктазы лежат генетические особенности организма.

Биогеохимическая лаборатория
Института геохимии и аналитической химии
им. В. И. Вернадского
Академии наук СССР
Москва

Поступило
16 XII 1969

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ В. В. Ковальский, С. В. Летунова, Усп. совр. биол., 57, в. 1 (1964).
- ² В. В. Ковальский, С. В. Летунова, Агрохимия, № 7 (1966).
- ³ С. В. Летунова, В. В. Ковальский, В. В. Ермаков, Тр. биогеохимич. лаб., 12 (1968).
- ⁴ G. Falcone, W. J. Nickerson, J. Bacteriol., 85, 4 (1963).
- ⁵ Г. П. Георгиев, Биохимия, 24, 472 (1959).
- ⁶ R. Burton, Biochem. J., 62, 315 (1956).
- ⁷ А. А. Прозоров, Генетическая трансформация у микроорганизмов, М., 1966.
- ⁸ V. I. Iyut, J. Bacteriol., 84, 326 (1962).
- ⁹ I. Stuy, D. Stern, J. Gen. Microbiol., 35, 391 (1964).
- ¹⁰ А. Н. Парийская, Микробиология, 36, в. 2, 222 (1967).
- ¹¹ Б. П. Мачедон, Трансформация у актиномицетов с помощью ДНК, Кандидатская диссертация, Киев, 1963.