

КОНЕЧНЫЕ ГРУППЫ С ОБОБЩЕННО
СУБНОРМАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЕМ
СИЛОВСКИХ ПОДГРУПП

А. Ф. Васильев,
Т. И. Васильева, А. С. Вегера

Аннотация. Для множества простых чисел π и наследственной насыщенной формации \mathfrak{F} изучены свойства класса групп G , у которых единичная подгруппа и все силовские p -подгруппы \mathfrak{F} -субнормальны ($K\text{-}\mathfrak{F}$ -субнормальны) в G для любого p из π . Установлено, что такой класс является наследственной насыщенной формацией, и найден ее максимальный внутренний локальный экран. Получены критерии принадлежности группы наследственной насыщенной формации в терминах ее формационно субнормальных силовских подгрупп.

DOI 10.17377/smzh.2016.57.203

Ключевые слова: конечная группа, силовская подгруппа, формация, наследственная насыщенная формация, \mathfrak{F} -субнормальная подгруппа, $K\text{-}\mathfrak{F}$ -субнормальная подгруппа, локальный экран.

Введение

Рассматриваются только конечные группы. Хорошо известно, что группа нильпотента тогда и только тогда, когда любая ее силовская подгруппа субнормальна в ней. В 1969 г. Хоукс [1] обобщил понятие субнормальности, введя определение \mathfrak{F} -субнормальной подгруппы в разрешимой группе. В 1978 г. Л. А. Шеметков в [2] распространил данное понятие на произвольные конечные группы.

Пусть \mathfrak{F} — непустая формация. Подгруппа H группы G называется \mathfrak{F} -субнормальной в G (обозначается через $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$), если либо $H = G$, либо существует максимальная цепь подгрупп $H = H_0 < H_1 < \dots < H_n = G$ такая, что $H_i^{\mathfrak{F}} \leq H_{i-1}$ для $i = 1, \dots, n$.

В случае, когда \mathfrak{F} совпадает с классом \mathfrak{N} всех нильпотентных групп, всякая \mathfrak{N} -субнормальная подгруппа субнормальна, обратное утверждение в общем случае неверно. Однако в разрешимых группах эти понятия эквивалентны.

Еще одно обобщение субнормальности предложил в 1978 г. Кегель [3], введя понятие \mathfrak{F} -достижимой ($K\text{-}\mathfrak{F}$ -субнормальной согласно [4, разд. 6.1]) подгруппы.

Подгруппа H группы G называется $K\text{-}\mathfrak{F}$ -субнормальной в G (обозначается через $H K\text{-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), если существует цепь подгрупп $H = H_0 \leq H_1 \leq \dots \leq H_n = G$ такая, что либо $H_{i-1} \trianglelefteq H_i$, либо $H_i^{\mathfrak{F}} \leq H_{i-1}$ для $i = 1, \dots, n$.

Отметим, что субнормальная подгруппа $K\text{-}\mathfrak{F}$ -субнормальна в любой группе, обратное утверждение верно не всегда. Для случая $\mathfrak{F} = \mathfrak{N}$ понятия субнормальной и $K\text{-}\mathfrak{N}$ -субнормальной подгрупп эквивалентны.

Свойства \mathfrak{F} -субнормальных и К- \mathfrak{F} -субнормальных подгрупп и их приложения активно изучались в различных направлениях и нашли отражение в многочисленных работах (в частности, в [5–12] и монографиях [4, 13]).

В [5] было начато рассмотрение следующей общей задачи.

Пусть \mathfrak{F} — непустая формация. Изучить влияние \mathfrak{F} -субнормальных (К- \mathfrak{F} -субнормальных) силовских подгрупп на строение всей группы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Для некоторого множества простых чисел π и непустой формации \mathfrak{F} введем классы групп: $W_{\pi}\mathfrak{F}$ — класс всех групп G , у которых 1 \mathfrak{F} -sn G и Q \mathfrak{F} -sn G для любой силовской q -подгруппы Q из G , где $q \in \pi \cap \pi(G)$, $\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$ — класс всех групп G , у которых Q К- \mathfrak{F} -sn G для любой силовской q -подгруппы Q из G , где $q \in \pi \cap \pi(G)$.

По определению $W_{\pi}\mathfrak{F}$ содержит все π' -группы G , у которых 1 \mathfrak{F} -sn G , и $\mathfrak{G}_{\pi'} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$.

В случае, когда $\pi = \mathbb{P}$ — множество всех простых чисел, будем использовать обозначения $W\mathfrak{F}$ и $\overline{W}\mathfrak{F}$ вместо $W_{\mathbb{P}}\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_{\mathbb{P}}\mathfrak{F}$ соответственно.

В [8] исследовался класс всех групп G , у которых $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$ и все силовские подгруппы являются \mathfrak{F} -субнормальными в G . В частности, для наследственной насыщенной формации \mathfrak{F} было доказано, что такой класс групп образует наследственную насыщенную формацию. Также в классе разрешимых групп было установлено ее локальное задание. Легко заметить, что данный класс групп совпадает с $W\mathfrak{F}$.

В [6, 14, 15] аналогичные результаты получены для класса всех групп, у которых все силовские подгруппы группы К- \mathfrak{F} -субнормальны, т. е. для класса групп $\overline{W}\mathfrak{F}$.

В [16, 17] введены определения \mathbb{P} -субнормальной и К- \mathbb{P} -субнормальной подгрупп, которые для формации \mathfrak{U} всех сверхразрешимых групп являются обобщениями понятий \mathfrak{U} -субнормальной и К- \mathfrak{U} -субнормальной подгрупп соответственно.

Подгруппа H группы G называется \mathbb{P} -субнормальной в G , если либо $H = G$, либо существует цепь подгрупп $H = H_0 < H_1 < \dots < H_{n-1} < H_n = G$ такая, что $|H_i : H_{i-1}|$ — простое число для любого $i = 1, \dots, n$.

Подгруппа H группы G называется К- \mathbb{P} -субнормальной в G , если существует цепь подгрупп $H = H_0 \leq H_1 \leq \dots \leq H_{n-1} \leq H_n = G$ такая, что либо H_{i-1} нормальна в H_i , либо $|H_i : H_{i-1}|$ есть простое число для любого $i = 1, \dots, n$.

В любой группе всякая \mathfrak{U} -субнормальная подгруппа \mathbb{P} -субнормальна, а для разрешимых групп имеет место и обратное утверждение. Однако в общем случае оно неверно. Понятие К- \mathbb{P} -субнормальной подгруппы шире, чем понятие \mathbb{P} -субнормальной подгруппы. Каждая К- \mathfrak{U} -субнормальная в G подгруппа К- \mathbb{P} -субнормальная в G . В общем случае обратное утверждение не выполняется. Например, в знакопеременной группе A_5 степени 5 силовская 2-подгруппа К- \mathbb{P} -субнормальная, но не К- \mathfrak{U} -субнормальная. В разрешимой группе понятия \mathfrak{U} -субнормальной, \mathbb{P} -субнормальной, К- \mathbb{P} -субнормальной и К- \mathfrak{U} -субнормальной подгрупп эквивалентны [17, лемма 3.4].

В [16] исследовался класс $w\mathfrak{U}$ всех групп, у которых любая силовская подгруппа \mathbb{P} -субнормальна в G . В частности, было установлено, что $w\mathfrak{U}$ состоит из разрешимых групп, является наследственной насыщенной формацией, и найдено ее локальное задание. Из разрешимости групп из $w\mathfrak{U}$ следует, что $W\mathfrak{U} = w\mathfrak{U} = \overline{W}\mathfrak{U}$.

Важность изучения классов $W\mathfrak{U}$ и $\overline{W}\mathfrak{U}$ подчеркнута работами [16–20], где исследовались их свойства и приложения для изучения произведений групп.

В [17] был рассмотрен класс $\overline{W}_\pi\mathfrak{U}$ всех групп, у которых все силовские p -подгруппы К- \mathbb{P} -субнормальны для p из некоторого множества простых чисел π . В частности, установлены некоторые свойства класса групп $\overline{W}_\pi\mathfrak{U}$ для множества $\pi = \mathbb{P} \setminus \{r\}$, r — простое число. Из отмеченных выше свойств К- \mathfrak{U} -субнормальных и К- \mathbb{P} -субнормальных подгрупп вытекает, что $\overline{W}_\pi\mathfrak{U} \subseteq \overline{W}_\pi\mathfrak{U}$.

В связи с полученными результатами возникает естественная

Проблема 1. Для множества простых чисел π и непустой формации \mathfrak{F} установить свойства и связь классов групп $W_\pi\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_\pi\mathfrak{F}$.

Заметим, что в общем случае $W\mathfrak{F} \neq \mathfrak{F}$. Например, для формации \mathfrak{U} всех сверхразрешимых групп существуют несверхразрешимые группы, у которых все силовские подгруппы \mathfrak{U} -субнормальны (см. пример из [16]). В [9] построены серии наследственных насыщенных формаций \mathfrak{F} , совпадающих с формацией всех групп, у которой все силовские подгруппы К- \mathfrak{F} -субнормальны. В связи с этим возникает

Проблема 2. Найти условия, при которых $W_\pi\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$ и $\overline{W}_\pi\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$.

Настоящая работа посвящена решению проблем 1 и 2.

1. Предварительные сведения

В настоящей работе используются стандартные обозначения и определения. Необходимые сведения из теории групп и теории формаций можно найти в [2, 4, 21].

Через \mathbb{P} обозначается множество всех простых чисел, π — подмножество из \mathbb{P} , $\pi' = \mathbb{P} \setminus \pi$. Пусть G — группа, $p \in \mathbb{P}$. Через $\pi(G)$ обозначается множество всех простых делителей порядка G , $O_p(G)$ — наибольшая нормальная p -подгруппа G , $O_\pi(G)$ — наибольшая нормальная π -подгруппа G , $Syl_p(G)$ — множество всех силовских p -подгрупп G , $F_p(G)$ — p -нильпотентный радикал G , т. е. наибольшая нормальная p -нильпотентная подгруппа G , Z_p — циклическая группа порядка p и 1 — единичная подгруппа.

В следующей лемме собраны известные свойства силовских подгрупп.

Лемма 1.1 [21, гл. А, теорема 6.4]. Пусть G — группа и $p \in \mathbb{P}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) пусть $P \in Syl_p(G)$ и $N \trianglelefteq G$, тогда $P \cap N \in Syl_p(N)$ и $PN/N \in Syl_p(G/N)$;
- 2) если $N_i \trianglelefteq G$, $i = 1, 2$, и $P \in Syl_p(G)$, то $N_1P \cap N_2P = (N_1 \cap N_2)P$;
- 3) пусть $\{p_1, \dots, p_r\}$ — множество всех простых делителей $|G|$ и $P_i \in Syl_{p_i}(G)$ для $i = 1, \dots, r$, тогда $G = \langle P_1, \dots, P_r \rangle$.

Лемма 1.2 [21, гл. А, теорема 9.2 (е)]. Пусть G — группа. Если $N \trianglelefteq G$, то $\Phi(N) \leq \Phi(G)$ и $\Phi(G)N/N \leq \Phi(G/N)$, и если $N \leq \Phi(G)$, то $\Phi(G/N) = \Phi(G)/N$.

Напомним, что *цоколем* группы G называется подгруппа $Soc(G)$, являющаяся произведением всех минимальных нормальных подгрупп группы G .

Через $\tilde{F}(G)$ обозначается такая подгруппа группы G [2, с. 79], что $\Phi(G) \leq \tilde{F}(G)$ и $\tilde{F}(G)/\Phi(G) = Soc(G/\Phi(G))$.

Приведем некоторые свойства подгруппы $\tilde{F}(G)$ [22, 23].

Лемма 1.3. Пусть N — нормальная подгруппа группы G . Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если $N \leq \Phi(G)$, то $\tilde{F}(G/N) = \tilde{F}(G)/N$;
- 2) $\tilde{F}(N) \leq \tilde{F}(G)$;
- 3) $\tilde{F}(G)N/N \leq \tilde{F}(G/N)$;
- 4) $F^*(G) \leq \tilde{F}(G)$.

Лемма 1.4 [2, лемма 3.9]. Если H/K — главный фактор группы G и $p \in \pi(H/K)$, то $G/C_G(H/K)$ не содержит неединичных нормальных p -подгрупп, причем $F_p(G) \leq C_G(H/K)$.

Пусть \mathfrak{X} — некоторый класс групп. Через $\pi(\mathfrak{X})$ обозначается множество всех простых делителей порядков групп, принадлежащих \mathfrak{X} ; \mathfrak{X}_π — класс всех π -групп, принадлежащих \mathfrak{X} ; $\mathfrak{X}_p = \mathfrak{X}_\pi$ для $\pi = \{p\}$.

Будем использовать следующие обозначения: \mathfrak{G} — класс всех групп, \mathfrak{N} — класс всех нильпотентных групп, \mathfrak{A} — класс всех абелевых групп.

Минимальной не \mathfrak{X} -группой называется группа G такая, что $G \notin \mathfrak{X}$, а каждая собственная подгруппа из G принадлежит \mathfrak{X} . Множество всех минимальных не \mathfrak{X} -групп будем обозначать через $\mathcal{M}(\mathfrak{X})$. Минимальная не \mathfrak{N} -группа называется группой Шмидта.

Произведением классов групп \mathfrak{X} и \mathfrak{H} называется класс групп $\mathfrak{X}\mathfrak{H} = (G \mid \text{группа } G \text{ имеет нормальную подгруппу } N \in \mathfrak{X} \text{ такую, что } G/N \in \mathfrak{H})$.

Класс групп \mathfrak{F} называется формацией, если 1) \mathfrak{F} — гомоморф, т. е. из $G \in \mathfrak{F}$ и $N \trianglelefteq G$ следует, что $G/N \in \mathfrak{F}$, и 2) из $N_i \trianglelefteq G$ и $G/N_i \in \mathfrak{F}$ ($i = 1, 2$) вытекает, что $G/N_1 \cap N_2 \in \mathfrak{F}$.

Формация \mathfrak{F} называется насыщенной, если из $G/\Phi(G) \in \mathfrak{F}$ следует, что $G \in \mathfrak{F}$. Формация \mathfrak{F} называется наследственной, если \mathfrak{F} вместе с каждой группой содержит все ее подгруппы. Через $G^{\mathfrak{F}}$ обозначается \mathfrak{F} -корадикал группы G , т. е. наименьшая нормальная подгруппа из G , для которой $G/G^{\mathfrak{F}} \in \mathfrak{F}$.

Функция $f : \mathbb{P} \rightarrow \{\text{формации}\}$ называется локальным экраном. Через $LF(f)$ обозначим класс всех групп G , у которых $G/C_G(H/K) \in f(p)$ для любого главного фактора H/K и каждого $p \in \pi(H/K)$. Формация \mathfrak{F} называется локальной, если существует локальный экран f такой, что $\mathfrak{F} = LF(f)$.

Экран f формации \mathfrak{F} называется внутренним, если $f(p) \subseteq \mathfrak{F}$ для любого простого p . Внутренний экран f формации \mathfrak{F} называется максимальным внутренним, если для любого ее внутреннего экрана h имеет место включение $h(p) \subseteq f(p)$ для любого простого p .

Лемма 1.5 [4, с. 95]. Пусть \mathfrak{F}_1 и \mathfrak{F}_2 — формации, $\pi(\mathfrak{F}_1) = \pi_1$, $\pi(\mathfrak{F}_2) = \pi_2$ и $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$. Тогда $\mathfrak{F}_1 \times \mathfrak{F}_2 = (G \in \mathfrak{G} \mid G = O_{\pi_1}(G) \times O_{\pi_2}(G)$, где $O_{\pi_1}(G) \in \mathfrak{F}_1$ и $O_{\pi_2}(G) \in \mathfrak{F}_2$) — формация. Более того, если \mathfrak{F}_1 и \mathfrak{F}_2 — наследственные насыщенные формации, то $\mathfrak{F}_1 \times \mathfrak{F}_2$ также наследственная насыщенная формация.

Сформулируем лемму 3.12 из [2] для локальных экранов.

Лемма 1.6. Пусть f_1 и f_2 — внутренние локальные экраны формации \mathfrak{F} . Тогда $\mathfrak{N}_p f_1(p) = \mathfrak{N}_p f_2(p)$ для любого простого p .

Лемма 1.7 [2, лемма 4.5]. Пусть f — локальный экран формации \mathfrak{F} . Группа G тогда и только тогда принадлежит \mathfrak{F} , когда $G/F_p(G) \in f(p)$ для любого $p \in \pi(G)$.

Лемма 1.8. Пусть $\mathfrak{F}_i = LF(f_i)$, где f_i — локальный экран формации \mathfrak{F}_i ($i = 1, 2$). Если $f_1(p) \subseteq f_2(p)$ для любого $p \in \mathbb{P}$, то $\mathfrak{F}_1 \subseteq \mathfrak{F}_2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $G \in \mathfrak{F}_1$. Тогда по лемме 1.7 $G/F_p(G) \in f_1(p)$ для любого $p \in \pi(G)$. Так как по условию $f_1(p) \subseteq f_2(p)$, то $G/F_p(G) \in f_2(p)$ для любого $p \in \pi(G)$. Тогда по лемме 1.7 $G \in \mathfrak{F}_2$. \square

Лемма 1.9. Пусть \mathfrak{F} и \mathfrak{X} — наследственные насыщенные формации, $\mathfrak{X} \setminus \mathfrak{F} \neq \emptyset$ и G — группа наименьшего порядка из $\mathfrak{X} \setminus \mathfrak{F}$. Тогда $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$, $\Phi(G) = 1$, G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу N и $N = G^{\mathfrak{F}} = \tilde{F}(G)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из наследственности \mathfrak{X} и выбора G следует, что $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$.

Предположим, что $\Phi(G) \neq 1$. Тогда из $G/\Phi(G) \in \mathfrak{X}$ и $|G/\Phi(G)| < |G|$ заключаем, что $G/\Phi(G) \in \mathfrak{F}$. Из насыщенности \mathfrak{F} вытекает, что $G \in \mathfrak{F}$; противоречие. Итак, $\Phi(G) = 1$.

Пусть N — минимальная нормальная подгруппа группы G . Предположим, что существует минимальная нормальная подгруппа K группы G и $K \neq N$. Тогда $G/N \in \mathfrak{X}$ и $G/K \in \mathfrak{X}$. Из выбора G следует, что $G/N \in \mathfrak{F}$ и $G/K \in \mathfrak{F}$. Так как $N \cap K = 1$ и \mathfrak{F} — формация, заключаем, что $G/(N \cap K) \cong G \in \mathfrak{F}$. Получили противоречие. Итак, G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу N . Отсюда и из $G/N \in \mathfrak{F}$ получаем, что $G^{\mathfrak{F}} = N = \tilde{F}(G)$. \square

2. Свойства обобщенно субнормальных подгрупп

В настоящем разделе приводятся известные свойства \mathfrak{F} -субнормальных и $K\text{-}\mathfrak{F}$ -субнормальных подгрупп. В дальнейшем в работе \mathfrak{F} обозначает непустую формацию.

Лемма 2.1. Пусть \mathfrak{F} — формация, H и K — подгруппы группы G и $N \trianglelefteq G$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), то $HN/N \mathfrak{F}\text{-sn } G/N$ ($HN/N \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G/N$);
- 2) если $N \leq H$ и $H/N \mathfrak{F}\text{-sn } G/N$ ($H/N \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G/N$), то $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$);
- 3) если $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), то $HN \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($HN \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$);
- 4) если $H \mathfrak{F}\text{-sn } K$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } K$) и $K \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($K \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), то $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$);
- 5) если все композиционные факторы G принадлежат \mathfrak{F} , то всякая субнормальная подгруппа G \mathfrak{F} -субнормальна;
- 6) пусть p — простое число и G — p -группа; если $Z_p \in \mathfrak{F}$, то в G все подгруппы \mathfrak{F} -субнормальны.

Лемма 2.2. Пусть \mathfrak{F} — наследственная формация, $H \leq G$ и $M \leq G$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), то $H \cap M \mathfrak{F}\text{-sn } M$ ($H \cap M \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } M$);
- 2) если $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ и $M \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$ и $M \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), то $H \cap M \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \cap M \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$);
- 3) если $G^{\mathfrak{F}} \leq H$, то $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$);
- 4) если $H \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$), то $H^x \mathfrak{F}\text{-sn } G$ ($H^x \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$) для любого $x \in G$.

Лемма 2.3 [12, лемма 2.3]. Пусть \mathfrak{F} — формация, $H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$, p — простое число и $p \notin \pi(\mathfrak{F})$. Тогда $O_p(H) \leq O_p(G)$.

Лемма 2.4 [12, лемма 2.4]. Пусть \mathfrak{F} — формация и $\pi = \pi(\mathfrak{F})$. Если $G = AB$, где A — π -подгруппа и A К- \mathfrak{F} -sn G , B — π' -подгруппа, то $A \trianglelefteq G$.

Лемма 2.5 [12, лемма 2.7]. Пусть \mathfrak{F} — насыщенная формация и $G = H\tilde{F}(G)$, где $H \in \mathfrak{F}$ и H \mathfrak{F} -sn G . Тогда $G \in \mathfrak{F}$.

Лемма 2.6. Пусть \mathfrak{F} — наследственная формация и G — группа. Если $1 \in \mathfrak{F}$ -sn G , то $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $p \in \pi(G)$. Для любой $P \in \text{Syl}_p(G)$ по п. 1 леммы 2.2 имеем $1 \in \mathfrak{F}$ -sn P . Тогда $P^{\mathfrak{F}}$ содержится в максимальной подгруппе M группы P . Поэтому $P/M \simeq Z_p \in \mathfrak{F}$. Значит, $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$. \square

3. Классы групп $W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$

В настоящем разделе исследуются свойства и связь классов групп $W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$.

Теорема 3.1. Пусть \mathfrak{F} — наследственная формация и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если π_1 — множество простых чисел и $\pi \subseteq \pi_1$, то $W_{\pi_1}\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_{\pi_1}\mathfrak{F} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$;
- 2) $\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\pi(W_{\pi}\mathfrak{F}) = \pi(\mathfrak{F})$;
- 3) $\mathfrak{N}_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F}) \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\mathfrak{N}_{\pi} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$;
- 4) $W_{\pi}\mathfrak{F} = W_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F})$;
- 5) $W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$ — наследственные формации;
- 6) $W_{\pi}(W_{\pi}\mathfrak{F}) = W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $\overline{W}_{\pi}(\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}) = \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$;
- 7) если \mathfrak{H} — наследственная формация и $\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{H}$, то $W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{H}$ и $\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{H}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Пусть $G \in W_{\pi_1}\mathfrak{F}$ ($G \in \overline{W}_{\pi_1}\mathfrak{F}$), $q \in \pi \cap \pi(G)$ и Q — любая силовская q -подгруппа из G . Так как $q \in \pi_1 \cap \pi(G)$, то Q \mathfrak{F} -sn G (соответственно Q К- \mathfrak{F} -sn G). Значит, $W_{\pi_1}\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$ (соответственно $\overline{W}_{\pi_1}\mathfrak{F} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$).

2. Из п. 3 леммы 2.2 следует, что $\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$. Ввиду п. 1 теоремы и определений \mathfrak{F} -субнормальной и К- \mathfrak{F} -субнормальной подгрупп $W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$. Из $\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$ и леммы 2.6 заключаем, что $\pi(W_{\pi}\mathfrak{F}) = \pi(\mathfrak{F})$.

3. Пусть $G \in \mathfrak{N}_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F})$. Заметим, что $Z_p \in \mathfrak{F}$ для любого $p \in \pi \cap \pi(\mathfrak{F})$. Тогда по п. 5 леммы 2.1 $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$. Значит, $\mathfrak{N}_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F}) \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$.

Если $G \in \mathfrak{N}_{\pi}$, то любая силовская подгруппа группы G нормальна, а значит, К- \mathfrak{F} -субнормальна в G . Поэтому $G \in \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$.

4. Из п. 1 теоремы следует, что $W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F})$.

Пусть $G \in W_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F})$. По п. 2 теоремы $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$. Тогда $\pi \cap \pi(\mathfrak{F}) \cap \pi(G) = \pi \cap \pi(G)$. Следовательно, в группе G любая силовская q -подгруппа, где $q \in \pi \cap \pi(G)$, \mathfrak{F} -субнормальна. Это означает, что $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$. Итак, $W_{\pi}\mathfrak{F} = W_{\pi \cap \pi}(\mathfrak{F})$.

5. Докажем наследственность $\overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$. Рассмотрим группу $G \in \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$ и произвольную подгруппу H из G . Пусть $q \in \pi \cap \pi(H)$. По теореме Силова силовская q -подгруппа S из H содержится в некоторой силовской q -подгруппе Q группы G . Из Q К- \mathfrak{F} -sn G по утверждению 1 леммы 2.2 следует К- \mathfrak{F} -субнормальность $H \cap Q = S$ в H . Значит, $H \in \overline{W}_{\pi}\mathfrak{F}$. Наследственность класса групп $W_{\pi}\mathfrak{F}$ доказывается аналогично. Заметим, что если $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $H \leq G$, то из 1 \mathfrak{F} -sn G по утверждению 1 леммы 2.2 следует, что 1 \mathfrak{F} -sn H .

Докажем, что $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ — гомоморф. Пусть $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$, $N \trianglelefteq G$ и $p \in \pi \cap \pi(G/N)$. Рассмотрим $P/N \in \text{Syl}_p(G/N)$. Фактор-группа P/N равна HN/N для некоторой силовской p -подгруппы H группы G . Из $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ следует, что $H \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$. Тогда по утверждению 1 леммы 2.1 $P/N = HN/N \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G/N$. Поэтому $G/N \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$. Итак, $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ — гомоморф. Аналогично доказывается, что $W_\pi \mathfrak{F}$ — гомоморф. При этом ввиду п. 1 леммы 2.1 если $G \in W_\pi \mathfrak{F}$ и $N \trianglelefteq G$, то из 1 $\mathfrak{F}\text{-sn } G$ следует, что $1 \simeq N/N \text{ } \mathfrak{F}\text{-sn } G/N$.

Теперь покажем, что $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ замкнут относительно подпрямых произведений. Пусть G — группа наименьшего порядка такая, что в G существуют нормальные подгруппы N_1 и N_2 , для которых $G/N_1 \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$, $G/N_2 \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$, а $G/N_1 \cap N_2 \notin \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$. Не нарушая общности рассуждений, можно считать, что $N_1 \cap N_2 = 1$. Рассмотрим произвольную силовскую p -подгруппу R группы G , где $p \in \pi \cap \pi(G)$. Так как RN_i/N_i — силовская p -подгруппа в G/N_i и $G/N_i \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$, то $RN_i/N_i \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G/N_i$, $i = 1, 2$. По п. 2 леммы 2.1 $RN_i \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$, $i = 1, 2$. Ввиду утверждения 2 леммы 1.1 и утверждения 2 леммы 2.2 $RN_1 \cap RN_2 = R(N_1 \cap N_2) = R \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$. Отсюда и из п. 4 леммы 2.2 получаем, что $G/N_1 \cap N_2 \simeq G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$. Это противоречит выбору G . Итак, $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ замкнут относительно подпрямых произведений.

Аналогично доказывается, что класс групп $W_\pi \mathfrak{F}$ замкнут относительно подпрямых произведений. Заметим, что при $G/N_i \in W_\pi \mathfrak{F}$ ($i = 1, 2$) имеем $1 \simeq N_1 \cap N_2/N_1 \cap N_2 \text{ } \mathfrak{F}\text{-sn } G/N_1 \cap N_2$. Итак, $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ и $W_\pi \mathfrak{F}$ — наследственные формации.

6. Пусть $\mathfrak{X} = \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ и $\mathfrak{X}_1 = W_\pi \mathfrak{F}$. Из утверждения 5 теоремы следует, что \mathfrak{X} и \mathfrak{X}_1 — наследственные формации. Тогда по п. 2 теоремы $\mathfrak{X} \subseteq \overline{W}_\pi \mathfrak{X}$ и $\mathfrak{X}_1 \subseteq W_\pi \mathfrak{X}_1$. Пусть G — группа наименьшего порядка из $\overline{W}_\pi \mathfrak{X} \setminus \mathfrak{X}$. Пусть $p \in \pi \cap \pi(G)$ и $Q \in \text{Syl}_p(G)$. Ввиду п. 3 теоремы $G \neq Q$. Так как $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{X}$, в G найдется подгруппа M такая, что $Q \leq M$ и либо $G^{\mathfrak{X}} \leq M$, либо $M \trianglelefteq G$. Пусть N — минимальная нормальная подгруппа группы G , содержащаяся в M . По утверждению 5 теоремы $G/N \in \overline{W}_\pi \mathfrak{X}$. Из $|G/N| < |G|$ следует, что $G/N \in \mathfrak{X}$. Поэтому $QN/N \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G/N$. Отсюда $QN \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$ ввиду утверждения 2 леммы 2.1. Из наследственности $\overline{W}_\pi \mathfrak{X}$ и $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{X}$ вытекает, что $QN \in \overline{W}_\pi \mathfrak{X}$. Так как $QN \neq G$, имеем $QN \in \mathfrak{X}$. Поскольку $\mathfrak{X} = \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$, $Q \in \text{Syl}_p(QN)$ и $p \in \pi \cap \pi(QN)$, то $Q \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } QN$. По утверждению 4 леммы 2.1 $Q \text{ K-}\mathfrak{F}\text{-sn } G$. Получили, что $G \in \mathfrak{X}$. Это противоречит выбору G . Значит, $\overline{W}_\pi \mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{X}$. Итак, $\overline{W}_\pi \mathfrak{X} = \mathfrak{X}$.

Аналогично доказывается, что если G — группа наименьшего порядка из $W_\pi \mathfrak{X}_1 \setminus \mathfrak{X}_1$, $p \in \pi \cap \pi(G)$ и $Q \in \text{Syl}_p(G)$, то $Q \text{ } \mathfrak{F}\text{-sn } G$. Так как $G \notin \mathfrak{X}_1$, 1 не \mathfrak{F} -субнормальна в G и G — π' -группа. Из $G \in W_\pi \mathfrak{X}_1$ следует, что $1 \text{ } \mathfrak{X}_1\text{-sn } G$. Поэтому $G^{\mathfrak{X}_1} \leq M_1$, где M_1 — некоторая максимальная подгруппа группы G . Тогда из $G/G^{\mathfrak{X}_1} \in \mathfrak{X}_1$ получаем, что $1 \simeq G^{\mathfrak{X}_1}/G^{\mathfrak{X}_1} \text{ } \mathfrak{F}\text{-sn } G/G^{\mathfrak{X}_1}$. По п. 2 леммы 2.1 $G^{\mathfrak{X}_1} \text{ } \mathfrak{F}\text{-sn } G$. Поскольку $|G^{\mathfrak{X}_1}| < |G|$, то $G^{\mathfrak{X}_1} \in \mathfrak{X}_1$. Тогда $1 \text{ } \mathfrak{F}\text{-sn } G^{\mathfrak{X}_1}$. По п. 4 леммы 2.1 единичная подгруппа $1 \text{ } \mathfrak{F}\text{-субнормальна в } G$. Получили противоречие. Значит, $W_\pi \mathfrak{X}_1 \subseteq \mathfrak{X}_1$ и $W_\pi \mathfrak{X}_1 = \mathfrak{X}_1$.

Утверждение 7 следует из определения классов $W_\pi \mathfrak{F}$ и $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$, а также определений \mathfrak{F} -субнормальной и К- \mathfrak{F} -субнормальной подгрупп. \square

Лемма 3.2. Пусть \mathfrak{F} — наследственная формация, $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ и $\pi(G) \subseteq \pi \cap \pi(\mathfrak{F})$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) каждый композиционный фактор группы G принадлежит \mathfrak{F} ;

2) $G \in W_{\pi} \mathfrak{F}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Пусть H/K — произвольный композиционный фактор группы $G \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Из утверждения 5 теоремы 3.1 следует, что $H \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Так как $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$ — гомоморф, $H/K \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Пусть $P/K \in \text{Syl}_p(H/K)$, где $p \in \pi$. Если $P/K = H/K$, то H/K — простая примарная группа. Это означает, что $|H/K| = p$. При этом $\pi(H/K) \subseteq \pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$. Поэтому $H/K \in \mathfrak{F}$. Пусть теперь $P/K \neq H/K$. Поскольку P/K К- \mathfrak{F} -sn H/K и H/K — простая группа, в H/K найдется максимальная подгруппа M/K такая, что $(H/K)^{\mathfrak{F}} \leq M/K$. Из $(H/K)^{\mathfrak{F}} \triangleleft H/K$ заключаем, что $(H/K)^{\mathfrak{F}} = 1$. Следовательно, $H/K \in \mathfrak{F}$.

2. Следует из п. 1 и определения класса групп $W_{\pi} \mathfrak{F}$. \square

Теорема 3.3. Пусть \mathfrak{F} — наследственная формация и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_{\pi \cup \pi(\mathfrak{F})} \supseteq \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$;
- 2) если $\pi(\mathfrak{F}) \subseteq \pi$, то $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_{\pi} = \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Пусть $G \in \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$. Тогда $G = A \times B$, где $A \in \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})}$ и $B \in W_{\pi} \mathfrak{F}$. Рассмотрим произвольную силовскую p -подгруппу $P \in G$, где $p \in \pi$. Если $P \leq A$, то из нильпотентности A следует, что $P \trianglelefteq A$. Так как $A \trianglelefteq G$, то P К- \mathfrak{F} -sn G . Пусть $P \leq B$. Из $B \in W_{\pi} \mathfrak{F}$ вытекает, что P \mathfrak{F} -sn B . Отсюда и из $B \trianglelefteq G$ заключаем, что P К- \mathfrak{F} -sn G . Таким образом, $G \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Заметим также, что $G \in \mathfrak{G}_{\pi \cup \pi(\mathfrak{F})}$. Итак, $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_{\pi \cup \pi(\mathfrak{F})} \supseteq \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$.

2. Пусть $\pi(\mathfrak{F}) \subseteq \pi$. По утверждению 1 теоремы $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_{\pi} \supseteq \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$. Обозначим $\tau = \pi \setminus \pi(\mathfrak{F})$.

Пусть $G \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_{\pi}$. Рассмотрим произвольную силовскую p -подгруппу P группы G , где $p \in \tau$. Тогда по лемме 2.3 $P = O_p(P) \leq O_p(G)$. Поэтому $P = O_p(G) \trianglelefteq G$. Если $\tau \cap \pi(G) = \{p_1, \dots, p_n\}$ и $P_i \in \text{Syl}_{p_i}(G)$, $i = 1, \dots, n$, то произведение $A = P_1 P_2 \dots P_n$ является нормальной нильпотентной подгруппой группы G . Ясно, что $|A|$ и $|G : A|$ взаимно просты, поэтому A — холловая подгруппа группы G и $A \in \mathfrak{N}_{\tau}$.

По теореме Шура — Цассенхауза подгруппа A имеет дополнение в G , т. е. существует подгруппа B порядка $|G : A|$ такая, что $G = AB$ и $A \cap B = 1$. Пусть Q — силовская подгруппа из B . Рассмотрим подгруппу QA . Так как \mathfrak{F} — наследственная формация и $G \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$, по п. 5 теоремы 3.1 $QA \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Поэтому Q К- \mathfrak{F} -sn QA . По лемме 2.4 $Q \trianglelefteq QA$. Это означает, что $A \leq N_G(Q)$. Пусть $\{q_1, \dots, q_m\}$ — полное множество простых делителей $|B|$ и $Q_i \in \text{Syl}_{q_i}(B)$, $i = 1, \dots, m$. По п. 3 леммы 1.1 $B = \langle Q_1, \dots, Q_m \rangle$. Из $A \leq N_G(Q_i)$ для $i = 1, \dots, m$ заключаем, что $A \leq N_G(B)$. Тогда $G = AB \leq N_G(B)$. Поэтому $B \trianglelefteq G$. Так как $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$ — наследственная формация и $G \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$, имеем $B \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Из $\pi(B) \subseteq \pi(\mathfrak{F}) \subseteq \pi$ по п. 2 леммы 3.2 заключаем, что $B \in W_{\pi} \mathfrak{F}$. Итак, $G \in \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$. Равенство $\overline{W}_{\pi} \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_{\pi} = \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_{\pi} \mathfrak{F}$ доказано. \square

Следствие 3.3.1 [15, теорема 2.2]. Если \mathfrak{F} — наследственная формация и $\pi = \pi(\mathfrak{F})$, то $\overline{W} \mathfrak{F} = \mathfrak{N}_{\pi'} \times W \mathfrak{F}$.

Следствие 3.3.2. Если \mathfrak{F} — наследственная формация и $\pi(\mathfrak{F}) = \mathbb{P}$, то $\overline{W} \mathfrak{F} = W \mathfrak{F}$.

Заметим, что условие $\pi(\mathfrak{F}) \subseteq \pi$ в п. 2 теоремы 3.3 существенно. Например, пусть $\pi = \{7\}$, $\mathfrak{F} = \mathfrak{N}_{\pi(\mathfrak{F})}$, где $\pi(\mathfrak{F}) = \{2, 3, 5, 7\}$, и $G = A_5$ — знакопеременная группа на пяти символах. Тогда $G \in \overline{W}_{\pi} \mathfrak{F}$. Из $G = G^{\mathfrak{F}}$ следует, что $G \notin W_{\pi} \mathfrak{F}$.

Установим насыщенность и локальное задание формации $W_{\pi} \mathfrak{F}$.

Теорема 3.4. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Тогда $W_{\pi}\mathfrak{F}$ является наследственной насыщенной формацией.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По п. 5 теоремы 3.1 $W_{\pi}\mathfrak{F}$ — наследственная формация.

Докажем насыщенность $W_{\pi}\mathfrak{F}$. Предположим противное. Пусть G — группа наименьшего порядка такая, что $G/\Phi(G) \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ и $G \notin W_{\pi}\mathfrak{F}$. Пусть N — минимальная нормальная подгруппа G . Из $\Phi(G)N/N \leq \Phi(G/N)$ и $G/\Phi(G) \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ следует, что $(G/N)/\Phi(G/N) \in W_{\pi}\mathfrak{F}$. Ввиду выбора G получаем, что $G/N \in W_{\pi}\mathfrak{F}$. Так как $W_{\pi}\mathfrak{F}$ — формация, N является единственной минимальной нормальной подгруппой G и $N \leq \Phi(G)$. Таким образом, N — p -группа для некоторого простого p и $O_{p'}(G) = 1$.

Заметим, что $1 \in \mathfrak{F}$ -sn G . Действительно, из $G/N \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ следует, что $1 \simeq N/N \in \mathfrak{F}$ -sn G/N . По лемме 2.6 $\pi(G/N) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$. По п. 2 леммы 2.1 $N \in \mathfrak{F}$ -sn G . При этом $N \leq \Phi(G)$. Тогда $\pi(G) = \pi(G/N)$ и $N \in \mathfrak{N}_{\pi(\mathfrak{F})} \subseteq \mathfrak{F}$. По п. 3 леммы 2.2 и п. 4 леммы 2.1 для единичной подгруппы будет $1 \in \mathfrak{F}$ -sn G .

Из определения класса групп $W_{\pi}\mathfrak{F}$ следует, что G не является π' -группой.

Пусть Q — произвольная силовская q -подгруппа G для $q \in \pi \cap \pi(G)$. Из $G/N \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ и п. 2 леммы 2.1 вытекает, что $QN \in \mathfrak{F}$ -sn G . Пусть $A = Q\tilde{F}(G)$. Заметим, что нормальная в $A/\Phi(G)$ подгруппа $\tilde{F}(G)/\Phi(G)$ квазинильпотентна. По [24, гл. X, теорема 13.10] и п. 4 леммы 1.3 $\tilde{F}(G)/\Phi(G) \leq F^*(A/\Phi(G)) \leq \tilde{F}(A/\Phi(G))$. Тогда $A/\Phi(G) = (Q\Phi(G)/\Phi(G))\tilde{F}(A/\Phi(G))$. По лемме 2.5 $A/\Phi(G) \in \mathfrak{F}$. Тогда A действует f -стабильно на $\tilde{F}(G)/\Phi(G)$ для максимального внутренне-го локального экрана f формации \mathfrak{F} . Из $O_{p'}(G) = 1$ и [2, теорема 9.18] следует, что A действует f -стабильно на $\Phi(G)$. Таким образом, $A \in \mathfrak{F}$. Значит, $Q \in \mathfrak{F}$ -sn QN , следовательно, $Q \in \mathfrak{F}$ -sn G . Итак, $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$. Получили противоречие. \square

В случае, когда $\pi = \mathbb{P}$ и $\pi = \emptyset$, получаются следующие результаты соответственно.

Следствие 3.4.1 [8, теорема B]. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация. Тогда $W\mathfrak{F}$ — наследственная насыщенная формация.

Следствие 3.4.2. Если \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, то класс групп с \mathfrak{F} -субнормальной единичной подгруппой является наследственной насыщенной формацией.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5. Пусть \mathfrak{F} — локальная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Для любого простого p положим $h_{\pi}^*(p) = (G \mid 1 \in \mathfrak{F}$ -sn G , $Q \in \mathfrak{F}$ -sn G и $Q \in h(p)$ для любой $Q \in \text{Syl}_q(G)$ и $q \in \pi \cap \pi(G))$.

Если $\pi = \mathbb{P}$, то вместо $h_{\mathbb{P}}^*(p)$ будем писать $h^*(p)$.

Прямая проверка определений показывает, что $h_{\pi}^*(p)$ — формация (наследственная формация, если \mathfrak{F} — наследственная локальная формация).

Напомним, что ввиду теоремы Гашюца, Любезедер, Шмита [21, гл. IV, теорема 4.6] формация насыщена тогда и только тогда, когда она локальна.

Теорема 3.6. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Тогда $W_{\pi}\mathfrak{F} = LF(f)$, где f — максимальный внутренний локальный экран формации $W_{\pi}\mathfrak{F}$ такой, что

$$f(p) = \begin{cases} h_{\pi}^*(p), & \text{если } p \in \pi(\mathfrak{F}), \\ \emptyset, & \text{если } p \in \mathbb{P} \setminus \pi(\mathfrak{F}). \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathfrak{X} = LF(f)$. Отметим, что $f(p)$ и \mathfrak{X} являются наследственными формациями. По теореме 3.4 класс групп $W_{\pi}\mathfrak{F}$ является наследственной насыщенной формацией. Заметим, что $\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{X}$. Покажем, что $W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{X}$.

1. Докажем, что $\mathfrak{X} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$. Предположим, что $\mathfrak{X} \setminus W_{\pi}\mathfrak{F} \neq \emptyset$. Пусть G — группа наименьшего порядка из $\mathfrak{X} \setminus W_{\pi}\mathfrak{F}$. По лемме 1.9 группа G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу $N = G^{W_{\pi}\mathfrak{F}}$, $\Phi(G) = 1$ и G — минимальная не $W_{\pi}\mathfrak{F}$ -группа.

Пусть N — неабелева подгруппа, тогда $C_G(N) = 1$. Из $G/C_G(N) \simeq G \in f(p)$ для любого $p \in \pi(N)$ следует, что $G \in h_{\pi}^*(p) \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$; противоречие. Значит, N — элементарная абелева p -группа для некоторого простого p . Заметим, что $p \in \pi(\mathfrak{F})$ и $N = C_G(N)$. Так как $\Phi(G) = 1$, в группе G найдется максимальная подгруппа M такая, что $M \cap N = 1$ и $G = MN$. Из $G/N = G/C_G(N) \in f(p) = h_{\pi}^*(p)$ вытекает, что 1 \mathfrak{F} -sn G и G не является π' -группой.

Пусть P — произвольная силовская q -подгруппа группы G , $q \in \pi \cap \pi(G)$. Предположим, что $PN < G$. Так как $PN/N \mathfrak{F}$ -sn G/N , по п. 2 леммы 2.1 $PN \mathfrak{F}$ -sn G . Из $G \in \mathcal{M}(W_{\pi}\mathfrak{F})$ получаем, что $PN \in W_{\pi}\mathfrak{F}$. Тогда $P \mathfrak{F}$ -sn PN . Отсюда по п. 4 леммы 2.1 $P \mathfrak{F}$ -sn G . Следовательно, $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$; противоречие. Стало быть, $G = NP$ для некоторой силовской q -подгруппы P группы G , $q \in \pi$. Поэтому M — силовская q -подгруппа G . Тогда $G/C_G(N) = G/N \simeq M \in h(p) \subseteq \mathfrak{F}$. Поскольку $N = G^{\mathfrak{F}}$, то G действует f -центрально на $G^{\mathfrak{F}}$. Таким образом, $G \in \mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$. Получили противоречие. Значит, $\mathfrak{X} \setminus W_{\pi}\mathfrak{F} = \emptyset$.

2. Докажем, что $W_{\pi}\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{X}$. Предположим, что $W_{\pi}\mathfrak{F} \setminus \mathfrak{X} \neq \emptyset$. Выберем группу G наименьшего порядка из $W_{\pi}\mathfrak{F} \setminus \mathfrak{X}$. По лемме 1.9 группа G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу $N = G^{\mathfrak{X}} = \tilde{F}(G)$, $\Phi(G) = 1$ и G — минимальная не \mathfrak{X} -группа.

Если G — π' -группа, то из $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ следует, что $G \in h_{\pi}^*(p)$ для любого $p \in \pi(G)$. Тогда $G \in f(p)$, а значит, $G/F_p(G) \in f(p)$ для любого $p \in \pi(G)$. По лемме 1.4 $G \in \mathfrak{X}$; противоречие.

Пусть P — произвольная силовская q -подгруппа G , $q \in \pi \cap \pi(G)$. Предположим, что $PN = G$. Из $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ и леммы 2.5 следует, что $G \in \mathfrak{F}$. Получили противоречие. Следовательно, $PN < G$.

Предположим, что N абелева. Тогда N — элементарная абелева p -подгруппа для некоторого простого p , $G = MN$, где M — максимальная подгруппа группы G , и $M \cap N = 1$. Заметим, что $M \in \mathcal{M}(f(p))$. Так как $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$, то $p \in \pi(\mathfrak{F})$. Следовательно, $M \in \mathcal{M}(h_{\pi}^*(p))$. Рассмотрим силовскую q -подгруппу Q группы M , $q \in \pi \cap \pi(M)$. Если $q \neq p$, то из $Q \in h_{\pi}^*(p)$ следует, что $Q \in h(p)$. Если $q = p$, то $Q \in \mathfrak{N}_p \subseteq \mathfrak{N}_p h(p) = h(p)$. Это означает, что $M \notin \mathcal{M}(f(p))$; противоречие.

Таким образом, N — неабелева минимальная нормальная подгруппа G . Обозначим $R = PN$. Так как $R \neq G$, то $R \in \mathfrak{X}$. Рассмотрим группу $D = \cap C_R(H/K)$, где H/K пробегает все R -главные факторы группы N . Из $C_D(N) \leq C_G(N) = 1$ вытекает, что D можно рассматривать как некоторую группу автоморфизмов группы N , действующую тождественно на всех R -главных факторах группы N . По [2, теорема 9.8] группа D нильпотентна. При этом $D \trianglelefteq R$. Поэтому $D \cap N = 1$ и $D \leq C_R(N) \leq C_G(N) = 1$. Тогда $R/D \simeq R \in f(p)$ для любого $p \in \pi(N)$. Так как $R = PN$, силовская подгруппа P принадлежит $h(p)$. Из $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ заключаем, что 1 \mathfrak{F} -sn G и $P \mathfrak{F}$ -sn G . Тогда $G \simeq G/C_G(N) \in f(p)$. Следовательно, $G \in \mathfrak{X}$. Получили противоречие. Значит, $W_{\pi}\mathfrak{F} \setminus \mathfrak{X} = \emptyset$. Итак,

$$W_\pi \mathfrak{F} = \mathfrak{X}.$$

Ясно, что f — внутренний экран $W_\pi \mathfrak{F}$.

Покажем, что $\mathfrak{N}_p f(p) = f(p)$. Пусть $G \in \mathfrak{N}_p f(p)$, $p \in \mathbb{P}$. Обозначим $L = O_p(G)$. Тогда $G/L \in f(p) \neq \emptyset$. Поэтому $p \in \pi(\mathfrak{F})$ и $G/L \in h_\pi^*(p)$. Значит, $L/L \mathfrak{F}\text{-sn } G/L$. Из п. 2 леммы 2.1 и $L \in \mathfrak{N}_{\pi(\mathfrak{F})} \subseteq \mathfrak{F}$ следует, что $1 \mathfrak{F}\text{-sn } G$.

Пусть $Q \in \text{Syl}_q(G)$ и $q \in \pi \cap \pi(G)$. Тогда $QL/L \in h(p)$ и $QL/L \mathfrak{F}\text{-sn } G/L$. Отсюда вытекает, что $Q \in \mathfrak{N}_p h(p) = h(p)$ и $QL \mathfrak{F}\text{-sn } G$. Если $q = p$, то $Q \mathfrak{F}\text{-sn } G$. Если $q \neq p$, то по лемме 1.7 $QL \in \mathfrak{F}$. По п. 4 леммы 2.1 $Q \mathfrak{F}\text{-sn } G$. Значит, $G \in h_\pi^*(p) = f(p)$. Отсюда и из $f(p) \subseteq \mathfrak{N}_p f(p)$ получаем равенство $\mathfrak{N}_p f(p) = f(p)$.

Ввиду леммы 1.6 f — максимальный внутренний локальный экран $W_\pi \mathfrak{F}$. \square

Следствие 3.6.1. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран и $\pi \subseteq \pi(\mathfrak{F}) = \mathbb{P}$. Тогда $W_\pi \mathfrak{F} = LF(h_\pi^*)$, где h_π^* — максимальный внутренний локальный экран формации $W_\pi \mathfrak{F}$.

Следствие 3.6.2. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран. Тогда $W\mathfrak{F} = LF(f)$, где f — максимальный внутренний локальный экран формации $W\mathfrak{F}$ такой, что

$$f(p) = \begin{cases} h^*(p), & \text{если } p \in \pi(\mathfrak{F}), \\ \emptyset, & \text{если } p \in \mathbb{P} \setminus \pi(\mathfrak{F}). \end{cases}$$

Следствие 3.6.3. Если \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран и $\pi(\mathfrak{F}) = \mathbb{P}$, то $W\mathfrak{F} = LF(h^*)$, где h^* — максимальный внутренний локальный экран формации $W\mathfrak{F}$.

Согласно [21, гл. IV, пример 3.4(f)] формация \mathfrak{U} всех сверхразрешимых групп имеет внутренний локальный экран f такой, что $f(p) = \mathfrak{A}(p-1)$ — класс всех абелевых групп экспоненты, делящей $p-1$, для любого простого p . Ввиду леммы 1.6 формация \mathfrak{U} имеет максимальный внутренний локальный экран h такой, что $h(p) = \mathfrak{N}_p \mathfrak{A}(p-1)$. В [16] найден локальный экран формации $w\mathfrak{U}$, который не является максимальным внутренним. Используя теорему 3.6, нетрудно найти максимальный внутренний локальный экран формации $w\mathfrak{U}$.

Следствие 3.6.4. Формация $w\mathfrak{U} = W\mathfrak{U} = \overline{W}\mathfrak{U}$ имеет максимальный внутренний локальный экран h^* такой, что $h^*(p) = (G \mid Q \text{ } \mathbb{P}\text{-субнормальна в } G \text{ и } Q \in \mathfrak{N}_p \mathfrak{A}(p-1) \text{ для всякой силовской подгруппы } Q \text{ группы } G)$ для любого простого p .

Теорема 3.7. Если \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация и $\pi(\mathfrak{F}) \subseteq \pi$, то $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$ — наследственная насыщенная формация.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По теореме 3.3 $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi = \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_\pi \mathfrak{F}$. Заметим, что $\mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})}$ — наследственная насыщенная формация. Согласно теореме 3.4 $W_\pi \mathfrak{F}$ — наследственная насыщенная формация. Тогда по лемме 1.5 $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$ является наследственной насыщенной формацией. \square

Следствие 3.7.1 [15, следствие 2.3]. Если \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, то $\overline{W}\mathfrak{F}$ — наследственная насыщенная формация.

Теорема 3.8. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран и $\pi(\mathfrak{F}) \subseteq \pi$. Тогда $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi =$

$LF(g)$, где g — максимальный внутренний локальный экран формации $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$ такой, что

$$g(p) = \begin{cases} h_\pi^*(p), & \text{если } p \in \pi(\mathfrak{F}), \\ \mathfrak{N}_p, & \text{если } p \in \pi \setminus \pi(\mathfrak{F}), \\ \emptyset, & \text{если } p \in \mathbb{P} \setminus (\pi \cup \pi(\mathfrak{F})). \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathfrak{X} = LF(g)$. Докажем, что $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi = \mathfrak{X}$. Заметим, что $g(p)$ и \mathfrak{X} — наследственные формации.

1. Установим, что $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi \subseteq \mathfrak{X}$. Напомним: $\mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} = LF(f_1)$, где

$$f_1(p) = \begin{cases} \mathfrak{N}_p, & \text{если } p \in \pi \setminus \pi(\mathfrak{F}), \\ \emptyset, & \text{если } p \in \mathbb{P} \setminus (\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})). \end{cases}$$

По теореме 3.6 $W_\pi \mathfrak{F} = LF(f)$, где

$$f(p) = \begin{cases} h_\pi^*(p), & \text{если } p \in \pi(\mathfrak{F}), \\ \emptyset, & \text{если } p \in \mathbb{P} \setminus \pi(\mathfrak{F}). \end{cases}$$

Так как $f_1(p) \subseteq g(p)$ и $f(p) \subseteq g(p)$ для любого простого p , согласно лемме 1.8 $\mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \subseteq \mathfrak{X}$ и $W_\pi \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{X}$. Поскольку любая формация замкнута относительно прямых произведений, $\mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})} \times W_\pi \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{X}$. По п. 2 теоремы 3.3 $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi \subseteq \mathfrak{X}$.

2. Докажем, что $\mathfrak{X} \subseteq \overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$. Предположим, что $\mathfrak{X} \setminus (\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi) \neq \emptyset$. Пусть G — группа наименьшего порядка из $\mathfrak{X} \setminus (\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi)$. По лемме 1.9 группа G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу N , $G/N \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$ и $\Phi(G) = 1$.

Пусть N — абелева группа. Тогда N является элементарной абелевой p -группой для некоторого простого p и $N = C_G(N)$. Из $G \in \mathfrak{X}$ следует, что $G/C_G(N) \in g(p)$. Поэтому $p \notin \mathbb{P} \setminus (\pi \cap \pi(\mathfrak{F}))$. Если $p \in \pi \setminus \pi(\mathfrak{F})$, то $G/C_G(N) \in g(p) = \mathfrak{N}_p$. Тогда $G \in \mathfrak{N}_p \subseteq \mathfrak{N}_{\pi \setminus \pi(\mathfrak{F})}$ и согласно п. 2 теоремы 3.3 $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$; противоречие. Если $p \in \pi(\mathfrak{F})$, то $G/C_G(N) = G/N \in g(p) = h_\pi^*(p) = f(p)$, где f — максимальный внутренний локальный экран $W_\pi \mathfrak{F}$. Отсюда $G \in W_\pi \mathfrak{F}$ и $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$; противоречие.

Таким образом, N — неабелева минимальная нормальная подгруппа G и $C_G(N) = 1$. Отсюда и из $G/C_G(N) \simeq G \in g(p) \neq \emptyset$ для любого $p \in \pi(N)$ заключаем, что $p \in \pi(\mathfrak{F})$. Поэтому $g(p) = h_\pi^*(p)$ и $G \in h_\pi^*(p) \subseteq W_\pi \mathfrak{F}$. Значит, $G \in \overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$. Получили противоречие. Итак, $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi = \mathfrak{X}$.

Заметим, что $\mathfrak{N}_p g(p) = g(p)$ и ввиду п. 2 теоремы 3.3 $g(p) \subseteq \overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$ для любого простого p . Из леммы 1.6 следует, что g — максимальный внутренний локальный экран $\overline{W}_\pi \mathfrak{F} \cap \mathfrak{G}_\pi$. \square

Следствие 3.8.1. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран. Тогда $\overline{W}\mathfrak{F} = LF(g)$, где g — максимальный внутренний локальный экран формации $\overline{W}\mathfrak{F}$ такой, что

$$g(p) = \begin{cases} h^*(p), & \text{если } p \in \pi(\mathfrak{F}), \\ \mathfrak{N}_p, & \text{если } p \in \mathbb{P} \setminus \pi(\mathfrak{F}). \end{cases}$$

В разрешимом случае отсюда получается [15, теорема 3.5]

ЗАМЕЧАНИЕ 3.9. Вопрос о насыщенности формации $\overline{W}_\pi \mathfrak{F}$ и ее локальном задании в общем случае остается открытым.

Теорема 3.6 позволяет строить новые примеры насыщенных формаций.

Предложение 3.10. Пусть \mathcal{A} — формация всех разрешимых групп с абелевыми силовскими подгруппами. Тогда $W(\mathfrak{M}) = \overline{W}(\mathfrak{M}) = \mathfrak{N}\mathcal{A}$.

Доказательство. Ввиду [2, гл. 1, разд. 4, п. 10] формация \mathfrak{M} имеет максимальный внутренний локальный экран h такой, что $h(p) = \mathfrak{N}_p\mathfrak{A}$ для любого простого p , и формация $\mathfrak{N}\mathcal{A}$ имеет максимальный внутренний локальный экран h_1 такой, что $h_1(p) = \mathfrak{N}_p\mathcal{A}$ для любого простого p . По следствию 3.6.3 $W(\mathfrak{M}) = LF(h^*)$, где h^* — максимальный внутренний локальный экран формации $W(\mathfrak{M})$ такой, что $h^*(p) = (G \mid Q \mathfrak{M}\text{-sn } G)$ и $Q \in \mathfrak{N}_p\mathfrak{A}$ для любой силовской подгруппы Q группы G). Предположим, что $h^*(p) \neq h_1(p)$ для некоторого простого p .

Пусть G — группа наименьшего порядка из $h^*(p) \setminus h_1(p)$. Пусть N — минимальная нормальная подгруппа из G . Группа G разрешима. Поэтому N — r -группа для некоторого простого r . Так как $h^*(p)$ и $h_1(p)$ — формации, $G/N \in h_1(p)$ и N — единственная минимальная нормальная подгруппа из G . Поэтому $N \leq F(G)$ и $F(G)$ — r -группа. Ясно, что $r \neq p$. Пусть $Q \in \text{Syl}_q(G)$. Из $G \in h^*(p)$ следует, что $Q \mathfrak{M}\text{-sn } G$ и $Q \in \mathfrak{N}_p\mathfrak{A}$.

Если $q \neq p$, то $Q \in \mathfrak{A}$. Допустим, что $q = p$. Рассмотрим подгруппу $R = F(G)Q$. Если $R \neq G$, то из наследственности $h^*(p)$ и выбора G вытекает, что $R \in h_1(p)$. Из $O_p(R) = 1$ заключаем, что $R \in \mathcal{A}$. Поэтому $Q \in \mathfrak{A}$. Значит, $G \in \mathcal{A} \subseteq \mathfrak{N}\mathcal{A} = h_1(p)$. Это противоречит выбору G . Предположим, что $R = G$. По лемме 2.5 $G \in \mathfrak{M}$. Тогда коммутант G' принадлежит \mathfrak{N} . Отсюда $G' \leq F(G)$. Тогда $Q \simeq QG'/G' \in \mathfrak{A}$. Следовательно, $G \in \mathcal{A} \subseteq \mathfrak{N}\mathcal{A} = h_1(p)$. Это противоречит выбору G . Итак, доказано, что $h^*(p) \subseteq h_1(p)$.

Пусть теперь G — группа наименьшего порядка из $h_1(p) \setminus h^*(p)$. Из $G \in \mathfrak{N}_p\mathcal{A}$ следует, что в G найдется нормальная подгруппа K такая, что $K \in \mathfrak{N}_p$ и $G/K \in \mathcal{A}$. Из выбора G заключаем, что $K \neq G$. Пусть N — минимальная нормальная подгруппа из G . Так как $h^*(p)$ и $h_1(p)$ — формации, из выбора G вытекает, что $G/N \in h^*(p)$ и N — единственная минимальная нормальная подгруппа из G . Тогда $N \leq K$. Пусть $Q \in \text{Syl}_q(G)$.

Пусть $q \neq p$. Из $G/K \in \mathcal{A}$ получаем, что $Q \simeq QK/K \in \mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{N}_p\mathfrak{A}$. Из $G/N \in h^*(p)$ заключаем, что $QN/N \mathfrak{M}\text{-sn } G/N$. По п. 2 леммы 2.1 $QN \mathfrak{M}\text{-sn } G$. Если $QN \neq G$, то по выбору G следует, что $QN \in h^*(p)$. Тогда $Q \mathfrak{M}\text{-sn } QN$ и по п. 4 леммы 2.1 $Q \mathfrak{M}\text{-sn } G$. Если $QN = G$, то $G \in \mathfrak{M}$. Поэтому $Q \mathfrak{M}\text{-sn } G$.

Пусть $q = p$. Из $G/N \in h^*(p)$ вытекает, что $Q/N \mathfrak{M}\text{-sn } G/N$ и $Q/N \in \mathfrak{N}_p\mathfrak{A}$. По п. 2 леммы 2.1 $Q \mathfrak{M}\text{-sn } G$. Из $\mathfrak{N}_p h(p) = h(p)$ имеем $Q \in \mathfrak{N}_p\mathfrak{A}$. Таким образом, $G \in h^*(p)$. Получили противоречие с выбором G . Значит, $h_1(p) \subseteq h^*(p)$.

Итак, $h^*(p) = h_1(p)$ для любого простого p . Отсюда и из следствия 3.3.2 заключаем, что $\overline{W}(\mathfrak{M}) = W(\mathfrak{M}) = \mathfrak{N}\mathcal{A}$. \square

4. Формации \mathfrak{F} , для которых $W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$

Настоящий раздел посвящен исследованию проблеме 2.

Теорема 4.1. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Тогда и только тогда $W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$, когда для любой минимальной не \mathfrak{F} -группы G фактор-группа $G/\tilde{F}(G)$ является либо единичной, либо p -группой для некоторого $p \in \pi$.

Доказательство. Пусть $W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$ и G — минимальная не \mathfrak{F} -группа. Если $\pi(G) \not\subseteq \pi(\mathfrak{F})$, то G является группой простого порядка ввиду наследственности \mathfrak{F} . Поэтому утверждение теоремы выполняется.

Предположим, что $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$.

Допустим вначале, что $\Phi(G) = 1$. В этом случае в G имеется единственная минимальная нормальная подгруппа N и $\tilde{F}(G) = \text{Soc}(G) = N$. Можно считать, что $N \neq G$. Из $N \in \mathfrak{F}$ следует, что $1 \mathfrak{F}\text{-sn} N$. Отсюда и из $G/N \in \mathfrak{F} = W_{\pi}\mathfrak{F}$ заключаем, что $1 \mathfrak{F}\text{-sn} G$. Пусть P — произвольная силовская p -подгруппа группы G , где $p \in \pi \cap \pi(G)$. Заметим, что $PN/N \mathfrak{F}\text{-sn} G/N$. Тогда из п. 2 леммы 2.1 следует, что $PN \mathfrak{F}\text{-sn} G$. Предположим, что $PN < G$. Так как $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$, имеем $PN \in \mathfrak{F}$. Поэтому $P \mathfrak{F}\text{-sn} PN$. По утверждению 4 леммы 2.1 подгруппа P \mathfrak{F} -субнормальна в G . Тогда $G \in W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$. Получили противоречие. Итак, $G = PN$ для некоторой силовской p -подгруппы P . Тогда $G/\tilde{F}(G) \simeq P/P \cap N = p$ -группа для $p \in \pi \cap \pi(G)$.

Пусть $\Phi(G) \neq 1$. Ввиду насыщенности \mathfrak{F} и $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$ заключаем, что $G/\Phi(G) \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$. Согласно п. 1 леммы 1.3 $\tilde{F}(G)/\Phi(G) = \tilde{F}(G/\Phi(G))$. Так как $\Phi(G/\Phi(G)) = 1$, по доказанному выше $G/\tilde{F}(G) \simeq G/\Phi(G)/\tilde{F}(G/\Phi(G))$ является либо единичной, либо p -группой для некоторого $p \in \pi$. Необходимость доказана.

Пусть для любой группы $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$ фактор-группа $G/\tilde{F}(G)$ является либо единичной, либо p -группой для некоторого $p \in \pi$. Докажем, что $W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$. По п. 2 теоремы 3.1 $\mathfrak{F} \subseteq W_{\pi}\mathfrak{F}$.

Предположим, что $W_{\pi}\mathfrak{F} \setminus \mathfrak{F} \neq \emptyset$. Пусть G — группа наименьшего порядка из $W_{\pi}\mathfrak{F} \setminus \mathfrak{F}$. По теореме 3.4 $W_{\pi}\mathfrak{F}$ является наследственной насыщенной формацией. По лемме 1.9 $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$, в G имеется единственная минимальная нормальная подгруппа N , при этом $N = G^{\mathfrak{F}} = \tilde{F}(G)$. Из $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$ следует, что $G \neq \tilde{F}(G)$. По условию $G/\tilde{F}(G) = G/N$ — p -группа для некоторого $p \in \pi$. Тогда в G существует силовская p -подгруппа P такая, что $PN/N = G/N$. Поэтому $PN = G$. Так как $G \in W_{\pi}\mathfrak{F}$, то $P \mathfrak{F}\text{-sn} G$ и $\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$. Тогда в G найдется максимальная подгруппа M такая, что $P \leq M$ и $N = G^{\mathfrak{F}} \leq M$. Это означает, что $G = PN \leq M < G$. Получили противоречие. Итак, $W_{\pi}\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$. Достаточность доказана. \square

Напомним, что группа G называется *примарной*, если $|G| = p^k$, где p — некоторое простое число, k — неотрицательное целое число.

Следствие 4.1.1. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация. Тогда и только тогда $W\mathfrak{F} = \mathfrak{F}$, когда для любой минимальной не \mathfrak{F} -группы G фактор-группа $G/\tilde{F}(G)$ является примарной группой.

Следствие 4.1.2. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация и $\pi(\mathfrak{F}) = \mathbb{P}$. Тогда и только тогда $W\mathfrak{F} = \mathfrak{F} = \overline{W}\mathfrak{F}$, когда для любой минимальной не \mathfrak{F} -группы G фактор-группа $G/\tilde{F}(G)$ является примарной группой.

Напомним, что *формацией Шеметкова* называется формация \mathfrak{F} , у которой любая минимальная не \mathfrak{F} -группа является либо группой простого порядка, либо группой Шмидта.

Следствие 4.1.3. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация Шеметкова. Группа G принадлежит \mathfrak{F} тогда и только тогда, когда любая ее силовская подгруппа \mathfrak{F} -субнормальна в G .

Напомним, что \mathfrak{F} называется *решеточной формацией* (см., например, [4, разд. 6.3]), если множество всех \mathfrak{F} -субнормальных подгрупп образует подрешетку решетки всех подгрупп в любой группе. Для решеточной формации \mathfrak{F} из строения минимальных не \mathfrak{F} -групп [25, теорема 2] получается следующий результат.

Следствие 4.1.4. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная решеточная формация. Группа G принадлежит \mathfrak{F} тогда и только тогда, когда любая ее силовская подгруппа \mathfrak{F} -субнормальна в G .

Для множества натуральных чисел \mathbb{N} обозначим через I любое подмножество из $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Пусть \mathfrak{X} — непустой класс групп, π_i и π_j — некоторые множества простых чисел. Обозначим $\mathfrak{F} = \bigcap_{(i,j) \in I} \mathfrak{X}_{\pi_i} \mathfrak{X}_{\pi_j}$, где (i,j) пробегает все пары из I .

Лемма 4.2. Пусть $\mathfrak{X} = \mathfrak{X}\mathfrak{X}$ — наследственная локальная формация и

$$\mathfrak{F} = \bigcap_{(i,j) \in I} \mathfrak{X}_{\pi_i} \mathfrak{X}_{\pi_j}.$$

Тогда для любой минимальной не \mathfrak{F} -группы G фактор-группа $G/\tilde{F}(G)$ является примарной группой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{F})$. Тогда очевидно, что $G \in \mathcal{M}(\mathfrak{X}_{\pi_i} \mathfrak{X}_{\pi_j})$ для некоторой пары $(i,j) \in I$. Обозначим $\mathfrak{H} = \mathfrak{X}_{\pi_i} \mathfrak{X}_{\pi_j}$. Ввиду $\tilde{F}(G)/\Phi(G) = \tilde{F}(G/\Phi(G))$ достаточно доказать утверждение леммы для $\Phi(G) = 1$. Можно считать, что $G \neq \tilde{F}(G)$. Тогда в G имеется единственная минимальная нормальная подгруппа N такая, что $G/N \in \mathfrak{H}$, $N = \tilde{F}(G)$ и $G = NM$ для некоторой максимальной подгруппы M группы G . Если $i = j$ или $N \in \mathfrak{X}_{\pi_i}$, то утверждение леммы выполняется. Пусть $i \neq j$ и $N \notin \mathfrak{X}_{\pi_i}$. Тогда ясно, что $N \in \mathfrak{X}_{\pi_j}$.

Предположим, что $G \neq NQ$ для любой $Q \in \text{Syl}_q(M)$. Легко показать, что $O_{\pi_i}(R) = 1$ для $R = QN$. Из $R \in \mathfrak{H}$ следует, что $R \in \mathfrak{X}_{\pi_j}$. Поэтому $M \in \mathfrak{X}_{\pi_j}$. Но тогда из $G/N \in \mathfrak{X}_{\pi_j}$ заключаем, что $G \in \mathfrak{X}_{\pi_j} \mathfrak{X}_{\pi_j} = \mathfrak{X}_{\pi_j} \subseteq \mathfrak{H}$; противоречие.

Таким образом, $G = NQ$, и утверждение леммы выполняется. \square

Следствие 4.1.5 [9]. Пусть $\mathfrak{X} = \mathfrak{X}\mathfrak{X}$ — наследственная локальная формация, и пусть

$$\mathfrak{F} = \bigcap_{(i,j) \in I} \mathfrak{X}_{\pi_i} \mathfrak{X}_{\pi_j}.$$

Группа G ($\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$) тогда и только тогда принадлежит формации \mathfrak{F} , когда любая силовская подгруппа из G К- \mathfrak{F} -субнормальна в G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО следует из теоремы 4.1 ввиду лемм 3.2 и 4.2.

Следствие 4.1.6 [9]. Пусть

$$\mathfrak{F} = \bigcap_{(i,j) \in I} \mathfrak{G}_{\pi_i} \mathfrak{G}_{\pi_j}.$$

Группа G ($\pi(G) \subseteq \pi(\mathfrak{F})$) тогда и только тогда принадлежит формации \mathfrak{F} , когда любая силовская подгруппа из G К- \mathfrak{F} -субнормальна в G .

Следствие 4.1.7 [9]. Пусть \mathfrak{F} — класс всех π -нильпотентных (p -нильпотентных) групп. Группа G принадлежит \mathfrak{F} тогда и только тогда, когда любая силовская подгруппа из G К- \mathfrak{F} -субнормальна в G .

Следствие 4.1.8 [9]. Пусть \mathfrak{F} — класс всех π -замкнутых (p -замкнутых) групп. Группа G принадлежит \mathfrak{F} тогда и только тогда, когда любая силовская подгруппа из G К- \mathfrak{F} -субнормальна в G .

Следствие 4.1.9 [9]. Пусть \mathfrak{F} — класс всех π -разложимых (p -разложимых) групп. Группа G принадлежит \mathfrak{F} тогда и только тогда, когда любая силовская подгруппа из G К- \mathfrak{F} -субнормальна в G .

Заметим, что отмеченные выше результаты из [9] можно получить другим путем, используя следующую теорему, которая вытекает из теоремы 3.6.

Теорема 4.3. Пусть \mathfrak{F} — наследственная насыщенная формация, h — ее максимальный внутренний локальный экран и $\pi \subseteq \mathbb{P}$. Тогда и только тогда $W_\pi \mathfrak{F} = \mathfrak{F}$, когда $h_\pi^*(p) = h(p)$ для любого простого p .

ЛИТЕРАТУРА

1. Hawkes T. On formation subgroups of a finite soluble group // J. London Math. Soc. 1969. V. 44, N 1. P. 243–250.
2. Шеметков Л. А. Формации конечных групп. М.: Наука, 1978.
3. Kegel O. H. Untergruppenverbände endlicher Gruppen, die den Subnormalteilerverband echt enthalten // Arch. Math. 1978. Bd 30, Heft 3. S. 225–228.
4. Ballester-Bolinches A., Ezquerro L. M. Classes of finite groups. Dordrecht: Springer-Verl., 2006.
5. Васильев А. Ф. О влиянии примарных \mathfrak{F} -субнормальных подгрупп на строение группы // Вопросы алгебры. 1995. Вып. 8. С. 31–39.
6. Васильева Т. И., Прокопенко А. И. Конечные группы с формационно субнормальными подгруппами // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. 2006. № 3. С. 25–30.
7. Ли Ш., Ду Н. Конечные группы с \mathfrak{F} -субнормальными условиями // Сиб. мат. журн. 2008. Т. 49, № 2. С. 367–373.
8. Васильев А. Ф., Васильева Т. И. О конечных группах с обобщенно субнормальными силовскими подгруппами // Проблемы физики, математики и техники. 2011. № 4. С. 86–91.
9. Семенчук В. Н., Шевчук С. Н. Характеризация классов конечных групп с помощью обобщенно субнормальных силовских подгрупп // Мат. заметки. 2011. Т. 89, № 1. С. 104–108.
10. Ballester-Bolinches A., Kamorikov S. F., Tyutyanov V. N. On a problem of L. A. Shemetkov on superradical formations of finite groups // J. Algebra. 2014. V. 403. P. 69–76.
11. Kovaleva V. A., Skiba A. N. Finite soluble groups with all n -maximal subgroups \mathfrak{F} -субнормаль // J. Group Theory. 2014. V. 17, N 2. P. 273–290.
12. Мурашко В. И. Классы конечных групп с обобщенно субнормальными циклическими примарными подгруппами // Сиб. мат. журн. 2014. Т. 55, № 6. С. 1353–1367.
13. Каморников С. Ф., Селькин М. В. Подгрупповые функторы и классы конечных групп. Минск: Беларуская навука, 2003.
14. Вегера А. С. О насыщенных формациях конечных групп, определяемых свойствами вложения силовских подгрупп // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2012. № 6. С. 154–158.
15. Вегера А. С. О конечных группах с заданными К- \mathfrak{F} -субнормальными силовскими подгруппами // Проблемы физики, математики и техники. 2014. № 3. С. 53–57.
16. Васильев А. Ф., Васильева Т. И., Тютянов В. Н. О конечных группах сверхразрешимого типа // Сиб. мат. журн. 2010. Т. 51, № 6. С. 1270–1281.
17. Васильев А. Ф., Васильева Т. И., Тютянов В. Н. О К- \mathbb{P} -субнормальных подгруппах конечных групп // Мат. заметки. 2014. Т. 95, № 4. С. 517–528.
18. Васильев А. Ф., Васильева Т. И., Тютянов В. Н. О произведениях \mathbb{P} -субнормальных подгрупп в конечных группах // Сиб. мат. журн. 2012. Т. 53, № 1. С. 59–67.
19. Monakhov V. S., Kniahina V. N. Finite groups with \mathbb{P} -subnormal subgroups // Recerche Mat. 2013. V. 62, N 2. P. 307–322.
20. Ballester-Bolinches A., Ezquerro L. M., Helal A. A., Al-Shomrani M. M. Some results on products of finite groups // Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (link.springer.com/article/10.1007/s40840-015-0111-7).
21. Doerk K., Hawkes T. Finite soluble groups. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1992.
22. Förster P. Projektive Klassen endlicher Gruppen. II a: Gesättigte Formationen: Ein allgemeiner Satz vom Gaschütz–Lubeseder–Baer–Typ // Publ. Soc. Math. Univ. Autònoma Barcelona. 1985. V. 29, N 2–3. P. 39–76.

23. Васильев А. Ф., Васильева Т. И., Сыроквашин А. В. Заметка о пересечениях некоторых максимальных подгрупп конечных групп // Проблемы физики, математики и техники. 2012. Т. 2. С. 62–64.
24. Huppert B., Blackburn N. Finite groups. III. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verl., 1982.
25. Васильев А. Ф., Каморников С. Ф., Семенчук В. Н. О решетках подгрупп конечных групп // Бесконечные группы и примыкающие алгебраические системы // Киев: Ин-т математики АН Украины, 1993. С. 27–54.

Статья поступила 24 апреля 2015 г.

Васильев Александр Федорович, Вегера Артем Сергеевич
Гомельский гос. университет им. Ф. Скорины, кафедра алгебры и геометрии,
ул. Советская, 104, Гомель 246019, Беларусь
formation56@mail.ru, vegera.artem@gmail.com

Васильева Татьяна Ивановна
Белорусский гос. университет транспорта, кафедра высшей математики,
ул. Кирова, 34, Гомель 246653, Беларусь
tivasilieva@mail.ru