С. П. ИОНОВ, Г. В. ИОНОВА

**МОДЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ С ТУННЕЛЬНЫМИ
ХИМИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ**

(Представлено академиком М. И. Кабачником 15 IV 1971)

Современное представление о постсинаптической мембране сводится к следующему. Это пленка толщиной 100—200 Å, обладающая избирательной ионной проводимостью (калий-натриевый насос, Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^-). При пассивном транспорте движущей силой, создающей направленное перемещение ионов, является градиент электрохимического потенциала. При движении ионы перескакивают от одного центра к другому по эстафетному механизму (растворимость ионов ограничена) ⁽¹⁾. С изменением разности потенциалов проводимость ионов меняется скачком (пороговая сила возбуждения). Это связывается с кооперативным конформационным изменением белков клетки и самой мембраны ⁽²⁾. Есть указания на то, что мембрана обладает пьезоэлектрическими свойствами ⁽³⁾. Раздражение постсинаптической мембраны вызывается веществами-медиаторами (ацетилхолин и другие) на структурных рецепторах, обладающих стерео- и зарядовой специфичностью. В настоящей работе дается качественная микроскопическая модель проводимости мембраны, определяющая перечисленные особенности. Эта модель основывается на предположении, что мембрана является одноосным сегнетоэлектриком (сегнетоэластиком) с направлением оси, перпендикулярной поверхности мембраны.

Тонкие сегнетоэлектрические пленки обладают важными свойствами. С уменьшением толщины диэлектрическая проницаемость возрастает, а петля гистерезиса становится более прямоугольной ^(4, 5). Критическая температура фазового перехода T_k порядок — беспорядок может чувствительно меняться от окружения пленки или от адсорбированных на ней веществ (сегнетоэластики) ⁽⁶⁾. Такая чувствительность, очевидно, может быть стерео- и зарядово специфичной и объясняет действие медиатора. В рамках упрощенной модели представим одноосный сегнетоэлектрик как решетку, состоящую из цепочек типа

где А — стереохимически закрепленный в решетке анион (например, PO_4^{3-} , как в KH_2PO_4), а В — жестко закрепленный ион по линии химической связи $A - \underset{\circ}{\underset{\circ}{\underset{\circ}{\text{B}}}} \dots A$ ⁽⁷⁾. Кругами обозначены два возможных энергетически эквивалентных положения в параэлектрической фазе. Рассмотрим предлагаемую модель сначала на примере системы типа льда ($A = \text{OH}$, $B = \text{H}$). В этом случае проводимость будет осуществляться по эстафетному механизму с образованием дефектов типа $(\text{H}_2\text{O}_2)^+$ или $(\text{H}_2\text{O}_4)^+$, которые перемещаются по цепи со средней скоростью $\bar{v} = vs\Delta G$, где v — частота миграции дефекта, а s — длина свободного пробега ⁽⁸⁾. Величина ΔG определяет неэквивалентность потенциальных ям a и b для иона В, обусловленную наличием внешнего электрического поля в направлении x и спонтанной поляризацией в сегнетоэлектрической фазе.

Для определения ΔG^u в параэлектрической фазе введем стационарные собственные функции $\psi_{\pm}$ в поле E как суперпозицию ψ_{0+} и ψ_{0-} в отсутст-

вне поля:

$$\varphi_{\pm} = c_+ \psi_{0+} + c_- \psi_{0-}.$$

Коэффициенты c_+ и c_- находятся из решения системы уравнений

$$\begin{aligned} (\varepsilon_{n0+} - \varepsilon) c_+ - E p c_- &= 0, \\ -E p c_+ + (-E_{n0+} - \varepsilon) c_- &= 0. \end{aligned}$$

Здесь $p = e \int \psi_{0+} x \psi_{0-} dx$, e — эффективный заряд на ионе В. При учете диполь-дипольного взаимодействия J между протонами в цепочке ⁽⁹⁾ выражения для энергии нулевого (0_+) и первого (0_-) колебательных уровней запишутся

$$\varepsilon_{n0\pm} = \pm [\Omega(\Omega - J \operatorname{th} \Omega / 2kT)]^{1/2}, \quad T > T_k.$$

Параметр 2Ω определяет величину расщепления, т. е. $2\Omega = \varepsilon_{n0+} - \varepsilon_{n0-}$ в изолированной двойной яме при $E = 0$. Тогда

$$\begin{aligned} c_+ &= \varepsilon_{n0+} + \varepsilon / [(\varepsilon_{n0+} + \varepsilon)^2 + (Ep)^2]^{1/2}, \\ c_- &= -\varepsilon_p / [(\varepsilon_{n0+} + \varepsilon)^2 + (Ep)^2]^{1/2}. \end{aligned}$$

Введем функции ψ_a и ψ_b , локализованные в ямах a и b соответственно, и запишем стационарные функции $\varphi_{\pm}$ в виде: $\varphi_{\pm} = a\psi_a \pm b\psi_b$, где $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_+ + c_-)$ и $b = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_+ - c_-)$. Тогда $\Delta G = (a)^2 - (b)^2$ или $\Delta G_{\pm}^n = R_{\pm} / (1 + R_{\pm}^2)^{1/2}$, где $R_{\pm} = Ep / \varepsilon_{n0\pm}$. В сегнетоэлектрической фазе при $E \neq 0$ величина $\Delta G_{\pm}^c$ состоит из двух слагаемых; одно соответствует спонтанной поляризации ΔG^{cn} , а второе обусловлено внешним полем $\Delta G(E)$. Последнее слагаемое определяется таким же образом, как и в параэлектрической фазе. Однако $R_{\pm} = Ep / \varepsilon_{c0\pm}$, где

$$\varepsilon_{c0\pm}^2 = \Omega^2 \left\{ \frac{J^2}{16\Omega^2} \left[\operatorname{th} \frac{\Omega}{2kT} \sqrt{1 + \frac{(\Delta G^{cn})^2 J^2}{(4\Omega)^2}} \right] - 1 \right\}$$

при $T < T_k$.

Величина спонтанной поляризации определяется параметрами системы 2Ω и J и при $T \rightarrow 0$ $\Delta G^{cn} \rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{16\Omega^2}{J^2}}$. Отметим, что поскольку приведенные формулы получены в приближении молекулярного поля, предфазовые состояния ими не описываются. Перейдем к описанию ионной проводимости в мембранах в зависимости от E . В мембране первая роль группы А в цепочке выполняют ионы PO_4^{3-} фосфотидилхолина ⁽¹³⁾, а $B = \text{Na}^+$, K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} и др. При возбуждении постсинаптической мембраны первая при температуре термостата T_0 потенциал покоя (60—90 мВ) уменьшается и при $E = E_{кр}$ происходит резкое возрастание ионной проводимости. Температура фазового перехода T_k при наличии внешнего поля может уменьшаться ⁽¹⁰⁾. При $E = 0$ система находится в сегнетоэлектрической фазе и существует $E = E_{кр}$, при котором температура перехода $T_k < T_0$. Будем считать для простоты, что в обеих фазах v и s одинаковы. Тогда для близких значений E можно показать, что проводимость в сегнето-фазе на несколько порядков выше, чем в пара-фазе. Действительно, отношение проводимостей ($u = \bar{v} / E$)

$$u_c / u_n = \Delta G^c / \Delta G^n$$

определяется отношением неэквивалентностей потенциальных ям a и b . При слабых полях $\Delta G(E)^c \approx \Delta G(E)^n \ll \Delta G^{cn}$. Так, для однозарядного иона с параметрами $e = 0,5$, $E = 1 \text{ в} \cdot \text{см}^{-1}$, $4\Omega / J = 0,9$, $u_c / u_n = 10^6$.

Рассмотренная модель с туннельными химическими связями применима и к тяжелым ионам (K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^-) ⁽⁷⁾. Избирательность

в проводимости ионов будет зависеть от эффективных зарядов, массы и энергетических параметров ионов ($e, m, J, 2\Omega$).

В постсинаптической липидной мембране нерва микромеханизм понижения T_k может быть и иным. Медиатор, выделившийся из синаптической бляшки, покрывает поверхность постсинаптической мембраны, химически адсорбируясь на ее рецепторах. Адсорбированный медиатор упорядочивает параэлектрик ($E > |E_{кр}|$), т. е. эффективно повышает T_k и увеличивает проводимость ионов на время действия медиатора. Сегнетоэластическая модель таким образом может быть приведена в соответствие с химической теорией распространения первого импульса (^{11, 12}).

Итак, нами рассмотрена модель мембраны, в которой нет выделенных пор или трубок, по которым происходит преимущественный транспорт ионов. Модель мембраны с трубками должна существенно отличаться — в ней проводимость ионов максимальна в параэлектрической фазе, так как в сегнетоэлектрической фазе ионы в трубке будут «прилипать» к ее стенкам из-за спонтанной поляризации.

Если V_1 — потенциальный барьер трубки для ионов в пара-фазе, а V_2 — в сегнето-фазе, то $u_c/u_n = \exp\{(V_2 - V_1)/kT\}$ при равенстве предэкспоненциальных множителей и при $V \ll kT$. Вычисление разности $V_1 - V_2$ представляет собой сложную задачу; однако ясно, что проводимость при переходе из одной фазы в другую сильно изменится при малом изменении $V_1 - V_2$. Действие медиатора должно переводить мембрану из сегнето- в пара-фазу.

Институт элементоорганических соединений
Академии наук СССР
Москва

Поступило
18 III 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ М. В. Волькенштейн, С. Н. Фишман, Биофизика, 14, 6, 1008 (1969).
² Е. А. Черницкий, Е. И. Лип, С. В. Конев, Биофизика, 14, в. 6, 1023 (1969).
³ В. А. Цукерман, Биофизика, 14, в. 2, 300 (1969).   ⁴ Э. В. Бурман, Н. П. Смирнова, ФТТ, 6, 4, 1675 (1962).   ⁵ Ю. А. Томашпольский, Ю. Н. Веневцев, Новые пьезо- и сегнетоматериалы и их применение, М., 1969, стр. 18.   ⁶ A. Keitsigo, J. Phys. Soc. Japan, 27, 2, 387 (1969).   ⁷ С. П. Ионов, Г. В. ИONOVA, М. А. Порай-Кошиц, ДАН, 193, № 1, 129 (1970).   ⁸ E. G. Weidemann, G. Zundel, Zs. Naturforsch., 25a, 627 (1970).   ⁹ И. В. Стасюк, Ф. Р. Левицкий, Укр. физ. журн., 15, 3, 460 (1970).   ¹⁰ Г. А. Смоленский, Изв. АН СССР, сер. физ., 20, 166 (1956).   ¹¹ М. Я. Михельсон, Вестн. АН СССР, 5, 75 (1968).   ¹² М. И. Кабачник, Вестн. АН СССР, 5, 86 (1968).   ¹³ J. H. Wang, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 67, 2, 916, 1, 59 (1970).