М. Г. РАСПОПОВА

**НОВЫЕ ДАННЫЕ О СКЛАДЧАТО-БЛОКОВОЙ ТЕКТОНИКЕ
УКРАИНСКОГО ЩИТА (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПЕТРОПЛОТНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД ДОКЕМБРИЯ)**

(Представлено академиком А. Л. Яниным 22 II 1971)

Основные факторы, определяющие плотность горных пород: минеральный состав, структурно-текстурные особенности и степень диагенеза и метаморфизма — безоговорочно принимаются всеми исследователями при изучении закономерностей изменения плотности и при составлении петроплотностной классификации горных пород, слагающих различные регионы (¹, ²). Из косвенных факторов, влияющих на плотность горных пород, наибольшее значение имеют их положение в различных тектонических структурах и возраст. Рассмотрение петроплотностной характеристики в этих аспектах является новым и представляет интерес при решении вопросов геотектонического районирования.

На рис. 1 приведена петроплотностная карта-схема пород Украинского щита с основными элементами его геотектонического районирования (³).

Основой для выделения петроплотностных групп послужило изучение физических свойств около 100 тыс. образцов. Контуры распространения петроплотностных групп пород проводились с учетом данных крупномасштабных геолого-геофизических съемок. Каждому геологическому контуру приписывалось средневзвешенное значение плотности, вычисленное с учетом процентного распространения отдельных петрографических разновидностей, слагающих исследуемый массив. В основу стратиграфической привязки положена региональная стратиграфическая схема, утвержденная секцией докембрия Украинского регионального межведомственного стратиграфического комитета (март, 1970 г.) *.

Основные тектонические циклы формирования складчатых систем в докембрии определяются следующим образом: 1) области архейской консолидации — днеприды и бугиды (древнее 2,6 млрд лет); 2) области нижне- и среднепротерозойской консолидации — азово-волыниды, саксаганиды и ново-волыниды (2,6—1,65 млрд лет).

Наиболее древние образования раннего архея — днеприды I, II ** развиты в среднем Приднепровье. Они представлены осадочно-эффузивными образованиями, сохранившимися в реликтовых синклиналих структурах (σ_{cp} 3,05 г/см³), эпидибазами, амфиболитами (σ_{cp} 2,78 г/см³) и мигматитами плагиигранитов (σ_{cp} 2,66 г/см³). Средневзвешенная плотность образований, развитых в раннем архее, составляет для блока I 2,72 г/см³, для блока II 2,70 г/см³.

Образования позднего архея — бугиды — III, IV, V, VI, VII широко развиты на Побужье. Останцы синклиналих структур представлены осадочно-эффузивными породами бугской гнейсовой серии (σ_{cp} 2,85 г/см³), которые как бы вкраплены в общее поле развития ультраметаморфических пород чарнокитового комплекса с высокой плотностью (σ_{cp} 2,75—2,83 г/см³). Для областей развития образований позднего архея получены средневзвешенные значения плотности в блоках III 2,71; IV 2,72; V 2,69; VI 2,71 и VII 2,73 г/см³.

* Применительно к территории Украинского щита (³, ⁴) были предложены местные названия стратиграфических комплексов, принятые в настоящей статье.

** Обозначения I—XII присвоены нами отдельным складчато-блоковым структурам (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Плотностная карта с элементами геотектонического районирования (составлена на основе петроплотностной карты Украинского щита). Области распространения пород с различной плотностью (σ , г/см³): 1 — <math>\sigma < 2,60</math>, 2 — 2,60—2,63, 3 — 2,64—2,66, 4 — 2,67—2,69, 5 — 2,70—2,72, 6 — 2,75—2,77, 7 — 2,78—2,80, 8 — 2,81—2,83, 9 — 2,84—2,86, 10 — 2,87—2,95, 11 — > 2,95; 12 — зоны глубинных разломов; 13 — граница естественных выходов кристаллических пород фундамента. Блоки: I, II — дисприды (A_1); III — VII — бугиды (A_2); VIII — X — азововольниды (Pt_1^1); XI — саксаганиды (Pt_1^2); XII — ново-вольниды (Pt_2); XIII—XV — платформенных интрузивных образований (Pt_2)

Значительную часть территории Украинского щита составляют раннепротерозойские образования — азово-вольниды (блоки VIII, IX, X), представленные гнейсами тетеревской серии (σ_{cp} 2,65—2,78 г/см³), гранитодами и мигматитами кировоградско-житомирского комплекса (σ_{cp} 2,59—2,74 г/см³). По времени возникновения к верхам раннего протерозоя относятся саксаганиды — XI, с которыми связаны всемирно известные железные руды Кривого Рога. Саксаганиды сохранились только в узкой Криворожско-Кременчугской полосе, преимущественно в виде фрагментов (σ_{cp} 3,01 г/см³). Для областей развития раннепротерозойских образований получены средневзвешенные значения плотности в блоках VIII 2,63; IX 2,67; X 2,65 и XI 2,67 г/см³.

В северо-западной части Украинского щита к среднему протерозою условно отнесена область развития пород осницкой серии (ново-вольниды) — блок XII (σ_{cp} 2,74 г/см³). Геологически они изучены слабо. Основной фон здесь создают интрузивные породы осницкого комплекса (σ_{cp} 2,72—2,95 г/см³). Средневзвешенное значение плотности в целом для Украинского щита составляет 2,67 г/см³.

Рассмотрение петроплотностной карты позволяет сделать следующие выводы:

1. Дифференциация пород Украинского щита по плотности находится в пределах от 2,55 до 3,50 г/см³. Этот значительный диапазон изменения плотностей отвечает полному «спектру» кристаллических образований земной коры.

2. Устанавливается региональная зональность плотности, обусловленная приуроченностью пород разного состава и метаморфизма к определенным геотектоническим элементам и складчато-блоковым структурам.

3. Наблюдается региональное повышение плотности в областях развития архея и обратная закономерность в областях развития раннего протерозоя. Исключение составляют саксаганиды, представленные преимущественно железистыми породами.

4. Аномально высокую плотность имеют среднепротерозойские образования — ново-вольниды.

Таким образом, устанавливается, что в пределах Украинского щита в диапазоне изменений плотности находятся значения практически всех известных нам метаморфических горных пород земной коры. Поэтому можно сделать вывод о том, что в результате вретикальных тектопических движений и эрозионных процессов все они выведены в современный эрозионный срез Украинского щита (см. рис. 1).

По обобщенным данным плотностной характеристики отдельных блоков Украинского щита значения ее находятся в диапазоне 2,63—2,74 г/см³. Этот, казалось бы, незначительный интервал изменения плотностей позволяет судить о весьма значительных амплитудах вертикальных движений отдельных блоков земной коры. Действительно, пользуясь корреляционной зависимостью между скоростью упругих волн и плотностью горных пород (⁵, ⁶) и принимая в первом приближении разрез земной коры как однослойный (с линейно возрастающей плотностью), можно определить градиент нарастания плотности с глубиной в 0,01 г/см³·км. Исходя из этого, путем несложных расчетов оказалось возможным определить знак древних перемещений блоков фундамента и оценить их относительный уровень в современном эрозионном срезе (⁷):

$$\Delta h = \frac{\Delta \sigma}{\text{grad } \sigma},$$

где Δh — суммарная амплитуда перемещений блоков; $\Delta \sigma$ — избыточная плотность складчато-блоковых структур; $\text{grad } \sigma = 0,01$ г/см³·км.

Расчеты показывают, что максимальные вертикальные смещения самых приподнятых и поэтому наиболее эродированных блоков по отношению к блокам, наименее эродированным, могли достигать 10 км.

Рис. 2. Схема блоков докембрийского фундамента Украинского щита (принципиальное представление о контакте разрознорожденных блоков на дневной поверхности). 1—5 — относительные уровни срезов разрознорожденных блоков: 1 — наиболее низкий, 2 — низкий, 3 — средний, 4 — высокий, 5 — наиболее высокий, 6 — блоки, в пределах которых развиты платформенные образования, где уровни срезов не определены; 7—12 — данные геохронологических определений (млрд лет): 7 — > 3, 8 — 3—2,6, 9 — 2,6—2,3, 10 — 2,3—2, 11 — 2—1,65, 12 — 1,65 и менее; 13 — зоны глубинных разломов с указанием знака перемещения блоков; 14 — средневзвешенные значения плотности пород в блоке (α , г/см³); 15 — граница естественных выходов кристаллических пород фундамента

С целью контроля принципиальной правильности принятой методики решения задачи вычисление Δh производилось также по гравитационному полю (⁷). В результате сопоставления тех и других расчетов получено полное совпадение знаков вертикальных перемещений отдельных блоков, что свидетельствует о принципиальной правильности принятой методики. Учитывая ряд допусков, принятых при вычислении суммарных амплитуд (постоянные значения градиента плотности, мощности земной коры ~ 35 км в пределах всех структур и т. п.), целесообразно ограничиться показом знака перемещения и степени относительной эродированности отдельных блоков (рис. 2).

В работе были проанализированы данные по абсолютной геохронологии докембрия (^{8, 9}), позволившие наметить некоторую их взаимосвязь со строением земной коры, а также установить их соответствие нашим представлениям о различных уровнях древних эрозионных срезов (см. рис. 2).

Киевская экспедиция
Украинского научно-исследовательского
геолого-разведочного института

Поступило
15 II 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Н. Б. Дортман, Сборн. Физико-механические свойства горных пород верхней части земной коры, «Наука», 1968. ² Методическое руководство по определению физических свойств горных пород и полезных ископаемых, М., 1962. ³ В. Е. Бураковский и др., Геол. журн., 30, 5 (1970). ⁴ А. Н. Козловская, М. Г. Распопова и др., Сборн. Новые данные о геологии и полезных ископаемых Ростовской и сопредельных областей, Ростов, 1970. ⁵ И. Г. Клушин, Геология и геофизика, № 11 (1961). ⁶ И. Г. Клушин, Л. Е. Шустова, Прикладная геофизика, Сборн. 41, 1965. ⁷ М. Г. Распопова, К. Ф. Тяжкин, Докл. АН УССР, сер. Б, Геология, геофизика, № 2 (1967). ⁸ Геохронология докембрия Украины, Киев, 1965. ⁹ К. О. Кратц, С. В. Лобач-Жученко, Геотектоника, № 2 (1970).