В. Л. АНТОНОВСКИЙ, А. С. ГУКОВСКАЯ, Т. М. ПРОКОПЬЕВА,
Б. П. СУХОРИКОВ

ПРОТОНИРОВАНИЕ ТИМИНА, УРАЦИЛА И ЕГО 5-ГАЛОИДПРОИЗВОДНЫХ

(Представлено академиком Н. М. Эмануэлем 27 IX 1971)

Для выяснения механизма функционирования нуклеиновых кислот и их предшественников во многих работах исследуются изменения их функций при замене тимина и урацила на галоидпроизводные. Эти изменения, а также механизм биологического действия 5-галоидурацилов в ряде работ связывают с отличиями их кислотно-основных свойств от тимина и урацила (¹).

В настоящей работе определены pK , ΔF , ΔH , ΔS процессов протонирования тимина, урацила и его 5-галоидпроизводных на основании исследований у.-ф. спектров растворов этих соединений при 20—60° в широком интервале значений кислотности среды.

Спектрофотометрические исследования выполнены в термостатированной кювете на спектрофотометрах «Unicum SP-800» и «Optica Milano SF-4».

Спектры молекулярных форм получены в водных растворах в ацетатном и трис-буферах с добавлением NaCl для поддержания ионной силы равной 0,1. Урацил и его 5-метил- и -галоидпроизводные — слабые основания, поэтому протонирование этих соединений исследовали в растворах концентрированной серной кислоты. На рис. 1 представлены у.-ф. спектры молекулярной и катионной форм урацила, 5-бром-, 5-фтор-, 5-хлор-, 5-иодурацила. Спектры поглощения молекулярных форм совпадают с имеющимися в литературе (²). Спектры катионных форм урацила и тимина представляют собой одну симметричную полосу, смещенную в длинноволновую область относительно молекулярной формы.

Найденная нами pK протонирования 1,3-диметилурацила совпадает с pK урацила, что свидетельствует о том, что протонирование урацила идет в основном по кислородному атому. В спектрах катионов 5-галоидзамещенных урацила наблюдается наложение двух полос поглощения. Величина смещения одной из этих полос относительно молекулярной формы близка к аналогичному смещению для урацила и тимина. Максимум второй полосы лишь незначительно смещен относительно максимума молекулярной формы.

Две полосы поглощения в у.-ф. спектрах 5-галоидпроизводных урацила интерпретируются нами как относящиеся к двум таутомерным катионным формам с присоединением протона по 0-2 и по 0-6. Введение галоида вместо водорода у С-5 уменьшает основность 0-6 атома урацила настолько, что концентрации катионных форм 5-галоидпроизводных, протонированных по 0-2 и по 0-6, становятся соизмеримыми. Урацил и тимин протонируются преимущественно по 0-6 (см. схему).

Нами был сопоставлен ряд методов расчета pK протонирования. Для всех изученных соединений зависимость логарифма отношения концентраций протонированной и молекулярной форм $\lg[BH^+]/[B]$ от функции кислотности H_0 — прямой с тангенсом угла наклона n_{H_0} существенно различным

от единицы (табл. 1). Это указывает на неприменимость уравнения Гаммета (³) к данным соединениям. Значения n_{H_0} и H_0 полуионизации для 5-бромурацила и урацила согласуются с полученными ранее в работе (⁴). Зависимость $\lg[BH^+]/[B]$ от H_A — функции кислотности, введенной для амидов (^{5, 6}), у всех исследованных соединений представляет собой прямую с тангенсом угла наклона n_{HA} близким к единице (табл. 1). Уравнение

$$H_0 + \lg[BH^+]/[B] = pK + \varphi(H_0 + \lg[H^+]), \quad (1)$$

полученное ранее (⁷) на основе принципа линейности свободных энергий дает возможность рассчитать pK протонизации соединений, не подчиняющихся уравнению Гаммета, с помощью H_0 . Наши экспериментальные данные хорошо описываются уравнением (1). Рассчитанные по уравнению (1) pK и φ приведены в табл. 1. pK протонирования, рассчитанные по методу (⁷) и с помощью функции H_A , близки между собой. Таким образом, протонирование урацила и его 5-замещенных лучше описывается функцией кислотности H_A , чем H_0 , а рассчитанные с помощью H_A значения pK_{HT} ближе к термодинамическим pK .

В табл. 2 приведены термодинамические характеристики процесса протонирования. При расчете ΔH , ΔF , ΔS протонирования использованы значения pK , определенные по уравнению (1), и температурная зависимость H_0 растворов H_2SO_4 (⁸). Как видно из табл. 2, изменения энтальпии в процессе протонирования для исследованных соединений отрицательны. Это можно объяснить тем, что урацил и его производные — более слабые основания, чем вода.

Таблица 1

Константы протонирования урацила и его производных при 25°, рассчитанные с использованием функций кислотности Гаммета H_0 , Катрицкого H_A и по методу Баннета (⁷)

Соединение	H_0 полуионизации	n_{H_0}	pK_{H_A}	n_{H_A}	pK	φ
Тимин	-2,50	0,47	-1,90	0,70	-1,60	0,54
Урацил	-3,50	0,52	-2,20	0,72	-2,07	0,54
	-3,38 ⁽⁴⁾	0,53 ⁽⁴⁾				
5-Фторурацил	-7,58	0,58	-4,78	0,75	-4,55	0,50
5-Хлорурацил	-7,40	0,45	-4,63	0,78	-4,13	0,47
5-Бромурацил	-7,25	0,50	-4,40	0,72	-4,10	0,55
	-7,25 ⁽⁴⁾	0,49 ⁽⁴⁾				
5-Иодурацил	-7,10	0,44	-4,20	0,67	-4,06	0,51

Примечание. Средняя квадратичная ошибка определения H_0 полуионизации, pK_{H_A} и pK не превышает $\pm 0,10$; ошибка определения тангенсов n_{H_0} , n_{H_A} и $\varphi \pm 0,05$.

Рис. 1. У.-ф. спектры поглощения молекулярной (1) и катионной (2) форм тимина, урацила и его 5-галогидроизводных в водных растворах при различной кислотности среды при температуре 20°. а — урацил (1 — pH 7,10; 2 — 74% H₂SO₄), б — тимин (1 — pH 7,62; 2 — 80% H₂SO₄), в — 5-фторурацил (1 — pH 5,44; 2 — 97% H₂SO₄), г — 5-хлорурацил (1 — pH 5,60; 2 — 97% H₂SO₄), д — 5-бромуррацил (1 — pH 5,95; 2 — 97% H₂SO₄), е — 5-йодурацил (1 — pH 6,12; 2 — 97% H₂SO₄)

Рис. 2

Рис. 2. Зависимость ΔH от ΔS (протонирование). 1 — урацил, 2 — тимин, 3 — 5-фторурацил, 4 — 5-хлорурацил, 5 — 5-бромуррацил, 6 — 5-йодурацил

Рис. 3

Рис. 3. Зависимость pK протонирования от σ_I -констант заместителей. 1 — урацил, 2 — тимин; 3 — 5-фторурацил, 4 — 5-хлорурацил, 5 — 5-бромуррацил, 6 — 5-йодурацил

Для 5-галоидзамещенных урацила имеет место компенсационная зависимость между ΔH и ΔS протонирования (рис. 3). Точки, относящиеся к тимину и урацилу, не укладываются на эту прямую.

Зависимость pK протонирования от величины σ , — ароматических индукционных констант заместителей по Тафту описывается кривой с изломом на незамещенном соединении. Следует ожидать, что при дополнении наших данных значениями pK 5-замещенных урацилов с большими, чем у

Таблица 2

Термодинамические характеристики протонирования тимина, урацила и его 5-галоидпроизводных (25°)

Соединение	ΔF , ккал/моль	ΔH , ккал/моль	ΔS , э. ед.
Тимин	-2,16	-4,41	-7,61
Урацил	-2,85	-5,00	-7,25
5-Фторурацил	-6,24	-9,40	-10,60
5-Хлорурацил	-5,62	-6,88	-4,10
5-Бромурацил	-5,66	-8,40	-8,32
5-Иодурацил	-5,56	-6,26	-2,01

Примечание. Погрешность определения ΔH и ΔF равна $\pm 0,5$ ккал/моль, $\Delta S \pm 1,5$ э. ед.

галоидов, совокупность точек опишется кривой с двумя асимптотами в соответствии с теорией М. И. Кабачника⁽⁹⁾ для таутомерного равновесия прототропных веществ с двумя реакционными центрами.

Характер зависимостей для процесса протонирования ΔH от ΔS и pK от σ -констант заместителей находится в соответствии с выводами, следующими из у.-ф. спектров, о том, что урацил и тимин протонируются по 0-6, тогда, как 5-галоидпроизводные урацила под влиянием электроноакцепторных заместителей протонируются как по 0-6, так и по 0-2.

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
Академии наук СССР
Москва

Поступило
17 IX 1971

Институт биофизики
Академии наук СССР
Пушино-на-Оке

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Н. К. Кочетков, Э. И. Будовский и др., Органическая химия нуклеиновых кислот, М., 1970; А. Лавлес, Генетические эффекты алкилирующих соединений, М., 1970. ² K. Berens, D. Shugar, Acta biochim. polon., **10**, 25 (1963). ³ L. Hammett, A. Deyrup, J. Am. Chem. Soc., **54**, 4239 (1932). ⁴ Katritzky, A. Waring, J. Chem. Soc., 1962, 1540. ⁵ K. Yates, J. Stevens, A. Katritzky, Canad. J. Chem., **42**, 1597 (1964). ⁶ C. Johnson, A. Katritzky, N. Shakir, J. Chem. Soc., 1967, 1237. ⁷ J. Bunnet, F. Olsen, Canad. J. Chem., **44**, 1899 (1966). ⁸ A. Katritzky, C. Johnson, S. Shapiro, J. Am. Chem. Soc., **91**, 6654 (1969). ⁹ М. И. Кабачник, Журн. Всесоюз. хим. общ. им. Д. И. Менделеева, **7**, 263 (1962).