А. А. МАКУШИН

**О ГЕНЕЗИСЕ МАРГАНЦЕВОГО ОРУДЕНЕНИЯ
СРЕДИ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕПЕРМСКОЙ ГАЛОГЕННОЙ
ФОРМАЦИИ БАШКИРСКОГО ПРИУРАЛЬЯ**

(Представлено академиком Н. М. Страховым 15 I 1971)

Нами был послонно изучен вещественный состав руд и рудовмещающих комплексов на Улутелякском месторождении методами спектрального, химического, минералогического и рентгеноструктурного анализов. Дополнительно производился литолого-фациальный анализ трансгрессивных отложений улутелякской свиты и морфоструктурный анализ современного рельефа Прикаратауского рудного узла. С целью суждения о форме миграции марганца с палеосуши, располагавшейся в филипповское время в пределах современного массива Кара-Тау (?), определялось содержание марганца в штуфах рудных образцов, «серых» шлихах и глинистой фракции, полученных из тех же штуфов. Промышленные концентрации марганца приурочены к улутелякской свите, слагающей разрезы филипповского горизонта пижнего кунгура и, вероятно, саранинского горизонта верхнеартинского подъяруса, получив в палеотектоническом отношении распространение вдоль западного борта кунгурского передового прегриба. Свита представлена ритмичным переслаиванием двух репрессивных (сульфатных) и двух трансгрессивных (карбонатных) пачек, среди которых и развиты залежи марганцевых руд Улутелякского месторождения. Минеральными формами марганца среди карбонатных пачек свиты являются родохрозит, манганокальцит и открытый во время полевых работ 1970 г. алабандин. Алабандин наблюдается в виде тонкозернистых вкраплений темно-зеленого цвета, образующих слоистый, полосчатый, линзовидный, желваковый, пленочный и цементно-поровый текстурные типы.

Первичные (неокисленные) минералы марганца в геохимическом отношении представлены, таким образом, двухвалентными формами, независимо от того, образуют ли они самостоятельные минеральные агрегаты (родохрозит, алабандин) или входят в кристаллическую решетку карбонатных минералов как изоморфная примесь (манганокальциты). В вертикальном разрезе рудных горизонтов четко выделяются депрессионные фацции, слагающие обычно основание разреза, и мелководные фацции, слагающие верхнюю, большую часть разреза. Пространственные закономерности развития выделенных фациальных обстановок (рис. 2) характеризуются закономерной сменой типов сочетания депрессионных и мелководных фаций рудных горизонтов в субмеридиональном направлении. Это позволяет классифицировать области с одинаковым типом сочетания как структурно-фациальные зоны, отражающие блоковое строение ложа улутелякской свиты. Пограничные области структурно-фациальных зон, образующие линейные системы субширотного простирания, рассматриваются как области контрастных движений, в пределах которых формируются участки повышенной проницаемости (трещиноватости) осадочного чехла, генерируемые разноамплитудными движениями блоков.

Подобные зоны в металлогеническом отношении являются своеобразными путями геохимической связи между физико-химическими процессами рудогенеза, протекавшими в бассейне седиментации, и нижележащими физико-химическими обстановками материнского субстрата. Характерно, что к этим же линейным зонам приурочены и границы морфоструктурных

Скважина, рудный горизонт	Интервал(глубина) встречи алабандиновой минерализации	Текстурный тип алабандиновой минерализации	Характерные черты выделенных основных текстурных типов алабандиновой минерализации
Скважина 32 II горизонт	13,00-12,97 м 14,58-14,50 м	желваковый слоистый	
Скважина 32 I горизонт	68,00-67,95	желваковый	
Скважина 33 II горизонт	63,80-63,38 м 66,90-66,60 м 68,65-68,30 м 68,95-68,70 м	полосчатый слоистый, линзовидный линзовидный, желваковый	
Скважина 34 I горизонт	43,60 м	желваковый	
Скважина 31 I горизонт	алабандин	не обнаружен	
Скважина 30 р, а	алабандин	не обнаружен	
Скважина 29 II горизонт	60,40-60,20 м 60,60 м 60,80 м	слоистый полосчатый желваковый	
Скважина 28 II горизонт руда полуокисленая	Данные	нет	
Скважина 28 I горизонт	119,00-118,60 м 119,10 м 120,70 м	полосчатый, линзовидный линзовидный цемент	
Скважина 27 II горизонт	93,90-93,60 м 94,80-94,40 м 95,40 м 96,40-96,0 м 96,70-96,65 м 96,80 м	слоистый пленочный желваковый линзовидный, слоистый линзовидный слоистый	
Скважина 26 II горизонт	142,40-142,0 м 142,95 м 143,35-143,15 м	полосчатый линзовидный слоистый, линзовидный	
Скважина 23	алабандин	не обнаружен	
Скважина 22 II горизонт	59,10 м 59,95 м 61,05-60,95 м 61,35 м	линзовидный желваковый линзовидный линзовидный	
Скважина 22 I горизонт	алабандин	не обнаружен	
Скважина 20 I горизонт	29,25	линзовидный	

Рис. 1. I — желваковый тип; II: а — полосчатый тип, б — линзовидный тип; III — комбинация полосчатого и желвакового типов; IV — комбинация слоистого (а) и полосчато-линзовидного (б) типов; справа — алабандин в обломке карбонатной породы (скв. 28, гл. 119,1 м — I рудный горизонт) — пример эпигенетической минерализации

блоков современного рельефа рудного узла, что свидетельствует об их унаследованности и неотектонической активизации. Как для карбонатов, так и для сульфидов марганца характерна приуроченность наиболее высоких их концентраций не к депрессионным, а к мелководным фациям, причем алабандиновая минерализация получила большее развитие именно в верхнем рудном горизонте, т. е. в том горизонте, для которого характерны и более высокие концентрации карбонатов марганца. Обращает на себя

Рис. 2. Схематизированная геологическая карта центральной и южной частей месторождения Улутеляк II. 1 — скважина, ее номер. 2 — сводная литолого-фациальная колонка месторождения. Улутелякская свита P₁kg (fl) — P₁a₂. Горизонты улутелякской свиты: fl₁ — соответствует, по-видимому, саранинскому горизонту верхнеартинского подъяруса, fl₂ — I и fl₄ — II рудные горизонты — трансгрессивные пачки филипповского горизонта кунгурского яруса P₁kg (fl); fl₃ — регрессивная ангидритовая пачка филипповского горизонта. d — депрессионные фации трансгрессивных пачек филипповского горизонта; представлены черными тонкослоистыми мергелями. m — мелководные фации трансгрессивных пачек fl₂ и fl₄; представлены песчанистыми, конгломератовидными и тонкослоистыми разновидностями карбонатных пород. 3, 4 — P₁kg₁ — II — проекция выходов в сферу N — Q среза верхнего (3) и P₁kg₂ — I — нижнего (4) рудных горизонтов. 5 — зона трансгрессивного контакта пачки fl₂ (на артинских отложениях). 6 — пункт выброса нефтяных газов. 7 — участки проявления интенсивной алабандиновой минерализации. 8 — контур неогенчетвертичной долины. 9 — границы структурно-фациальных зон (блоков) улутелякской свиты. Соответствуют морфоструктурным блокам современной поверхности рельефа. В металлогеническом отношении представляют линейные зоны повышенной проницаемости осадочного чехла

внимание также высокое содержание марганца в верхнем рудном горизонте при пониженном содержании кремнекислоты (7,00% SiO₂ и 9,28% MnO, скв. 11) сравнительно с нижним горизонтом, в котором увеличено содержание кремнекислоты и резко уменьшено содержание марганца (9% SiO₂ и 3,4% MnO, скв. 11). Характерно также, что концентрации марганца в пробах глинистой фракции рудных штуфов более низкие, чем в «сером» шликере (рис. 3, 4). Приведенный фактический материал свидетельствует, на наш взгляд, о миграции марганца с палеосуши в бассейн седиментации преимущественно в растворенном состоянии. Изучение тектурных особенностей проявления алабандиновой минерализации показало, что происхождение алабандиша преимущественно седиментационно-диагенетическое. Эпигенетические текстуры получили резко подчиненное развитие. Наиболее интенсивно алабандиновая минерализация в ее седиментационно-диагенетической форме распространена вдоль «шовных» областей структурно-фациальных зон (блоков) (рис. 1, 2). Четко это наблюдалось по скважинам 22, 23, 27, 28, 32. Для карбонатных пород рудных горизон-

тов улутеляжской свиты характерен сильный запах битумов. Минеральные формы битумов встречены в пределах тех же интервалов глубин, что и сульфиды марганца. При бурении поисковых скважин отмечался выброс нефтяных газов. За пределами рудного поля расположено месторождение

Рис. 3. Распределение марганца в улутеляжской свите по Улутеляжскому месторождению. а — глинистая фракция, б — серый шлик, в — неразделенные пробы (рудный штуф), г — марганец в отложениях кунгурского яруса Башкирского Приуралья

Рис. 4. Распределение марганца в карбонатных и сульфатных породах Улутеляжского месторождения. а — сульфатные породы (гипсы, ангидриты) улутеляжской свиты, б — карбонатные породы улутеляжской свиты

нефти в девонских отложениях. Спектральный анализ алабандина из штуфа, характеризующегося развитием слоистого текстурного типа (скв. 29, гл. 61, 40—61, 60 м) показал содержание (в процентах): Cu 0,001, Ni 0,0008, Cr 0,0008, Sr 0,01, Ba 0,02, Ti 0,001. Такие микроэлементы, как Pb, Co, Sb, Mo, Ag, Sn, Cd, W, Bi, Zr, Be, As не были обнаружены.

Примерно такая же «стерильность» в содержании микроэлементов характерна и для карбонатных руд марганца. Так, по скв. 41 (верхний и нижний горизонты) содержание (в процентах): меди не превышает 0,003, цинка 0,004, никеля 0,006, молибдена 0,001, титана 0,1, ванадия 0,001, бора 0,03, бария 0,006—0,03. Из рудных минералов в составе «серого» шлика протолок химических проб присутствуют магнетит, гидроокислы железа, малахит, пирит, ильменит, рутил, окатанные зерна циркона, т. е. п рудный парагенезис алабандина не свидетельствует о его гидротермальной природе. Источником серы в алабандине, по представлению автора, могли быть только сернистые соединения углеводородных залежей, поступающие, вероятно, в виде газообразных флюидов по зонам сочленения структурно-фациальных блоков одновременно с поступлением в этот же бассейн и растворов марганца с палеосуши, на которой протекали процессы корообразования, достигавшие, по-видимому, щелочной стадии. Если исключить своеобразие формационной позиции марганцевых руд и пути поступления сернистых соединений в бассейн седиментации, то в остальном механизм марганцевого рудогенеза среди отложений галогенной формации не отличался от олигоценного типа, описанного Н. М. Страховым ⁽¹⁾.

Башкирское территориальное геологическое управление

Западно-Башкирская комплексная

геологическая экспедиция

Уфа

Поступило

15 I 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ Н. М. Страхов, Л. Е. Штеренберг и др., Геохимия осадочного марганцеворудного процесса, М., 1968. ² А. А. Макушин, ДАН, 191, № 6 (1970).