Академик АН УзССР Н. В. ЛАВРОВ, Н. Л. СТАСКЕВИЧ,
Г. П. КОМИНА

О МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕНЗ(А)ПИРЕНА

Особый интерес представляет возникновение при сжигании газа многоядерных ароматических углеводородов, часть которых является канцерогенными. Процесс их образования изучен в малой степени. Многочисленными опытами подтверждено наличие в продуктах неполного сгорания различных топлив, включая природный и сжиженный углеводородные газы, бенз(а)пирена, пирена, перилена, 1,2-бензантрацена, 1,2-бензпирена и др.

Экспериментально установлено, что пиролиз ацетилена и его производных приводит к образованию бенз(а)пирена и других полициклических углеводородов. По литературным данным, углеводороды типа ацетилена при высоких температурах претерпевают процесс удлинения цепи, приводящий к образованию соединений с углеродным скелетом C_6C_4 , которые в результате циклизации могут превратиться в бенз(а)пирен и др.

По данным Беджера (1), образование бенз(а)пирена может протекать по следующей предположительной схеме:

Авторы (2) дают несколько другую схему образования бенз(а)пирена

Приведенная схема не дает четкой физико-химической картины сложного образования бенз(а)пирена.

Для изучения процесса образования бенз(а)пирена (3) была создана специальная экспериментальная установка.

Газ сжигали в различных газогорелочных устройствах. Учитывая, что окружающий воздух содержит значительное количество аэрозолей, включая и многоядерные углеводороды, исследования выполнялись в специально оборудованной камере, подача воздуха в которую осуществлялась через двухслойные и трехслойные фильтры из ткани И. В. Петрянова. Предотвращение попадания в камеру неочищенного воздуха через возможные неплотности достигалось за счет создания в ней избыточного давления путем превышения количества подаваемого воздуха сравнительно с количеством удаляемой смеси.

Устранения внешних влияний, связанных с входом обслуживающего персонала, достигалось выносом контрольно-измерительных приборов, ре-

гулирующих устройств и газозаборных трубок в смежное помещение. Установления наличия полициклических ароматических углеводородов производилось аспирационным методом, при котором смесь продуктов сгорания газа с воздухом просасывалась через фильтры из ультратонких полимерных волокон перхлорвинила, нанесенных на марлю, марок ФПП и ФПА. Зная объем прошедших газов и количество задержанных фильтрами частиц, устанавливалось их количество на 1 м^3 сгоревшего газа.

Рис. 1. Изменение состава продуктов сгорания в зависимости от α_1 . 1 — CO, 2 — C_2H_2 , 3, 4 — C_2H_4 , 5 — $C_{20}H_{12}$

ров выполнялся в лаборатории биофизики Научно-исследовательского института онкологии им. Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения СССР под руководством П. П. Дикуня.

На рис. 1 показано изменение состава продуктов сгорания в зависимости от коэффициента избытка воздуха. При неполном горении природного газа с $\alpha < 1$, в результате происходящего процесса пиролиза, в составе продуктов сгорания появляются неопределяемые углеводороды C_2H_4 и C_2H_2 и бенз(а)пирен. С повышением α_1 содержание $C_{20}H_{12}$ резко падает и при $\alpha_1 = 1$ количество бенз(а)пирена становится ничтожно мало.

При $\alpha_1 = 0,75 \div 0,8$ среднее количество бенз(а)пирена увеличивается до $0,75 \div 0,8 \text{ мкг}$ на 1 м^3 газа. Эксперименты подтверждают, что промежуточными соединениями при образовании бенз(а)пирена являются ацетилен и ацетиленовые углеводороды. По мнению авторов образование бенз(а)пирена является одним из начальных этапов процесса сажеобразования.

В настоящее время получили распространение два механизма термического разложения углеводородов — прямая молекулярная перегруппировка и свободнорадикальный механизм, предложенный Райсом (⁴).

Процессы пиролиза приводят не только к разложению молекулы вещества, но и к синтезу новых соединений. Реакция $C_2H_2 \rightarrow C_2 + H_2$ требует для протекания высоких температур и объясняет образование графита.

Процессы сажеобразования протекают при более низких температурах по радикальноцепному механизму

на и образование третьего ядра

Третья молекула ацетилена ограничивает развитие соединения влево

Присоединение радикала ацетилена заканчивает образование бенз(а)пирена

Суммарное уравнение образования бенз(а)пирена можно написать:

Балансовое уравнение процесса образования бенз(а)пирена из ацетилена имеет вид:

при пиролизе метана уравнение (15) преобразуется

Поступило
18 V 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Г. М. Беджер, Химические основы канцерогенной активности, М., 1966.
² S. K. Ray, R. Long, Combustion and Flame, 8, № 2 (1964). ³ Г. П. Комина, Исследование продуктов сгорания углеводородных газов и снижение в них вредных компонентов, Кандидатская диссертация, Ленингр. инж.-строит. инст., 1971. ⁴ F. O. Rice, J. Am. Chem. Soc., 53, 1959 (1931). ⁵ П. А. Теснер, И. С. Рафалькес, Тр. Всесоюз. н.-и. инст. природн. газа, в. 3, 30 (1953). ⁶ И. С. Рафалькес, П. А. Теснер, там же, в. 3 (11), 3 (1968). ⁷ П. А. Теснер, там же, в. 3 (11), 34 (1958). ⁸ П. А. Теснер, там же, в. 12 (20), 24 (1961). ⁹ П. А. Теснер, Е. А. Рабинович, Л. А. Матюшененко, там же, в. 12 (20), 36 (1961).