Л. И. ГУДЗЕНКО, С. И. ЯКОВЛЕНКО

ПЛАЗМЕННЫЙ ЛАЗЕР НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕХОДАХ МОЛЕКУЛ

(Представлено академиком А. М. Прохоровым 31 III 1972)

Усиление излучения в плотной рекомбинирующей плазме на переходах из термически прочных электронно-возбужденных состояний молекул в лежащие ниже их разлетные или непрочные состояния обладает рядом необычных свойств. Эффективная очистка нижнего рабочего уровня лазера обычно составляет специальную проблему, разлетные же состояния практически пусты. Имея в виду молекулы типа He_2 , Ne_2 , Hg_2 , NeXe и т. д. и предполагая здесь разлетным основное состояние молекулы XY , будем считать его нижним рабочим уровнем. При этом от лазера на переходах

можно ожидать прежде всего весьма высоких значений к.п.д.

Пусть свет частоты ω_0 распространяется в такой среде вдоль оси Oz . Изменение его интенсивности, согласно линейной двухуровневой схеме, определяется процессом фотодиссоциации (1) и обратным процессом индуцированной ассоциации

$$dI = \kappa I dz,$$

где

$$\kappa = \sum_n \sigma(n, l; E) (2l + 1) \exp\left(-\frac{E_{nl} - E_{n0}}{T}\right) \left[N_{n,l}^{\text{XY}} - \left(\frac{2\pi\hbar^2}{\mu T}\right)^{3/2} N^{\text{X}} N^{\text{Y}} \exp\left(\frac{\hbar\omega_0 - E_{n0}}{T}\right) \right] \quad (2)$$

коэффициент усиления. Здесь обозначено $\sigma(n, l; E)$ — сечение перехода (1) из связанного состояния U_2 с колебательным и вращательным квантовыми числами n и l в разлетное состояние U_1 (см. рис. 1) молекулы с кинетической энергией разлета E ; μ — приведенная масса молекулы; N^{X} и N^{Y} — концентрации атомов; $E_{n,l}$ — энергия связанного электронно-возбужденного состояния U_2 молекулы, $N_{n,l}^{\text{XY}}$ — заселенность этого состояния. Вращательные и поступательные степени свободы молекул и атомов предполагаются распределенными равновесно с температурой T . Сечение фотодиссоциации (1) связано с вероятностью A_{21} радиационного распада электронно-возбужденного состояния формулой

$$\sigma(n, l; E) = \frac{\lambda^3}{4} A_{21} \hbar Q_l(n, E), \quad (3)$$

где $Q_l(n, E)$ — квадрат интеграла перекрытия радиальных волновых функций $\chi_{n,l}$ и $\chi_{E,l}$ связанного и разлетного состояний. Заметим сразу же, что второй член в квадратных скобках выражения (2), учитывающий индуцированную фотоассоциацию атомов X и Y, для газов пренебрежимо мал, что свидетельствует о легкости получения инверсности.

Поглощение квантов $\hbar\omega_0$ в такой среде чаще всего будет определяться фотоионизацией возбужденных атомов и молекул. В холодном плотном газе с прочными молекулами XY^* концентрации возбужденных атомов

малы. Учет же фотоионизации молекул можно провести, оставаясь в рамках двухуровневой схемы, введением в κ эффективного множителя $F(\omega)$, $0 < F < 1$. Как правило, $F(\omega_0) \simeq 1$.

Будем предполагать, что электронно-возбужденные молекулы возникают в основном за счет реакции

возбужденные же атомы X^* появляются в ходе тройной рекомбинации распадающейся плотной плазмы. Если резонансное излучение атомов заперто в плазме, а энергия первого возбужденного уровня атома X достаточно высока (для несущественности гасящих столкновений), естественно считать реакцию (4) основным каналом исчезновения возбужденных

Рис. 1

атомов X . Эта реакция приводит непосредственно к образованию электронно-возбужденной молекулы XY^* в одном из состояний с колебательно-вращательной энергией, отстоящей от континуума электронного терма $U_2(r)$ на глубину $\ll T$. В результате столкновений молекула переходит затем на более низкие уровни этого терма, радиационно распадаясь с вероятностью A_{21} .

Обозначив $q(n) = \frac{\sum_l N_{n,l}^{XY}}{\sum_{n',l'} N_{n',l'}^{XY}}$ относительную заселен-

ность колебательного уровня n в терме U_2 , оценим значение коэффициента усиления на частоте перехода (1) из наиболее заселенного уровня $n = n^*$: $q(n^*) = \max q(n)$.

Если у молекулы XY^* нижние колебательные уровни электронного терма $U_2(r)$ проектируются на крутой участок разлетного терма $U_1(r)$ (рис. 1а), получаем

$$\kappa = q(n^*) \frac{\lambda^3 N e^3 \alpha \sqrt{\pi \mu \hbar \omega_c} \left[H_{n^*} \left(\frac{\mu \omega_c}{2 \hbar} (r_E - r_c) \right) \right]^2 \exp \left[- \frac{\mu \omega_c}{\hbar} (r_E - r_c) \right]}{2^{n^*+2} n^*! g_2 \left| \frac{dU_1}{dr} (r_E) \right|},$$

где g_2 — статистический вес соответствующего возбужденного состояния атома X . $\hbar \omega_c$ — энергия колебательного кванта вблизи минимума элект-

ронного термина $U_2(r)$, $H_n(x)$ — полином Эрмита, α — коэффициент тройной рекомбинации.

Если же нижние колебательные уровни термина $U_1(r)$ проектируются на пологий участок термина $U_1(r)$ (рис. 1б), то имеем

$$\kappa = \begin{cases} \frac{q(n^*) N_e^3 \alpha}{2 \sqrt{\pi} g_2} \frac{1}{n^*!} \frac{1}{\omega_c} \left(\frac{E}{\hbar \omega_c} \right)^{n^* - 1/2} \exp\left(-\frac{E}{\hbar \omega_c}\right) & \text{при } n^* > 0, \\ \frac{q(n^*) N_e^3 \alpha}{2 \sqrt{\pi} g_2} \frac{1}{\omega_c} \left(\frac{E}{\hbar \omega_c} \right)^{-1/2} \left[1 - \exp\left(-\frac{E}{\pi^2 T}\right) \right] & \text{при } n^* = 0. \end{cases}$$

Существенно, что в оценки κ не вошла вероятность A_{21} радиационного перехода между лазерными уровнями. Это объясняется тем, что при сделанных выше предположениях заселенность верхнего уровня обратно пропорциональна A_{21} .

Для обсуждения активных сред, наряду со сравнительной легкостью достижения инверсии, характерен довольно малый коэффициент усиления. Последнее связано с очень большой шириной линии излучения, роль которой здесь играет величина $[\hbar Q_i(n, E)]^{-1}$. Для «крутого термина» она может составить ~ 1 эв $\simeq 10^{15}$ сек $^{-1}$, для «пологого термина» — существенно меньше — $\sim \hbar \omega_c$, но даже и в этом случае ширина линии примерно в 100–1000 раз больше доплеровской. Тем не менее, при практически осуществимых параметрах плотной интенсивно рекомбинирующей плазмы $N_e \sim 10^{16}$ см $^{-3}$, $T_e \sim 0,3$ эв в случае пологого термина, оценка дает при $q^* \sim 1/10$ значение $\kappa \sim 3 \cdot 10^{-3}$ см $^{-1}$, вообще говоря, достаточное для реализации в лазере обратной связи. Можно утверждать, что для увеличения значения κ целесообразно обратиться к молекулам с термически непрочным (а не чисто разлетным, как здесь) основным состоянием.

Физический институт им. П. Н. Лебедева
Академии наук СССР
Москва

Поступило
3 III 1972