Л. Г. КАРАСЕВА, В. В. ГРОМОВ, академик В. И. СПИЦЫН

СПЕКТРЫ Э.П.Р. γ -ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ СУЛЬФАТА БЕРИЛЛИЯ, ЦИНКА И КАЛЬЦИЯ

В работе (1) было обнаружено, что спектры э.п.р. γ -облученного безводного сульфата кальция сильно отличаются от спектров э.п.р. дигидрата этой соли. Помимо хорошо изученных ион-радикалов SO_4^- и SO_3^- , характерных для безводных солей щелочноземельных элементов (2), наблюдается ряд новых парамагнитных частиц, связанных, очевидно, с кристаллизационной водой. Аналогичные явления отмечены для кристаллогидратов сульфатов бериллия и цинка, которые наряду с $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ были взяты в настоящей работе в качестве новых объектов исследования.

Эксперименты выполнены на полидисперсных образцах $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, BeSO_4 , $\text{ZnSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ и $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Четырехводный сульфат бериллия получался растворением BeO (х.ч.) в концентрированной серной кислоте (о.ч.) с последующей двукратной перекристаллизацией и сушкой на воздухе. Прокаливанием тетрагидрата при 101° в течение 6 час. под вакуумом получали $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Полное обезвоживание сульфата бериллия в вакууме достигалось при 400° . Для приготовления кристаллогидратов сульфатов цинка и кальция использовались дважды перекристаллизованные соответствующие соли марки х.ч.

Облучение всех препаратов проводилось на γ -установке Со-60 ГУРХ-100000 при -196° и комнатной температуре мощностью дозы 1000 р/сек. Мощность дозы определялась по ферросульфатному дозиметру. Спектры э.п.р. записывались на радиоспектрометрах ER-9 (ГДР) и РЭ-1301, g -факторы рассчитывались по ДФПГ с точностью $\pm 0,002$. На рисунках значение $g_{\text{ДФПГ}} = 2,0036$ отмечено вертикальной чертой.

Безводный BeSO_4 . В спектрах э.п.р. безводного сульфата бериллия, облученного при -196° (рис. 1) наряду с ион-радикалами SO_4^- и SO_3^- можно выделить широкий сигнал со слаборазрешенной структурой, состоящей из 4 линий одинаковой интенсивности с максимальным расщеплением 55 ± 2 э и $g = 2,003$. Возможно, наблюдаемые 4 линии относятся к Be^+ , образовавшемуся в результате захвата электрона ионом Be^{2+} (бериллий на 100% состоит из изотопа Be^9 с ядерным спином 3/2). При комнатной температуре данный сигнал не наблюдается и спектр э.п.р. BeSO_4 аналогичен ранее излученным спектрам γ -облученных сульфатов Са, Sr и Ва (2).

Четырехводный сульфат бериллия. На рис. 1 представлен полный спектр γ -облученного при -196° $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Интенсивный дублет с расщеплением 500 ± 3 э по своим радиоспектроскопическим характеристикам относится к атомарному водороду, стабилизированному в решетке кристаллогидрата. Этот сигнал исчезает при $\sim -100^\circ$.

Изменение центральной части спектра, представляющего собой суперпозицию линий, принадлежащих OH - и HO_2 -радикалам, с дозой показано на рис. 2. В случае малых поглощенных доз ($\sim 1 \cdot 10^{19}$ эв/г) спектр состоит из двух хорошо разрешенных сигналов: аксиально симметричного дублета с $g_{\parallel} = 2,018$, $g_{\perp} = 2,009$, $A_{\text{изотр}} = 14 \pm 2$ э и одиночного сигнала $\Delta H = 6 \pm 1$ э, $g = 1,999$. Следует отметить, что кристаллы под облучением окрашиваются в желто-оранжевый цвет. С ростом дозы интенсивность окраски и амплитуда синглета линейно возрастают. При этом интенсивность аксиального дублета также увеличивается, но форма его постепенно искажается за счет

наложения дополнительного сигнала. Начиная с доз $\sim 2 \cdot 10^{20}$ эв/г, этот сигнал становится преобладающим; его параметры имеют следующие значения: $g_{\parallel} = 2,029$, $g_{\perp} = 2,006$, $A_{\parallel} = 15 \pm 3$ э, $A_{\perp} = 6 \pm 3$ э.

По своим радиоспектроскопическим характеристикам аксиальносимметричный дублет совпадает с параметрами ОН-радикала, ранее исследованного в различных матрицах (3). Второй дублет, появившийся при больших дозах, можно приписать HO_2 -радикалу. Термический отжиг ОН-радикалов и переход их в HO_2 - и O_2^- -радикалы подробно изучен на моногидрате суль-

Рис. 1. Спектры э.п.р. γ -облученных и записанных при -196°C сульфатов бериллия: А — безводного, Б — $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

фата лития (4) и в γ -облученных кристаллах $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (5). Вероятно, и в нашем случае под облучением протекает аналогичный процесс. Одиночная линия с $g = 1,999$, очевидно, соответствует стабилизированному электрону (4, 6). Кроме того, при больших поглощенных дозах наряду с продуктами радиолиза кристаллизационной воды в районе $g = 2,003$ появляется сигнал от SO_3^- -ион-радикала.

Спектр э.п.р. γ -облученного $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ при комнатной температуре состоит из синглетта $\Delta H = 4 \pm 1$ э, $g = 2,004$ и двух боковых линий с расщеплением 15 ± 1 э, которые насыщаются по мере увеличения мощности с.в.ч. энергии медленнее, чем центральная линия. Природа указанных боковых линий не совсем ясна, а центральный синглет относится к SO_3^- -ион-радикалу. Окраска кристаллов полностью отсутствует.

Дигидрат сульфата бериллия. Полный спектр э.п.р. $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ при -196° также состоит из дублета, относящегося к атомарному водороду, и большого набора линий в центральной части, которая представлена на рис. 3. Спектр ОН-радикала сильно искажен, даже при самых низких дозах на него накладывается интенсивный дублет с $g_{\parallel} = 2,029$, $A_{\parallel} = 15 \pm 2$ э, $g_{\perp} = 2,006$, $A_{\perp} = 7 \pm 2$ э. Параметры данного сигнала отвечают HO_2 -радикалу, обнаруженному и в $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Характерно, что во всем интервале доз ($1,5 \cdot 10^{19} - 5,5 \cdot 10^{20}$ эв/г) в $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, так же как и в тетрагидрате, наблюдается сигнал с $g = 1,999$, относящийся к стабилизированному электрону. Желтая окраска кристаллов изменяется симбатно с интенсивностью этого сигнала.

При больших поглощенных дозах ($\sim 5,5 \cdot 10^{20}$ эв/г) появляется новый сигнал с $g_1 = 2,05$, $g_2 = 2,013$ и $g_3 = 2,003$, который можно приписать дефекту, связанному с атомами кислорода (типа O^- , O_2^- или O_2^+) (4, 7). При-

рода сигнала с $g = 1,991$, который наблюдается при малых поглощенных дозах ($1,5 - 3 \cdot 10^{19}$ эв/г) и быстро исчезает с дозой, пока не известна.

В отличие от $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ дигидрату свойственная большая степень разложения SO_4^{2-} -ионов под облучением, на что указывает заметное возрастание интенсивности сигнала в области $g = 2,004$, соответствующего SO_3^- -ион-радикалу.

Спектры э.п.р. $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, облученного при комнатной температуре, аналогичны спектрам от $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, полученным в эквивалентных условиях (наблюдаются главным образом продукты разложения сульфат-иона).

Рис. 2

Рис. 2. Изменение центральной части спектра э.п.р. $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ с дозой (в эв/г): 1 — $1,6 \cdot 10^{19}$; 2 — $6,1 \cdot 10^{19}$; 3 — $1,2 \cdot 10^{20}$; 4 — $1,8 \cdot 10^{20}$; 5 — $2,7 \cdot 10^{20}$. Облучение и запись спектров проводились при -196°C

Рис. 3

Рис. 3. Изменение центральной части спектра э.п.р. $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ с дозой (в эв/г): 1 — $1,5 \cdot 10^{19}$; 2 — $5,9 \cdot 10^{19}$; 3 — $2,4 \cdot 10^{20}$; 4 — $5,5 \cdot 10^{20}$. Облучение и запись спектров при -196°C

Кристаллогидраты цинка и кальция. Под действием γ -излучения в этих солях при низких температурах стабилизируются в первую очередь продукты радиолиза кристаллизационной воды: OH^- , HO_2^- и O_2^- -радикалы, которые исчезают при нагревании до комнатной температуры. В спектрах всех соединений присутствует узкая линия $\Delta H = 4 \pm 1$ э с $g = 2,000 \pm 0,001$, относящаяся, очевидно, к стабилизированному электрону.

Радиолиз SO_4^{2-} -ионов идет в незначительной степени. Следует отметить, что с увеличением содержания кристаллизационной воды наблюдается тенденция к снижению радиолиза основных ионов (SO_4^{2-}) кристаллической матрицы. Этот эффект, общий для исследованных солей, может быть связан как с защитным действием молекул кристаллизационной воды, так и с особенностями радиационно-химических процессов в солях облученных сульфатов, протекающих с участием продуктов радиолиза воды.

Изучение закономерностей образования и распада продуктов радиолиза кристаллогидратов различных типов солей требует дополнительного тща-

тельного исследования, так как это может способствовать выяснению роли кристаллизационной воды в процессах радиолиза кристаллических соединений.

Институт физической химии
Академии наук СССР
Москва

Поступило
7 III 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Викт. И. Спицын, В. В. Громов, Л. Г. Карасева, ДАН, **159**, 178 (1964).
² Л. Г. Карасева, Кандидатская диссертация, М., 1969. ³ П. Эткинс, М. Саймонс, Спектры Э.П.Р. и строение неорганических радикалов, М., 1970, стр. 120.
⁴ L. Aseltine, J. W. Kim, J. Phys. Chem. Solids, **29**, 531 (1968). ⁵ R. C. Catton, M. C. R. Symons, J. Chem. Soc. A, **1969**, 446, 1393. ⁶ P. E. Wigen, J. A. Cowen, Phys. Chem. Solids, **17**, 26 (1960). ⁷ C. Jaccard, Phys. Rev., **124**, 60 (1961).