О. Я. КОРОЛЕВА, Д. И. САПОЖНИКОВ

О БЫСТРОЙ И МЕДЛЕННОЙ РЕАКЦИЯХ ЭПОКСИДАЦИИ ЗЕАКСАНТИНА В ВИОЛАКСАНТИНОВОМ ЦИКЛЕ

(Представлено академиком А. И. Белозерским 27 IV 1972)

На свету в зеленой пластиде совершается реакция дезэпоксидации виолаксантина. При выключении света в результате реакции эпоксидации содержание виолаксантина достигает исходного темнового уровня. Реакция эпоксидации в темноте протекает довольно длительное время (¹, ²). Кривая, отражающая ход реакции эпоксидации, имеет вид гиперболы. Мы предположили, что этот факт можно объяснить существованием двух протекающих с различной скоростью реакций эпоксидации. С целью проверки этого предположения было проведено детальное изучение кинетики реакции эпоксидации.

Объектами исследования служили высежки из листьев гортензии (*Hydrangea hortensis* L.) и пализоты (*Palisita mannii* Cl.), выращенных в оранжерее Ботанического института АН СССР. Высежки листьев выдерживали в темноте 1 час. для получения выравненного материала, после чего одна проба бралась для анализа (исходный темновой вариант). Освещение проб проводили на световой установке, где источником света была лампа накаливания ЗН-8, мощностью 300 вт. Освещенность составляла 40 тыс. люксов, длительность экспозиции — 20 мин. По окончании освещения одну пробу брали в анализ для определения реакции дезэпоксидации (световой вариант), остальные пробы помещались в темноту, и через определенные промежутки времени отдельные пробы фиксировали для последующего анализа. Фиксация проб проводилась этанолом, охлажденным твердой углекислотой до -70° . Содержание ксантофиллов определяли с помощью принятого в нашей лаборатории метода хроматографии в тонком слое (³).

Результаты опытов по исследованию кинетики реакции эпоксидации представлены на рис. 1. Мы видим, что в течение первых 30 сек. после выключения света продолжается реакция дезэпоксидации. Затем наблюдается быстрое изменение содержания ксантофиллов, соответствующее реакции эпоксидации. Это колебание имеет максимум при односторонней темновой экспозиции, и ко второй минуте оно затухает. Некоторое время (до 5 мин.) содержание пигментов не изменяется, а затем начинается обычная медленная реакция эпоксидации зеаксантина, которая наблюдается в течение 60 мин.

Резко отличный характер двух участков кривой, отражающей изменения содержания ксантофиллов после выключения света, подтверждает высказанное ранее предположение о существовании двойного рода реакций эпоксидации.

На основании работы Хагера (⁴) было известно, что *n*-хлормеркурибензоат (*n*-ХМБ) не оказывает ингибирующего действия на реакцию эпоксидации. К сожалению, в этой работе не было указано время осуществления реакции эпоксидации; насколько можно судить по другой работе Хагера (²), автор не изучал эпоксидацию при выдерживании в темноте в течение времени короче 2 мин.

Поэтому мы решили испытать действием *n*-ХМБ на быструю реакцию эпоксидации (рис. 1, В).

Как видно из графика, примененный ингибитор сводит на нет колебание содержания ксантофиллов, наблюдаемое на первых двух минутах после выключения света. При этом отмечается некоторое усиление последующего действия света в течение первых 30 сек. темноты, а также усиление пря-

Рис. 1. Кинетика реакций виолаксантинового цикла в листьях гортензии. А — вода, Б — *n*-ХМБ (10^{-4} мол/л)

мой реакции. На медленную обратную реакцию эпексидации *n*-ХМБ не оказывал влияния.

Известно, что ингибирующее действие *n*-ХМБ на сульфгидрильные группы ферментов снимается цистеином (^{5, 6}). Чтобы убедиться в том, что *n*-ХМБ специфически тормозил в наших опытах ферментативную реакцию, осуществляющую быструю эпексидацию, мы поставили следующий опыт. Пробы, профильтрованные *n*-ХМБ, помещали на раствор цистеина (10^{-5} *N*) за 30 мин. перед освещением. Как видно из рис. 2, колебание быстрой обратной реакции, подавленное *n*-ХМБ, восстанавливается при введении цистеина. При этом происходит сдвиг по фазе колебания с первой минуты темноты на вторую. Из результатов этих опытов можно сделать вывод, что быструю обратную реакцию осуществляет ферментная система, для функционирования которой важную роль играют сульфгидрильные группы.

Так как *n*-ХМБ ингибировал быструю обратную реакцию и не влиял на медленную, мы предположили, что характер этих реакций различен. В связи с этим представлялось важным испытать действие ингибитора

медленной обратной реакции — салицилальдоксима (СА) на быструю обратную реакцию. Ингибитор в концентрации $5 \cdot 10^{-3}$ мол/л инфильтрировали в пробы за 30 мин. перед освещением. Результаты этой серии опытов представлены на рис. 3, из которого видно, что в присутствии СА быстрая эпексидация происходила более интенсивно и при этом наблюдалось некоторое подавление реакции дезэпексидации.

Таким образом, на основании результатов настоящей работы можно прийти к заключению о том, что в осуществлении виолаксантинового

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 2. Снятие цистеином ингибирующего действия *n*-ХМБ на быструю реакцию эпексидации в листьях гортензии. *а* — вода, *б* — *n*-ХМБ (10^{-4} мол/л), *в* — *n*-ХМБ (10^{-4} мол/л) + цистеин (10^{-3} мол/л)

Рис. 3. Действие салицилальдоксима на быструю реакцию эпексидации в листьях пализоты. *а* — вода, *б* — СА ($5 \cdot 10^{-3}$ мол/л)

цикла могут участвовать две реакции эпексидации. Эти реакции отличаются как по скорости, так и по чувствительности к различным ингибиторам.

Для осуществления виолаксантинового цикла необходимо, чтобы на свету происходила постоянная регенерация эпексидных групп. Такая регенерация обеспечивается, по всей вероятности, быстрой эпексидацией. Совокупность реакций эпексидации и дезэпексидации образует циклический процесс, имеющий на свету автоколебательный характер. После выключения света происходит затухание колебаний; в темноте в течение некоторого времени наблюдаются индуцированные светом реакции превращения ксантофиллов. В условиях наших опытов нам удалось зарегистрировать одно из таких колебаний, приходящееся на период времени, равный одной-двум минутам. К этому времени, по-видимому, прекращается последствие света и эпексидация начинает осуществляться за счет чисто темновых процессов.

Дальнейшие исследования с помощью более чувствительных методов должны позволить обнаружить индуцированные светом колебания с меньшим периодом времени.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова
Академии наук СССР
Ленинград

Поступило
24 IV 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Д. И. Саножников, Т. А. Красовская, А. Н. Маевская, ДАН, 113, 2, 456 (1957). ² A. Hager, Planta (Berl.), 74, 2, 148 (1967). ³ Г. А. Корнюшенко, Д. И. Саножников, В сборн. Методы комплексного изучения фотосинтеза, Л., 1969. ⁴ A. Hager, Ber. Deutsch. bot. Ges., 79, II, 11, 94 (1966). ⁵ E. S. G. Varon, S. Levine, Arch. Biochem. and Biophys., 41, 175 (1952). ⁶ W. A. Bulen, Arch. Biochem. and Biophys., 62, 173 (1956).