М. Я. МЕЛЬНИКОВ, Л. М. БАЙДЕР, Н. В. ФОК

ФОТОЛИЗ АЛИФАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ ПРИ 77° К

(Представлено академиком Н. М. Эмануэлем 31 III 1972)

В данной работе методом э.п.р. с использованием масс-спектрометрического анализа газовых продуктов (H_2 , CO , CH_4) исследован механизм прямого и сенсibilизированного ароматическими соединениями (трифениламин, нафталин) фотолиза алифатических альдегидов в твердой фазе при 77° К. Работы по фотолизу алифатических альдегидов в твердой фазе в литературе практически отсутствуют, хотя процессы эти хорошо изучены для газовой и жидкой фазы (^{1, 2}).

Нами был изучен фотолиз при 77° К уксусного (УА), пропионового (ПА), изомасляного (ИМА), изовалерианового (ИВА) и триметилуксусного (ТМА) альдегидов. Чистота использованных соединений контролировалась спектрофотометрически и методом газо-жидкостной хроматографии и составляла не менее 99%. Концентрация сенсibilизаторов составляла 10^{-2} — 10^{-3} мол/л. Облучение образцов, обезгаженных до давления 10^{-3} мм рт. ст., проводилось в кварцевых ампулах светом ртутной лампы ДРШ-500. Для выделения отдельных областей спектра использовались стеклянные светофильтры. Запись спектров э.п.р. производилась на радиоспектрометре Е-3 фирмы «Varian» (в отдельных случаях облучение производилось непосредственно в резонаторе прибора Е-3 или в криостате при повышенной температуре).

При исследовании зависимости скорости накопления радикалов от интенсивности света ($260 \leq \lambda \leq 380$ мк) было установлено, что в исследованных системах имеют место двухквантовые сенсibilизированные ароматическими соединениями реакции.

Данные, полученные методом э.п.р., показывают, что прямой и сенсibilизированный ароматическими соединениями фотолиз алифатических альдегидов при 77° К приводит к одним и тем же радикальным продуктам. При облучении всех исследованных альдегидов светом с $260 \leq \lambda \leq 380$ мк оказалось, что спектры э.п.р. идентичны и представляют собой синглетные линии (рис. 1) шириной 13—16 э и g -фактором ($\sim 2,001$), меньшим g -фактора свободного электрона. Эти спектры естественно отнести к радикалам типа $R-\dot{C}=O$, образующихся при отрыве атома водорода от альдегидной группы.

Анализ газовых продуктов позволил зафиксировать при прямом и сенсibilизированном фотолизе альдегидов водород.

Таким образом, в отличие от процессов фотолиза алифатических альдегидов в газовой и жидкой фазе (^{1, 2}), их прямой и сенсibilизированный фотолиз в твердой фазе сопровождается в первичном акте отрывом атома водорода от альдегидной группы.

Известно (³⁻⁶), что радикалы типа $R-\dot{C}=O$ имеют полосы поглощения в длинноволновой области и при действии видимого света фотолизуются с образованием углеводородных радикалов. В настоящей работе также было обнаружено, что во всех альдегидах радикалы $R-\dot{C}=O$ чувствительны к действию видимого света.

При действии света с $\lambda \geq 400$ мк на радикалы типа $R-\dot{C}=O$ в ПА, ИВА, ТМА в спектрах э.п.р. наблюдаются изменения, связанные с появлением соответствующих углеводородных радикалов (рис. 2 б, г, д):

В случае ИМА последующее облучение образца светом с $\lambda \geq 400$ мк приводит к превращению радикала $(CH_3)_2CH\dot{C}O$ в основном в радикал $(CH_3)_2\dot{C}CHO$ (рис. 2в), спектр э.п.р. которого представляет собой септет с расщеплением между компонентами ~ 20 э и соотношением интенсивностей, близким к биномиальному. В литературе (7) есть данные о возможности изомеризации радикалов типа $R-\dot{C}=O$, однако анализ газо-

Рис. 1. Спектры э.п.р. после действия света с $260 \leq \lambda \leq 380$ мк при 77° К. а — УА, б — ПА, в — ИМА, г — ИВА, д — ТМА

Рис. 2. Спектры э.п.р., полученные при последующем действии света с $\lambda \geq 400$ мк. а — УА, б — ПА, в — ИМА, г — ИВА, д — ТМА

вых продуктов в ИМА показал наличие в образцах окиси углерода, количество которой увеличивалось при последующем облучении светом с $\lambda \geq 400$ мк. Таким образом, в ИМА протекает фотолиз радикала $(CH_3)_2CH\dot{C}O$ с образованием радикала $(CH_3)_2\dot{C}H$, который вступает в реакцию с молекулой альдегида, приводя к образованию радикала $(CH_3)_2\dot{C}CHO$.

В случае УА при последующем облучении образца в резонаторе э.п.р. спектрометра светом с $\lambda \geq 400$ мк в спектре были зафиксированы метильные радикалы $\dot{C}H_3$, которые быстро гибнут в поликристаллической матрице. При исследовании X-облученных растворов CH_3J в УА (соотношение $CH_3J/УА$ изменялось от 9 : 1 до 1 : 9 по объему) в спектре э.п.р. наблюдается синглетная линия с g -фактором ($\sim 2,001$), принадлежащая радикалу $\dot{C}H_3\dot{C}O$. Это указывает на то, что реакция метильных радикалов с атомом водорода в альдегидной группе является основным процессом, приводящим к их гибели:

Необходимо отметить, что ни в одном из исследованных альдегидов не удается полностью фотолизировать радикал $R-\dot{C}=O$. По-видимому, это связано с реакцией алкильного радикала с атомом водорода в альдегидной группе, а также с протеканием обратной реакции присоединения молекулы CO к углеводородному радикалу (4-6).

В УА и ПА, так же как и в ИМА, алкильные радикалы, образующиеся при фотолитизе радикалов $R-\dot{C}=O$, помимо реакции с атомом водорода в альдегидной группе могут отрывать атом водорода от углеродного атома, находящегося в α -положении по отношению к карбонильной группе (рис. 2 а, б):

При этом с повышением температуры в определенном интервале и одновременным облучением светом $\lambda \geq 400$ мк эти реакции становятся преобладающими (рис. 3 а, б). Спектр э.п.р. образующегося в ПА радикала $CH_3\dot{C}HCHO$ представляет собой квинтет линий с расщеплением между компонентами ~ 20 э и соотношением интен-

Рис. 3. Спектры э.п.р., полученные при последующем действии света с $\lambda \geq 400$ мк при повышенной температуре. а — ПА при 108° К, б — ИМА при 97° К, в — ИВА при 113° К

Рис. 4. Спектры э.п.р. до (а, в) и после (б, з) облучения светом $\lambda \geq 320$ мк (4 мин.). а, б — ПА, в, з — ИМА

сивностей, близким к биномиальному (спектр э.п.р. образующегося в УА радикала $\dot{C}H_2CHO$ не удается получить в чистом виде).

В ИВА и ТМА образующиеся при фотолитизе алкильные радикалы не вступают в подобные реакции. При повышении температуры и одновременном облучении светом $\lambda \geq 400$ мк в ИВА наблюдается спектр э.п.р. изобутильного радикала, представляющий собой квинтет линий с расщеплением ~ 20 э и соотношением интенсивностей 1 : 2 : 2 : 2 : 1 (рис. 3 в).

Радикалы отрыва атома водорода от углеродного атома, находящегося в α -положении к карбонильной группе, образующиеся в ПА и ИМА, фотолитизируются под действием света с $\lambda \leq 340$ мк, приводя к появлению в спектре э.п.р. компонентов соответствующих алкильных радикалов. Фотолитиз не сопровождается заметным изменением числа свободных валентностей и протекает, по-видимому, по следующему механизму:

Вероятно, что подобный процесс протекает и в УА:

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступило
28 III 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Д. Калверт, Д. Питтс, Фотохимия, М., 1968, стр. 294. ² The Chemistry of the Carbonyl Group, 1, N. Y., 1966, p. 825. ³ S. Noda, K. Fueki, Z. Kuri, J. Chem. Phys., 49, № 7, 3287 (1968). ⁴ G. Chachaty, A. Forchioni, J. chim. phys., 66, № 5, 929 (1969). ⁵ В. С. Червоненко, В. А. Рогинский, С. Я. Пшежецкий, Хим. высоких энергий, 4, № 5, 450 (1970). ⁶ В. С. Червоненко, В. А. Рогинский, Хим. высоких энергий, 5, № 5, 476 (1971). ⁷ J. Pama, K. Shikohara, Mol. Phys., 18, № 2, 279 (1970).