А. И. КОНОВАЛОВ, Я. Д. САМУИЛОВ, Е. А. БЕРДНИКОВ,
В. В. ПЛЕМЕНКОВ

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦИКЛОНОВ В РЕАКЦИИ
ДИЕНОВОВОГО СИНТЕЗА С МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ

(Представлено академиком Б. А. Арбузовым 19 VI 1972)

В настоящее время признается существование двух типов реакции диенового синтеза: диен-донор, диенофил-акцептор и диен-акцептор, диенофил-донор. Некоторые литературные данные позволяли считать, что циклоны в реакции диенового синтеза выступают как диены-доноры (1). Проведенное нами изучение реакционной способности цианоэтиленов (2) и арилмалеинимидов (3) в реакции с фенциклоном показало, что в реакциях с диенофилами акцепторного типа циклоны, скорее всего, выступают как диены-доноры. Правда, при этом проявляются некоторые особенности реакций с циклонами, в частности, повышенная чувствительность к асимметрии кратной связи диенофила (2) и индуктивная передача влияния заместителей через ароматическое кольцо арилмалеинимидов (3), что может быть обусловлено «поздним» переходным состоянием (по сравнению с «обычными» диенами, например, циклопентадиеном). Чтобы более детально исследовать электронный характер циклонов в диеновом синтезе, мы в настоящей работе изучили реакционную способность ряда циклонов с малеиновым ангидридом и сравнивали с их электронодонорными и электроноакцепторными свойствами. Для этого были определены сродство к электрону и относительные π -электронные потенциалы ионизации рассматриваемых циклонов.

Константы скорости реакций второго порядка (k_2) вычисляли из констант псевдопервого порядка, определенных графическим методом по изменению поглощения растворов кинетических опытов при длинах волн 650–700 м μ в термостатированных кюветах спектрофотометра Спектротом-201. Поглощение растворов обусловлено циклонами. Малеиновый ангидрид и аддукты в этой области спектра прозрачны. Концентрации малеинового ангидрида 0,7–1,0 мол/л, циклонов 10^{-4} – 10^{-5} мол/л. Растворитель — диоксан. Температура $40,0 \pm 0,1^\circ \text{C}$.

Таблица 1

Реакционная способность и донорно-акцепторные свойства циклонов

№ п.п.	Циклон	$k_2 \cdot 10^4$, л/мол·сек	$E_{1/2}$, в	E_A , эВ	$\lambda^{\pi \rightarrow \pi^*}$, м μ	$E^{\pi \rightarrow \pi^*}$, эВ	π $I_{\text{отн}}$, эВ
1	Фенциклон	$31,4 \cdot 10^4$	-0,548	0,82	301	4,12	4,94
2	3,4-ди-(<i>n</i> -метоксифенил)-2,5-дифенилциклопентадиенон	86,5	-0,785	0,57	375	3,30	3,87
3	2,3,4,5-тетрафенилциклопентадиенон(тетрациклон)	38,0	-0,734	0,63	342	3,62	4,25
4	3,4-ди-(<i>n</i> -бромфенил)-2,5-дифенилциклопентадиенон	36,0	-0,650	0,71	343	3,61	4,32
5	3,4-ди-(<i>n</i> -хлорфенил)-2,5-дифенилциклопентадиенон	22,8	-0,620	0,74	341	3,63	4,37
6	Ацециклон	14,7	-0,668	0,70	333	3,72	4,42

Сродство к электрону циклонов определяли в соответствии с уравнением (4)

$$E_A = 1,04E_{1/2} + 1,39,$$

где E_A — сродство к электрону, $E_{1/2}$ — потенциал полуволны восстановления циклона относительно насыщенного каломельного электрода. Поляррографирование вели в диметилформамидных растворах на фоне водистого тетраметиламмония с донной ртутью в качестве анода, потенциал которого определялся относительно насыщенного каломельного электрода. Циклоны в этих условиях дают две одноэлектронные диффузионные волны, причем первая волна обратима и соответствует образованию анион-радикала (5):

Относительные значения первых π -электронных потенциалов ионизации циклонов $I_{\text{отн}}^{\pi}$ вычисляли по уравнению

$$I_{\text{отн}}^{\pi} = E^{\pi \rightarrow \pi^*} + E_A,$$

которое следует из соотношения (6, 7)

$$E^{\pi \rightarrow \pi^*} = E_{\text{нсо}} - E_{\text{нсо}} - E_{\text{взо}} - C,$$

при $E_{\text{нсо}} = -E_A$, $E_{\text{взо}} = -I_1^{\pi}$ (6) и постоянстве C , что оправдано для серии родственных соединений одинаковой симметрии (7, 8). $E^{\pi \rightarrow \pi^*}$ — энергия $\pi \rightarrow \pi^*$ -перехода, $E_{\text{нсо}}$ — энергия нижней свободной орбитали, $E_{\text{взо}}$ — энергия высшей занятой орбитали, I_1^{π} — первый π -электронный потенциал орбитали, $I_{\text{отн}}^{\pi} = I_1^{\pi} - C$. $E^{\pi \rightarrow \pi^*}$ соответствуют максимумам длинноволновых полос в у.-ф. спектрах поглощения циклонов (9).

Полученные результаты суммированы в табл. 1. Из этих данных, а также рис. 1, где проведено сопоставление $\lg k_2$ и $I_{\text{отн}}^{\pi}$ циклонов 2—5, видно, что реакционная способность циклонов соответствует их электронодонорным, а не электроноакцепторным свойствам. Следовательно, в реакции диенового синтеза с малеиновым ангидридом циклоны выступают как диены-доноры. Резкое увеличение реакционной способности при переходе от тетрациклонов к фенциклону обусловлено, на наш взгляд, различными энергиями локализации этих систем: при образовании аддуктов в случае тетрациклонов возникает цис-стильбеновая структура, а в случае фенциклона — фенантреновая. Энергии локализации, наряду с донорно-акцепторными свойствами аддендов, являются факторами, определяющими их реакционную способность (10).

В заключение приносим глубокую благодарность акад. Б. А. Арбузову за внимание к работе и обсуждение ее результатов.

Казанский государственный университет
им. В. И. Ульянова-Ленина

Поступило
14 VI 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Химия алкенов, ред. С. Потап, Л., 1969, стр. 567. ² А. И. Коновалов, Я. Д. Самуилов, З. Г. Хайруллин, Журн. орг. хим., 8, 229 (1972). ³ А. И. Коновалов, Я. Д. Самуилов, ДАН, 204, 359 (1972). ⁴ G. Briegleb, Angew. Chem., Intern. Ed., 3, 617 (1964). ⁵ P. A. Civen, M. E. Peover, J. Chem. Soc., 1960, 465. ⁶ T. Koornans, Physica, 1, 104 (1933). ⁷ Т. Пикок, Электронные свойства ароматических и гетероциклических молекул, М., 1969. ⁸ J. Barriol, J. Regnier. In: Advances in Chem. Phys., 8, 1965. ⁹ M. A. Ogliaruzo, M. G. Romanelli, E. J. Beecker, Chem. Rev., 65, 261 (1965). ¹⁰ А. И. Коновалов, Журн. орг. хим., 5, 1713 (1969).

Рис. 1. Корреляция между реакционной способностью циклонов в реакции диенового синтеза с малеиновым ангидридом ($\lg k_2$) и их электронодонорными свойствами ($I_{\text{отн}}^{\pi}$). Номера точек соответствуют наименованиям циклонов в табл. 1