В. И. МОРОЗ, А. Э. НАДЖИП, А. Б. ГИЛЬВАРГ, Ф. А. КОРОЛЕВ, В. С. ЖЕГУЛЕВ
**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ
H₂O В АТМОСФЕРЕ МАРСА НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
МЕЖПЛАНЕТНОЙ СТАНЦИИ МАРС-3**

(Представлено академиком Г. И. Петровым 28 VI 1972)

На автоматических межпланетных станциях (АМС) Марс-2 и Марс-3 (искусственные спутники Марса) установлен прибор ИВ-2, предназначенный для измерения содержания водяного пара в атмосфере планеты. Такие измерения имеют следующие серьезные преимущества по сравнению с наземными наблюдениями (¹⁻⁷): 1) измерения ведутся с близкого расстояния (1000—1500 км в перицентре орбиты) и пространственное разрешение составляет около 5—10 км, на два порядка лучше, чем с Земли; 2) полностью снимаются все трудности, связанные с теллурическим поглощением, и могут измеряться меньшие количества H₂O, чем с Земли.

Прибор ИВ-2 (рис. 1) измеряет содержание H₂O в атмосфере Марса по величине поглощения в центре полосы 1,38 м. Полоса H₂O $\lambda = 1,38$ м образуется в спектре отраженного солнечного излучения и ее эквивалентная ширина практически не зависит от вертикального распределения температуры в атмосфере планеты. В этом состоит принципиальное отличие ИВ-2 от прибора «Ирис», используемого для той же цели на американской станции Маринер-9 (⁸). «Ирис» регистрирует вращательную полосу H₂O в области 25—50 м, интенсивность которой настолько сильно зависит от вертикального распределения температуры, что полоса может наблюдаться и в поглощении, и в эмиссии (⁹).

Так как ожидаемая эквивалентная ширина даже наиболее сильных линий в центре полосы 1,38 м в спектре Марса мала, для ее измерения используется модуляционный метод. Интерференционно-поляризационный фильтр, состоящий из пластины исландского шпата (двупреломляющий кристалл 5) и двух поляризаторов (4, 6), и интерференционный фильтр 3 выделяют три линии в центре полосы: 13788, 13807 и 13827 Å. При вращении второго поляризатора 6 максимумы пропускания интерференционно-поляризационного фильтра периодически сменяются минимумами и интенсивность на выходе прибора при наличии линий поглощения оказывается модулированной. Амплитуда модулированной составляющей сигнала зависит от энергии, поглощенной в линиях. Оптическая схема и электронная блок-схема фотометра приводятся на рис. 1; объектив кассегреновский, диаметр 80 мм, светосила 1 : 20, угловое поле зрения 0,005 радиан (6 км при расстоянии 1500 км); приемник излучения — сернисто-свинцовое фотосопротивление.

Неподвижный поляризатор 4 ориентирован по отношению к главной оси двупреломляющего кристалла 5 под углом, несколько отличающимся от 45°. В результате появляется вторая модулированная компонента, амплитуда которой определяется, главным образом, непрерывным спектром. Существенно, что по фазе она сдвинута на 90° по отношению к первой и соответствующие электрические сигналы легко разделяются фазовыми детекторами 12, 12'. На выходе прибора измеряются два напряжения, отношение которых зависит от эквивалентной ширины линий поглощения. Для проверки работы прибора в полете служит контрольная лампа 19, которая

включается на несколько минут перед пересечением оптической осью лимба планеты и после прохождения терминатора.

Прибор калибровался в лаборатории с помощью лампы с матовым стеклом, сигналы от которой измерялись при различных расстояниях до прибора. Влажность в помещении контролировалась. Был установлен коэффициент пропорциональности между отношением выходных напряжений n и

Рис. 1. Оптическая схема и электрическая блок-схема прибора ИВ-2. 1 — герметичное окно, 2 — кассегреновский телескоп, 3 — интерференционный фильтр, 4 — неподвижный поляризатор, 5 — двупреломляющий кристалл, 6 — вращающийся поляризатор, 7 — датчик положения поляризатора, 8 — фильтр Si, 8' — фильтр ADP, 9 — линза Фабри, 10 — PbS-фотосопротивление, 11 — предварительный усилитель, 12, 12' — фазовые детекторы, 13, 13' — усилитель постоянного тока, 14, 14' — выходы на телескопию, 15 — стабилизатор скорости вращения поляризатора, 16 — преобразователь напряжения, 17 — схема стабилизации температуры кристалла, 18 — бортовое питание, 19 — контрольная лампа

Рис. 2. Содержание H_2O , фотометрический разрез и яркостная температура поверхности вдоль трассы 16 II 1972. По оси абсцисс t — местное время на Марсе, T — московское время, φ — широта, λ — долгота подспутниковой точки

эквивалентной шириной W линии 13827 Å. Для этой линии зависимость интенсивности от количества водяного пара на луче зрения u была вычислена для давления $p = 13$ мбар и уширения молекулами CO_2 в работе (10). Мы экстраполировали эти данные к марсианской атмосфере, предполагая, что она состоит из чистого CO_2 , эффективное давление равно 3 мбар (поло-

вина поверхностного) и что эквивалентная ширина подчиняется закону

$$W \propto u^{0,5} p^{0,3}, \quad (1)$$

найденному в работе ⁽¹¹⁾ для всей полосы в целом.

Полученная этим способом калибровочная кривая является предварительной и будет в дальнейшем уточняться дополнительными расчетами и лабораторными измерениями. Нижний предел содержания водяного пара, который может быть обнаружен прибором ИВ-2, составляет около 0,5 μ осажденной воды на луче зрения. Количество водяного пара в вертикальном столбе равно

$$u_0 = u / \eta, \quad (2)$$

где η — воздушная масса, а нижний предел u_0 составляет около 0,1 — 0,2 μ . Это намного лучше, чем получается при наблюдениях с Земли посредством больших телескопов и кудэ-спектрографов (инструментальный предел по u_0 около 10 μ осажденной воды). Во время измерений оптическая ось прибора остается параллельной самой себе. Перед прохождением АМС перигентра она входит на лимб в южном полушарии и пересекает планету по трассе, идущей на север с некоторым наклоном к меридиану (см. ⁽¹¹⁾, рис. 1).

Обработка измерений, полученных к настоящему моменту, проведена лишь частично. Ниже приводятся результаты, полученные на АМС Марс-3. Период обращения его составлял около 12 суток. Прибор включался во время прохождений перигентра 15 и 27 XII 1971, 9 I, 3 II, 16 II, 28 II и 12 III 1972 и нормально функционировал в течение каждого сеанса. Сеанс измерений 12 III проводился не по обычной программе, приборы были включены после пересечения лимба и выключены до пересечения терминатора, поэтому отсутствует контроль нуля-пункта и чувствительности, однако эти величины были восстановлены по корреляции между ними и температурой, найденной из предыдущих измерений.

На рис. 2 показано распределение H_2O вдоль трассы. Кривая u_0 дает содержание H_2O в вертикальном столбе. Эта величина нигде не превышает 8 μ ($u = 8 \cdot 10^{-4}$ г·см⁻²) осажденной воды, а в области полярной шапки падает ниже 1 μ .

Здесь же показаны яркостные температуры T_v , измеренные инфракрасным радиометром Марса-3, и фотометрический профиль B в непрерывном спектре в области 1,38 μ . На широтах около 50° трасса вступает в область северной полярной шапки и водяной пар здесь практически исчезает. Аналогичная кривая была ранее опубликована для трассы 28 II 1972 ⁽¹¹⁾.

В сеансе 12 III 1972 содержание H_2O достигло величины 25 μ , на всех предыдущих трассах оно оказалось меньше 8 μ . Здесь же в некоторых случаях даны инфракрасные яркостные температуры по измерениям с инфракрасным радиометром вдоль тех же трасс ⁽¹²⁾. Внутренняя точность измерений содержания H_2O в вертикальном столбе находится в пределах от $\pm 0,3$ до $\pm 0,5$ μ осажденной воды.

На трассах 15 XII и 27 XII имело место видимое уменьшение H_2O к экватору. Оно объясняется, вероятно, тем, что эти измерения проводились во время пылевой бури; мощность пылевых облаков возрастает к экватору и в низких широтах они больше ослабляют полосы поглощения.

Рис. 3. Определения содержания H_2O по наземным наблюдениям и измерениям с борта АМС Марс-3. Треугольники — максимальное содержание H_2O , измеренное по каждой из трасс АМС Марс-3, остальные точки — наземные наблюдения по ⁽³⁾

В некоторых случаях имеется тенденция к уменьшению, иногда до 2 раз, количества H_2O над темными областями по сравнению с соседними континентами. Не обнаружено каких-либо малых областей («оазисов») с повышенной влажностью атмосферы. Содержание H_2O , измеренное с декабря по февраль, является необычно малым даже для такой сухой планеты, как Марс. На рис. 3 приводятся совместно результаты наземных определений содержания H_2O в 1963—65 гг. и наших в зависимости от ареоцентрической долготы Солнца L_s ($L_s = 0$ соответствует весеннему равноденствию в северном полушарии). Наземные определения дают от 10 до 50 μ осажденной воды, в некоторых случаях получается только верхняя граница. Этот разброс, без сомнения, отражает реальную переменность содержания H_2O в марсианской атмосфере.

Инфракрасные температуры, приведенные на рис. 2, относятся к поверхности и не позволяют непосредственно судить об относительной влажности. Если принять температуру атмосферы равной $200^\circ K$, то 10 μ осажденной воды соответствуют относительной влажности 3%. Насыщение достигается только в области северной полярной шапки, где температуры атмосферы существенно ниже.

По-видимому, уменьшенным содержанием H_2O в атмосфере можно объяснить падение плотности водородной короны Марса в период наблюдений по сравнению с 1969 г., когда она измерялась на Маринерах 6 и 7⁽¹³⁾.

Оценки содержания H_2O по измерениям на Маринере 9 опубликованы лишь в очень отрывочной форме, но те, что нам известны^(9, 14), также говорят об очень малой влажности марсианской атмосферы в период наблюдений.

Кроме содержания H_2O в атмосфере, прибор ИВ-2 дает детальные фотометрические разрезы (рис. 2, В). Результаты будут опубликованы.

Авторы выражают благодарность В. Г. Буткевичу, В. Г. Бухину, Г. А. Казанцеву, А. Ю. Клементьевой, Ю. А. Малюгину, Т. Ф. Мещеряковой, К. А. Цюю и остальным лицам, оказавшим существенную помощь на различных этапах выполнения этой работы.

Поступило
29 V 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ L. D. Kaplan, G. Münch, H. Spinrad, *Astrophys. J.*, **139**, 1 (1964).
² R. A. Schorn, H. Spinrad et al., *Astrophys. J.*, **147**, 743 (1967). ³ R. A. Schorn, *Planetary Atmospheres*, 1974, p. 223. ⁴ S. J. Little, *ibid.*, p. 241.
⁵ R. G. Tull, *ibid.*, p. 237. ⁶ R. A. Schorn, C. B. Farmer S. J. Little, *Icarus*, **11**, 283 (1969). ⁷ T. Owen, H. P. Mason, *Science*, **165**, 893 (1969). ⁸ R. A. Hanel et al., *Icarus*, **12**, 48 (1970). ⁹ R. A. Hanel, B. J. Conrath et al., *Science*, **175**, 305 (1972). ¹⁰ C. B. Farmer, D. D. La Porte, *Icarus*, **16**, 34 (1972). ¹¹ В. И. Мороз, Л. В. Ксанфомалити, Доклад, представленный XV конгрессу КОСПАР, 1972 (препринт № Д142, ИКИ АН СССР). ¹² В. И. Мороз, Л. В. Ксанфомалити и др., *ДАН*, **208**, № 2 (1973). ¹³ В. Г. Курт и др., Доклад представленный XV конгрессу КОСПАР, 1972. ¹⁴ E. Burgess, *New Scientist*, 24 Febr., 1972.