А. С. САЙДОВ, В. В. ПОЛЕВОЙ, А. М. МАХЛИНА

**ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО И ДАЛЬНОГО КРАСНОГО СВЕТА
НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И СОДЕРЖАНИЕ СУЛЬФИДРИЛЬНЫХ ГРУПП
В ИЗОЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ ЭТИОЛИРОВАННЫХ
ПРОРОСТКОВ МАША (*PHASEOLUS AUREUS* ROXB.)**

(Представлено академиком М. Х. Чайлазяном 18 VI 1972)

За последнее десятилетие установлено, что в растительных тканях присутствует хромопротеид фитохром, обратимо изменяющийся под действием красного (к.с.) и дальнего красного (д.к.с.) света, причем его активная форма (Φ_{730}) оказывает влияние на многие физиолого-биохимические и морфогенетические процессы (1-7). Предложено несколько гипотез, объясняющих механизм действия фитохрома на обмен веществ растительных тканей. В частности, имеются предположения, что активная форма фитохрома может функционировать в качестве восстанавливающей системы (8).

В нашей работе изучалось влияние к.с. ($10,7 \cdot 10^3$ эрг/(см²·сек)) и д.к.с. ($17 \cdot 10^4$ эрг/(см²·сек)) на Eh, pH и содержание свободных и связанных SH-групп в изолированных первичных листочках 5-дневных этиолированных проростков маша. Условия выращивания материала и постановка опытов описаны ранее (9). Листья (1 г) гомогенизировали с 15 мл дистиллированной H₂O и в полученной водной суспензии определяли pH и окислительно-восстановительный потенциал на ЛПМ-60 при 22°.

Для определения свободных и белковых сульфидрильных групп использовали метод Колтоффа (10) с некоторой модификацией. Листья (0,5 г) растирали в жидком азоте и добавляли 10 мл 5% метафосфорной кислоты. Пробы разводили водой таким образом, чтобы конечная концентрация кислоты была равна 2,5%. Гомогенат центрифугировали и в надосадочной жидкости определяли свободные (кислоторастворимые) SH-группы. Остаток ткани экстрагировали 2,5% раствором аммиака и снова центрифугировали. В надосадочной жидкости определяли белковые SH-группы с помощью амперометрического титрования 0,001 M раствором сулемы. Повторность опытов 6-кратная. На графиках и в таблицах приведены средние ошибки опытов.

Проведенный нами анализ окислительно-восстановительных потенциалов в гомогенатах растертых листьев показал, что облучение изолированных листьев маша к.с. (3 часа) способствует увеличению восстановленно-

Таблица 1

Содержание свободных и связанных SH-групп (в мкг на 1 г исх. сырого веса) в изолированных листьях этиолированных проростков маша через 10 мин. (А) и через 6 час. (Б) после начала освещения к.с. и д.к.с.

Варианты	Свободные	Белковые	Варианты	Свободные	Белковые
А. Исходные к.с.	87,2±0,87	76,2±2,16	К.с. + т.	90,2±0,87	67,9±0,63
	87,8±1,34	73,7±2,61	Д.к.с. + т.	99,5±0,66	73,9±0,70
Б. Исходные т.	106,2±0,55	83,1±0,41	К.с. + т. + д.к.с.	99,0±0,52	77,2±1,00
	98,0±0,34	72,0±0,63	Д.к.с. + т. + к.с.	91,5±0,63	66,0±0,99

Примечание. А — к.с., 10 мин., Б — к.с., 10 мин.; д.к.с., 3 мин.; т. между к.с. и д.к.с. 1 мин.

сти тканей (рис. 1). Д.к.с. (2 часа) сам по себе не влиял на Eh , не устранял действие к.с., если был последним. В вариантах д.к.с. + т. + к.с. проявлялся эффект только к.с. Величина рН гомогенатов составляла 5,89—5,97 и была одинаковой во всех вариантах.

Таким образом, фитохромная система не оказывает заметного влияния на рН тканей листьев маша, но определенно контролирует уровень окислительно-восстановительного потенциала. В связи с полученными в нашей работе данными о влиянии к.с. и д.к.с. на Eh интересно было исследовать дей-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1. Изменение окислительно-восстановительного потенциала изолированных листьев этиолированных проростков маша при облучении к.с. и д.к.с. 1 — исходный материал; 2 — темнота (с.), 6 час.; 3 — к.с., 3 часа + т., 3 часа; 4 — д.к.с., 2 часа + т., 4 часа; 5 — к.с., 3 часа + т., 1 час. + д.к.с., 2 часа; 6 — д.к.с., 2 часа + т., 1 час + к.с., 3 часа

Рис. 2. Изменение содержания свободных (а) и белковых (б) сульфгидрильных групп в изолированных листьях маша. 1—6 — то же, что на рис. 1

ствие фитохромной системы на свободные и связанные сульфгидрильные группы. На рис. 2 видно, что за 6 час. пребывания в темноте в изолированных листьях наблюдалось снижение содержания как свободных, так и особенно связанных сульфгидрильных групп. К.с. (3 часа) резко снижал содержание свободных и связанных SH-групп, а д.к.с. оказывал лишь незначительное действие. В варианте д.к.с. + т. + к.с. эффект зависел от последнего облучения, а в варианте к.с. + т. + д.к.с. облучение д.к.с. полностью (свободные SH-группы) или почти полностью (SH-группы белков) устраняло действие красного света. Сходные результаты были получены и в том случае, когда время облучения было сокращено (к.с. 10 мин. + т. 1 мин. + д.к.с. 3 мин.), но материал фиксировали так же через 6 час. (табл. 1, Б). Однако при этом влияние к.с. на содержание сульфгидрильных групп белков было не столь четким, как при длительной обработке к.с. и д.к.с. Если в наших опытах фиксация материала проводилась сразу после выключения к.с. (10 мин.), то никаких изменений в содержании сульфгидрильных групп не было обнаружено (табл. 1, А). Таким образом, изменение содержания свободных и связанных SH-групп происходило не во время освещения к.с., а в последующий темновой период.

Уменьшение количества SH-групп под действием к.с. наблюдается как в свободной, так и в белковой фракциях. Следовательно, снижение кисло-

торастворимых SH-групп не может быть просто результатом включения свободного цистеина в белки в процессе белкового синтеза. Более вероятно, что здесь мы имеем дело с частичным окислением SH-групп. В связи с этим важно вспомнить, что, по данным Мамфорда и др. ⁽¹¹⁾, фитохромный белок может содержать 10–11 SH-групп. Макдоноу ⁽¹²⁾ сообщил, что ингибиторы SH-групп (иодацетамид и *n*-хлормеркурибензоат) изменяли спектр поглощения фитохрома и снижали активность Φ_{730} в опытах с прорастанием семян салата-латука. Наконец, имеются данные о том, что облучение к.с. обуславливает изменение величин коэффициентов ионизации SH- и OH-групп белкового компонента фитохрома этиолированных проростков злаковых. Последующее облучение д.к.с. вызывало уменьшение сдвигов коэффициентов ионизации ⁽¹³⁾. Ряд авторов считает, что к.с. индуцирует конформационные изменения фитохрома, возможно переход типа «клубок — спираль» ^(2, 14).

На основании всего изложенного можно предположить, что при возбуждении пигмента под действием к.с. происходят кооперативные конформационные изменения в белковой структуре фитохрома. Затем в темновой период активируется окисление SH-групп при взаимодействии свободных сульфгидрильных групп и SH-групп белков. При сопряжении окисления SH-групп с восстановлением каких-то других соединений на базе активной формы фитохрома начинает функционировать окислительно-восстановительная цепь реакций, с помощью которой фитохром оказывает влияние на обмен веществ. В работе Клейна и Идсела ⁽⁸⁾ было показано, что активирующее действие к.с. на рост дисков из первичных этиолированных листьев бобов могло быть имитировано дачей в темноте НАД-Н, цистеина или аскорбиновой кислоты. Д.к.с. устранял активирующее действие веществ с высоким восстановительным потенциалом. Авторы высказывают предположение, что Φ_{730} действует как восстанавливающая, а Φ_{660} — как окисляющая система.

В наших опытах с изолированными листьями маша было обнаружено, что к.с. увеличивает восстановленность тканей на 38%, а д.к.с. полностью устраняет действие к.с. Таким образом, предположение о том, что активная форма фитохрома функционирует как восстанавливающая система, находит некоторое подтверждение. В связи с этим нужно отметить, что к.с. в наших опытах с изолированными листьями маша способствовал увеличению содержания восстановленных ксантофиллов во фракции лютеин + зеаксантин ⁽¹⁵⁾, при этом наблюдалась тенденция к снижению содержания виолаксантина. Д.к.с. устранял действие к.с., если был последним. Вполне можно предположить, что Φ_{730} способствует синтезу лютеина и зеаксантина за счет активации восстановительных процессов. В работе Сапожникова и сотрудников ⁽¹⁶⁾ было показано, что глутатион, цистеин и аскорбиновая кислота оказывают в темноте положительное влияние на содержание восстановленных форм ксантофиллов в растительных тканях.

Ленинградский государственный университет
им. А. А. Жданова

Поступило
6 V 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ H. Borthwick, S. Hendricks, M. Parker, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 38, 9, 924 (1952). ² W. Hillman, Ann. Rev. Plant Physiol., 18, 301 (1967). ³ H. Mohr, Photochem. and Photobiol., 5, 469 (1966). ⁴ H. Borthwick, S. Hendricks, Sci., 132, 1223 (1960). ⁵ С. Хендрикс, Биологические часы, М., 1964, стр. 403. ⁶ M. Furuya, Progr. Phytochem., 1, London — N. Y. — Sydney, 1968, p. 347. ⁷ S. Hendricks, Dev. Biol., Suppl. 3, 227 (1969). ⁸ R. M. Klein, P. C. Edsall, Plant. Physiol., 41, 6, 949 (1966). ⁹ А. С. Саидов, В. В. Полевой, Г. Б. Максимов, Физиол. и биохим. культурн. раст., Киев, 3, 5, 508 (1971). ¹⁰ M. Kolthoff, S. Watter, Z. Morgen, Anal. Chem., 26, 366 (1954). ¹¹ F. E. Mumford, E. J. Jenner, Biochemistry, 5, 11, 3657 (1966). ¹² W. T. McDonough, Radiation Res., 31, 1, 74 (1967). ¹³ В. И. Бабенко, А. К. Кваснюк, ДАН, 195, № 1, 229 (1970). ¹⁴ H. Siegelman, V. C. Turner, S. V. Hendricks, Plant Physiol., 41, 8, 1289 (1966). ¹⁵ А. С. Саидов, В. В. Полевой, Вестн. Ленингр. унив., 21, 5, 140 (1974). ¹⁶ Д. И. Сапожников, С. А. Дилова, Л. В. Иванцова, ДАН, 180, № 3, 742 (1968).