А. В. ЛЕБЕДЕВ, Л. И. БОГУСЛАВСКИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОСФОЛИПИДОВ С ИОДОМ И ПРОВОДИМОСТЬ БИСЛОЙНЫХ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН

(Представлено академиком А.Н. Фрумкин 23 VI 1972)

В присутствии молекулярного иода проводимость бислойных липидных мембран (БЛМ) возрастает на несколько порядков и немонотонно изменяется с концентрацией иодида (¹⁻³). Были предложены различные модели ионной (³⁻⁷) и электронной (^{6, 8-12}) проводимости БЛМ в системе иод — иодид. Исследование спектров в CCl_4 (⁷) показало, что лецитин и холестерин образуют комплексы с молекулярным иодом. Если эти комплексы действительно играют существенную роль в проводимости БЛМ, то можно ожидать изменения механизма проводимости, выбрав фосфолипиды, в которых отсутствуют центры, способные к комплексообразованию с иодом.

В настоящей работе в качестве такого липида был выбран фосфатидилглицерин. Последний выделялся из бактерий *Micrococcus lysodeikticus* при помощи хроматографии липидного экстракта в хлороформ-метаноле на колонке кремневой кислоты. Выбор объекта определялся его фосфолипидным набором, в котором нацело отсутствуют основные фосфолипиды, а представлены лишь кислые — моно- и дифосфатидилглицерин с насыщенными жирнокислотными остатками (¹³). Контроль чистоты липидов осуществлялся методом тонкослойной хроматографии на пластинках силикагеля. Для формирования БЛМ и изучения спектров поглощения объемной фазы в видимой и у.-ф. областях спектра использовались растворы фосфатидилглицерина и фосфатидилхолина с холестерином (4 : 3) в *n*-декале (3 мг/мл).

Перед снятием спектров поглощения неводной фазы (рис. 1) растворы фосфолипидов в *n*-декане и водные растворы, содержащие систему иод — иодид, сливались вместе в объемном соотношении 1 : 50 и выдерживались до установления равновесного распределения компонентов. Для контроля та же операция выполнялась с раствором *n*-декана без фосфолипидов. Оптические плотности для разных случаев сильно варьировали, поэтому для регистрации спектров растворы *n*-декана после отделения от водной фазы разбавлялись, а затем был произведен пересчет на одинаковое разбавление (в 30 раз для случая рис. 1в и в 6 раз для случаев рис. 1а, б, г).

Бимолекулярные липидные мембраны формировались обычным методом на отверстиях в тефлоновой стенке ячейки, разделяющей два одинаковых раствора иод-иодида в воде. Проводимость на постоянном токе (рис. 2) и инфранизких частотах (до 0,001 Гц) определялась по вольт-амперным характеристикам вблизи нуля внешнего потенциала при прикладывании треугольных импульсов с амплитудой ± 50 мВ. Проводимость и емкость на звуковых частотах измерялась мостовым методом по параллельной схеме замещения. Площадь мембран контролировалась как визуально, так и по значениям высокочастотной емкости. Во всех опытах использовались платиновые электроды.

Результаты экспериментов. На рис. 1 представлены спектры поглощения в видимой и у.-ф. областях спектра. Исходные водные растворы, с которыми уравнивались растворы *n*-декана, соответствовали че-

тырем крайним случаям: а) мало иода, весь в форме J_2 ; б) мало иода, весь в форме J_3^- ; в) много иода, весь в форме J_2 , г) много иода, весь в форме J_3^- . Без фосфолипидов в фазу *n*-декана из воды может переходить только J_2 и не переходят формы J^- и J_3^- (рис. 1, кривые 1). Добавление фосфолипидов в *n*-декан после уравнивания с водными фазами во всех рассмотренных случаях приводит к появлению двух дополнительных полос, которые не обнаруживаются ни в спектрах иода, ни в спектрах фосфолипидов, растворенных в *n*-декане.

Сравнивая спектры разных липидов, можно отметить, что при высокой концентрации J_2 или J_3^- (рис. 1, в, г) они подобны. Однако наблюдается

Рис. 1. Спектры поглощения *n*-декана (1) и растворов фосфатидилглицерина (2) и лецитина с холестерином (3) в *n*-декане, выдержанных до равновесного распределения с водными растворами иод-иодида. Исходные концентрации в воде: а — $5 \cdot 10^{-5} M J_2$, б — $5 \cdot 10^{-5} M J_2 + 1 M KJ$, в — $10^{-3} M J_2$, г — $10^{-3} M J_2 + 1 M KJ$. В случае в оптические плотности уменьшены в 5 раз

сильное различие при низких ($5 \cdot 10^{-5} M$) концентрациях J_2 или J_3^- (рис. 1а, б). Дополнительные полосы также появляются, когда водный раствор, контактирующий с раствором фосфолипидов в *n*-декане, содержит только 1 М КЖ без J_2 . В этом случае величина оптических плотностей много меньше, чем в присутствии $5 \cdot 10^{-5} M J_3^-$. Возможно, что их появление связано с образованием J_3^- в водном растворе 1 М КЖ, но в концентрации много меньшей, чем $5 \cdot 10^{-5} M J_3^-$.

На рис. 2 представлены результаты измерения проводимости бислоевых липидных мембран на постоянном токе и переменном токе. При большой концентрации молекулярного иода для обоих использованных липидов проводимость на постоянном токе немонотонно изменяется с концентрацией иодида в водном растворе. Дисперсия проводимости с частотой наблюдается при малых концентрациях иодида в растворе. На высоких частотах максимум проводимости исчезает и проводимость монотонно падает с ростом концентрации иодида. При малой ($5 \cdot 10^{-5} M$) концентрации иода для БЛМ, сформированных из лецитина с холестерином, максимум проводимости на постоянном токе сохраняется и становится более ярко выраженным. При этом дисперсионный участок также сохраняется. Для БЛМ из фосфатидилглицерина в этом случае, напротив, наблюдается монотонный рост

проводимости с ростом концентрации иодида, а проводимость на высоких частотах равна проводимости на постоянном токе во всем диапазоне концентраций J^- (рис. 2б).

Обсуждение результатов. Ход зависимости высокочастотной проводимости, как было показано ранее ⁽⁹⁾, противоречит гипотезам переносчиков аниона иода как в форме J_3^- ⁽³⁾, так и в форме полииодидов ^(4, 5). Если в исходные водные растворы J_2 , которые разделяет БЛМ, добавлять КJ, то наблюдающийся в этих случаях монотонный спад проводимости на высоких частотах объясняется уменьшением содержания J_2 в водном растворе, а соответственно и в мембране из-за перехода молекулярного

Рис. 2. Проводимости бислойных липидных мембран, сформированных из лецитина с холестерином (а) и из фосфатидилглицерина (б) в зависимости от концентрации КJ. 1, 3 — на переменном токе, 2, 4 — на постоянном токе; 1, 2 — $10^{-3} M J_2$, 3, 4 — $5 \cdot 10^{-5} M J_2$

иода в заряженную форму J_3^- . Такая зависимость высокочастотной проводимости может быть объяснена инжекцией дырок в БЛМ или гипотезой о существовании подвижных положительно заряженных ионов-переносчиков. Дисперсия проводимости связана с примембранными слоями.

Если сравнить спектры поглощения и результаты измерения проводимости БЛМ, то можно прийти к выводу, что при малой ($5 \cdot 10^{-5} M$) концентрации J_2 лецитин с холестерином увеличивает содержание иода в *n*-декане в большей степени, чем фосфатидилглицерин (рис. 1а), очевидно, за счет образования комплексов. Такие комплексы как бы увеличивают концентрацию иода в БЛМ. Поэтому проводимость БЛМ из лецитина с холестерином при одних и тех же исходных концентрациях иод-иодида в водном растворе выше, чем проводимость мембран из фосфатидилглицерина. Как и в спектрах, наибольшее различие в характерах проводимости БЛМ в зависимости от типа липидов наблюдается при малых ($5 \cdot 10^{-5} M$) концентрациях J_2 (рис. 2). Это можно объяснить существованием двух механизмов проводимости: ионного, который заметен при малом содержании J_2 , и электронного переноса, который существен при высоком содержании J_2 .

Наблюдающийся некоторый сдвиг максимумов полос поглощения в спектрах рис. 1 можно объяснить существованием различных комплексов фосфолипидов с иод-иодидом, зависящих от равновесных концентраций J_2 , J^- и J_3^- в контактирующем водном растворе.

Если ионная проводимость в системе иод-иодид действительно существует для БЛМ из фосфатидилглицерина при $5 \cdot 10^{-5} M J_2$, то она, судя по монотонному росту проводимости с насыщением от концентрации иодида (рис. 2б), соответствует прохождению трииодида, хотя этот вопрос требует специального исследования. Как следует из отсутствия дисперсии проводимости от частоты электрического поля, лимитирующей стадией суммарного переноса заряда через БЛМ в этом случае является транспорт через углеводородный «объем» мембраны ⁽¹⁴⁾.

Препаративная работа по выделению и анализу фосфатидилглицерина выполнялась В. С. Чигиревым и Г. В. Тихоновой в Институте биохимии им. А. Н. Баха. Выражаем искреннюю благодарность В. С. Чигиреву и Г. В. Тихоновой за предоставление фосфолипидов и за предложенные ими дополнения к статье.

Институт электрохимии
Академии наук СССР
Москва

Поступило
22 VI 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ E. A. Liberman, V. P. Topaly, *Biochim. et biophys. acta*, **163**, 125 (1968).
² E. A. Либерман, В. П. Топалы, *Биофизика*, **13**, 442 (1968). ³ E. A. Либерман, В. П. Топалы и др., *Биофизика*, **14**, 56 (1969). ⁴ S. G. A. McLaughlin, G. Szabo et al., *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, **67**, 1268 (1970). ⁵ A. Finkelstein, A. Cass, *J. Gen. Physiol.*, **52**, 145 (1968). ⁶ P. Lauger, J. Richter, W. Leslauer, *Ber. Bunsenges. Phys. Chem.*, **71**, 906 (1967). ⁷ B. Bhowmik, G. L. Jendrasiak, B. Rosenberg, *Nature*, **215**, 842 (1967). ⁸ B. Rosenberg, H. C. Pant, *Chem. Phys., Lipids*, **4**, 203 (1970). ⁹ L. I. Boguslavsky, F. I. Bogolepova, A. V. Lebedev, *Chem. Phys. Lipids*, **6**, 296 (1971). ¹⁰ L. I. Boguslavsky, A. V. Lebedev, In: *Biol. Aspects of Electrochem., Experientia, Suppl.*, **18**, 163 (1971). ¹¹ Л. И. Богуславский, А. В. Лебедев, Ф. И. Боголепова, *ДАН*, **195**, 475 (1970). ¹² В. Я. Водяной, И. Я. Водяной, Н. А. Федорович, *Физ. тверд. тела*, **12**, 3321 (1970). ¹³ M. Macfarlane, *Nature*, **196**, 136 (1962). ¹⁴ А. В. Лебедев, Л. И. Богуславский, *Биофизика*, **16**, 221 (1971).