УДК 541.127+547.411

ХИМИЯ

Ш. А. БАРАПЕТЬЯН, член-корреспондент АН СССР Р. Х. ФРЕЙДЛИНА

**ОБЩАЯ КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА СОЕДИНЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ —CH₂CCl₃- И —CH=CCl₂-ГРУППЫ**

Гидролиз полихлоралканов RCH₂CCl₃ и R—CH=CCl₂ крепкой H₂SO₄ является основным путем перехода к карбоновым кислотам и описан в работах (1-3). Реакция проводилась в гетерогенных условиях, кинетика не изучалась, о механизме имеются лишь отдельные высказывания. В (1) предположено, что реакция идет по схеме RCH₂CCl₃ → RCH=CCl₂ → → RCH₂C(Cl₂)OSO₂OH → RCH₂COOH. В (2, 3) высказано мнение, что реакция течет через дихлоркарбоний-катион, реагирующий по двум направлениям, с образованием RCH=CCl₂ и RCH₂COOH. В работе (4), посвященной водному гидролизу, при 250–300° получены данные, обосновывающие промежуточное образование карбоний-катиона. В (1) утверждается, что RCH=CCl₂ превращается в RCH₂COOH в более мягких условиях, чем RCH₂CCl₃, а в (5), наоборот, в более жестких. Для бензотрихлорида показано, что в 50% водном ацетоне реакция идет по S_N1-механизму с образованием карбоний-катиона (6).

Мы изучили в гомогенных условиях кинетику гидролиза замещенных полихлоралканов HO₂C(CH₂)₄CCl₃ (I) и HO₂C(CH₂)₃CH=CCl₂ (II), растворимых в H₂SO₄ и воде. Исходные вещества получали по (7) и дважды очищали ректификацией или перекристаллизацией. H₂SO₄ — реактив особой чистоты. Кинетические опыты проводили в стеклянных ампулах, термостатированных ±0,1°. Объем раствора 20–25 мл, концентрация вещества 0,01 мол/л. Показано, что торможение реакции исходными веществами и конечными продуктами вследствие уменьшения кислотности становится заметным при концентрации более 0,05 мол/л.

Таблица 1

Константы скорости гидролиза 10²k_{эфф}, мин⁻¹

H ₂ SO ₄ , масс. %	HO ₂ C(CH ₂) ₄ CCl ₃ (I) k ₁			HO ₂ C(CH ₂) ₃ CH=CCl ₂ (II)k ₂		
	50°	80°	90°	50°	80°	90°
70	—	—	8,6	—	—	0,7
75	—	4,5	11,0	—	1,9	4,1
80	0,35	10,0	20,0	0,9	10,5	20,0
85	1,3	33,0	61,8	6,1	62,5	105
90	3,6	74,1	156	26,0	—	—
93	6,8	118	—	65,5	—	—

10²k_{эфф} для I, мин⁻¹

T-ра, °C	0	20	30	40	80	90	95	100
H ₂ O	—	—	—	—	0,38	1,05	1,55	2,7
93% H ₂ SO ₄	0,006	0,12	0,63	2,0	118	—	—	—

Примечание. Стандартная ошибка S для большинства опытов равна ±2–3% от величины k_{эфф} и только для крайних значений она достигает ±10%. Доверительный интервал с надежностью 0,95 не более k_{эфф} ± 3S.

Кинетические кривые строили по данным аргентометрического определения HCl в молях на 1 моль исходного вещества. Для каждой кривой ставили 5–12 опытов в диапазоне 5–97% глубины превращения. Кривые описываются уравнением первого порядка. Константу скорости $k_{эфф}$ находили аналитически по опытным точкам без выравнивания. Значения $k_{эфф}$ даны в табл. 1 и на рис. 1 и 2. Данные для функции кислотности (H_0) взяты из (8).

При гидролизе II для расчета $k_{эфф}$ принимали предельное количество HCl при полном превращении φ_∞ равным 2 молям. Из рис. 1 видно, что наклон прямых $\lg k_2 - H_0$ равен единице и, следовательно, k_2 пропорциональна кислотности h_0 . В соответствии с общепринятыми взглядами на механизм гомогенного кислотного катализа (9–11) гидролиз II можно представить схемой

k_2 — эффективная константа скорости суммарного процесса, включающего ряд элементарных стадий. Лимитирующей стадией является образование карбоний-катиона из протонированного дихлорвинильного соединения.

Гидролиз I протекает более сложно. В воде и 5–60% H_2SO_4 реакция останавливается при $\varphi_\infty = 1,6 \pm 0,4 \text{ M HCl}$, что при полном расходе I отвечает образованию 0,3 моля RCOOH и 0,7 моля II. Когда реакцию вели в воде, то по разности между общей кислотностью, найденной титрованием КОН и аргентометрическим определением HCl, рассчитывали содержание RCOOH, которое на всем протяжении кривой для 90° равно 0,3 моля. Эта же величина

Рис. 1. Зависимость $\lg k_{эфф}$ от функции кислотности H_0 при гидролизе $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_3\text{CH}=\text{CCl}_2$ (I) и $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{CCl}_2$ (II) в растворах H_2SO_4 . 1, 2, 3 — для I; 1', 2', 3' — для II; 2, 2' — 80; 3, 3' — 50° C

получена для воды при 80–110°. В работе (3) в препаративных опытах было получено для воды при 250° примерно также 0,3 моля RCOOH при $\varphi_\infty = 1,6$ моля.

Для 65–75% H_2SO_4 выделение HCl идет по кривым, аналогичным рис. 3. Анализ кривых по методу (12) показывает два участка, на которых HCl выделяется по первому порядку, с константами k_1 в начале и k_2 в конце кривой. В табл. 1 даны k_1 , рассчитанные по начальному участку; k_2 найдены из независимых опытов гидролиза II. Для 85–93% H_2SO_4 константы k_1 на всем протяжении кинетических кривых постоянны при $\varphi_\infty = 3$ моля.

Температурная зависимость $k_{эфф}$ хорошо описывается уравнением Аррениуса. Эффективная энергия активации, вычисленная по данным табл. 1, равна:

для $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{CCl}_2$ в H_2O $E = 25,4$ ккал/мол, в 80–90% H_2SO_4 $E = 23,2$ ккал/мол;

для $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_3\text{CH}=\text{CCl}_2$ в 80–85% H_2SO_4 $E = 18,3$ ккал/мол и при постоянном $H_0 = -7$ $E = 27,4$ ккал/мол.

Сравнительный гидролиз I с 1,1,1-трихлорпентаном (III) и II с 1,1-дихлорпентен-1 (IV) в гомогенных условиях в смесях $\text{H}_2\text{SO}_4 - \text{CH}_3\text{COOH} - \text{H}_2\text{O}$ и этанол — вода показал, что скорость и соотношение продуктов реакции не меняются при переходе от I к III и от II к IV, следовательно,

Таблица 2

Среда, вес. %	Т-ра, °С	HCl, мол.	H.ф., вес. %	Состав н.ф., %		
				III	IV	
H ₂ SO ₄ —CH ₃ COOH—H ₂ O *	69:27:4	130	1	52	65	35
H ₂ SO ₄ —H ₂ O	75:25	135	1,9	30	26	74
	93:7	60	1,1	62	98	2

* В кинетических опытах найдено $10^2 k_3 = 3$; $10^2 k_4 = 0,5$.

Выводы, полученные на полихлоркислотах, можно переносить на полихлоралканы.

В опытах гидролиза 10–20 г III в колбе с мешалкой реакцию прерывали после выделения части HCl, извлекали продукты реакции, отделяли кислую фракцию и анализировали нейтральную фракцию (н.ф.) методом г.ж.х. Результаты этих опытов даны в табл. 2; они согласуются с закономерностями, найденными в кинетических опытах.

Рис. 2

Рис. 2. Сопоставление k_1 при 90° с изменением содержания частиц в растворах H₂SO₄ (2, 3) при 25° по (1³) и кислотностью h_0 (4)

Рис. 3

Рис. 3. Кинетическая кривая (1) гидролиза HOOC(CH₂)₄CCl₃ в 65–75% H₂SO₄ и ее анаморфоза (2) по методу (1²)

Все результаты, полученные для I и II, хорошо объясняются одной общей схемой (2), в которой общим промежуточным продуктом в различных средах является один и тот же карбоний-катион, превращения которого и определяют состав конечных продуктов реакции

k_1 и k_2 — эффективные константы скорости образования карбоний-катиона из I и II соответственно.

Для концентрации $\text{H}_2\text{SO}_4 \leq 60\%$, когда $k_1 \gg k_2$, реакция останавливается при полном превращении I. При этом накапливается 70% II, а его количество характеризует отношение скоростей гидратации и отщепления $\text{H}^{\oplus}$ карбоний-катионом.

Учитывая постоянство количества II при изменении температуры, можно предположить, что переходное состояние между карбоний-катионом и $[-\text{CH}=\text{CCl}_2 \cdot \text{H}]^{\oplus}$ (см. схему (1)) весьма близко к карбоний-катиону и отщепление протона протекает с очень малой энергией активации, такой же как и для гидратации (10).

Для 65–75% H_2SO_4 , когда $k_1 > k_2$, вначале идет накопление II и HCl выделяется с практически постоянной константой, равной k_1 . По мере накопления II скорость его превращения становится соизмеримой со скоростью превращения I и $k_{\text{эфф}}$ образования HCl уменьшается, доходя к моменту полного расходования I до k_2 , после чего остается постоянной. Для 85–93% H_2SO_4 , когда $k_1 < k_2$, а отношение скоростей гидратации и отщепления, возможно, увеличивается, накопление II незначительно и выделение HCl от начала до конца контролируется константой k_1 .

О механизме образования карбоний-катиона из $-\text{CH}_2\text{CCl}_3$ полученные данные позволяют высказать следующие предположения. В воде и разбавленной H_2SO_4 реакция, очевидно, протекает аналогично гидролизу бензотрихлорида по S_N1 -механизму, и основной реагирующей частицей является молекула воды. Увеличение k_1 при повышении содержания H_2SO_4 можно объяснить увеличением полярности среды. Подтверждением такой трактовки может служить снижение $k_{\text{эфф}}$ в 5–20 раз при гидролизе I и III в менее полярных 20–25% водных растворах этанола, ацетона, ацетонитрила, муравьиной и уксусной кислот.

Представляется вероятным (13), что в растворах H_2SO_4 в реакцию вступают частицы $\text{H}_3\text{O}^{\oplus}$ и $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} (\text{HSO}_4^{\ominus} \cdot \text{H}_3\text{O}^{\oplus})$, увеличение концентрации которых и определяет рост $k_{\text{эфф}}$ в слабых растворах. В крепкой H_2SO_4 доминирующим становится кислотный катализ по H_0 . Из рис. 2 видно, что имеется явная зависимость между ходом изменения k_1 , $[\text{H}_3\text{O}^{\oplus}]$, $[\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ и k_1 .

Институт элементоорганических соединений
Академии наук СССР
Москва

Поступило
14 VII 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ R. M. Joosse. Am. Pat. 2 398 430; Chem. Abstrs, **40**, 3768 (1946). ² Л. И. Захаркин, Докторская диссертация, 1958, стр. 40. ³ Ш. А. Карапетьян, Н. А. Семёнов, ЖПХ, **37**, 2003 (1964). ⁴ Ш. А. Карапетьян, Н. В. Круглова, Р. Х. Фрейдлипа, Изв. АН СССР, ОХН, **1963**, 307. ⁵ K. Bott, H. Hellmann, Angew. Chem., **78**, 932 (1966). ⁶ J. Hine, D. E. Lee, J. Am. Chem. Soc., **73**, 22 (1951). ⁷ А. Н. Несмеянов, Л. И. Захаркин, Р. Х. Фрейдлипа, Изв. АН СССР, ОХН, **1955**, 40. ⁸ C. D. Johnson et al., J. Am. Chem. Soc., **91**, 6654 (1969). ⁹ Э. М. Арпетт, В сборн. Современные проблемы физической органической химии, М., 1967, стр. 202. ¹⁰ Д. Бетел, В. Гольд, Карбониевые ионы, М., 1970, стр. 130, 231. ¹¹ П. Де Ла Мар, Р. Болтон, Электрофильное присоединение к ненасыщенным системам, М., 1968, стр. 47. ¹² Е. С. Рудаков, Кинетика и катализ, **1**, 177 (1960). ¹³ Н. Г. Зарахани, М. И. Винник, ЖФХ, **37**, 503 (1963); М. И. Винник и др., ЖФХ, **41**, 252 (1967).