

## О ПРОИЗВЕДЕНИИ $\sigma$ -МНОЖЕСТВА ФИШЕРА КОНЕЧНОЙ ГРУППЫ И $\sigma$ -КЛАССА ФИШЕРА

Н.Т. Воробьев, С.Н. Воробьев, А.П. Мехович, Д.А. Китаров

*Витебский государственный университет имени П.М. Машерова*

## ON THE PRODUCT OF $\sigma$ -FISHER SET OF THE FINITE GROUP AND $\sigma$ -FISHER CLASS

N.T. Vorobyev, S.N. Vorobyev, A.P. Mekhovich, D.A. Kitarov

*Vitebsk State University named after P.M. Masherov*

**Аннотация.** Пусть  $\sigma$  – некоторое разбиение множества всех простых чисел  $\mathbb{P}$ , т. е.  $\sigma = \{\sigma_i : i \in I\}$ ,  $\sigma_i \cap \sigma_j = \emptyset$  для всех  $i \neq j$  и  $\mathbb{P} = \bigcup_{i \in I} \sigma_i$ .  $\sigma$ -Классом Фишера называется класс Фиттинга  $\mathfrak{F}$  конечных групп  $G$ , который удовлетворяет условию: если  $G \in \mathfrak{F}$ ,  $N \trianglelefteq G$ ,  $N \leq T \leq G$  и  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  для некоторого  $\sigma_i \in \sigma$ , то  $T \in \mathfrak{F}$ .  $\sigma$ -Множеством Фишера группы  $G$  называется множество Фиттинга  $\mathcal{F}$ , если из  $N \trianglelefteq S \in \mathcal{F}$ ,  $N \leq T \leq S$  и  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  для некоторого  $\sigma_i \in \sigma$  следует  $T \in \mathcal{F}$ . Пусть  $\mathcal{F}$  – множество Фиттинга группы  $G$  и  $\mathfrak{X}$  – класс Фиттинга. Множество  $\mathcal{F} \circ \mathfrak{X} = \{T \leq G : T/T_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{X}\}$  называется произведением множества Фиттинга и класса Фиттинга. Доказано, что если  $\mathcal{F}$  –  $\sigma$ -множество Фишера группы  $G$  и  $\mathfrak{F}$  –  $\sigma$ -класс Фишера, то произведение  $\mathcal{F} \circ \mathfrak{X}$  является  $\sigma$ -множеством Фишера.

**Ключевые слова:** класс Фиттинга, класс Фишера, множество Фишера,  $\sigma$ -класс Фишера,  $\sigma$ -множество Фишера, произведение класса Фишера и множества Фишера.

**Для цитирования:** О произведении  $\sigma$ -множества Фишера конечной группы и  $\sigma$ -класса Фишера / Н.Т. Воробьев, С.Н. Воробьев, А.П. Мехович, Д.А. Китаров // Проблемы физики, математики и техники. – 2026. – № 1 (66). – С. 39–42. – DOI: [https://doi.org/10.54341/20778708\\_2026\\_1\\_66\\_39](https://doi.org/10.54341/20778708_2026_1_66_39). – EDN: PFRWCWZ

**Abstract.** Let  $\sigma = \{\sigma_i : i \in I\}$ , be a partition of set  $\mathbb{P}$  of all prime numbers, i. e.  $\mathbb{P} = \bigcup_{i \in I} \sigma_i$  and  $\sigma_i \cap \sigma_j = \emptyset$  for all  $i \neq j$ . A  $\sigma$ -Fischer class is a Fitting class  $\mathfrak{F}$ , that satisfies the condition: if  $G \in \mathfrak{F}$ ,  $N \trianglelefteq G$ ,  $N \leq T \leq G$  and  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  for some  $\sigma_i \in \sigma$ , then  $T \in \mathfrak{F}$ . A  $\sigma$ -Fischer set of group  $G$  is called a Fitting set  $\mathcal{F}$  such that from  $N \trianglelefteq S \in \mathcal{F}$ ,  $N \leq T \leq S$  and  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  for some  $\sigma_i \in \sigma$ , then  $T \in \mathcal{F}$ . Let  $\mathcal{F}$  be a Fitting set of  $G$  and  $\mathfrak{X}$  be a Fitting class. The set  $\mathcal{F} \circ \mathfrak{X} = \{T \leq G : T/T_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{X}\}$  is called the product of the Fitting set and the Fitting class. It is proved that if  $\mathcal{F}$  is a  $\sigma$ -Fischer set of a group  $G$ , and  $\mathfrak{F}$  is a  $\sigma$ -Fischer class, then the product  $\mathcal{F} \circ \mathfrak{X}$  is a  $\sigma$ -Fischer set.

**Keywords:** Fitting class, Fischer class, Fischer set,  $\sigma$ -Fischer class,  $\sigma$ -Fischer set, product of Fischer class and Fischer set.

**For citation:** On the product of  $\sigma$ -Fischer set of the finite group and  $\sigma$ -Fischer class / N.T. Vorobyev, S.N. Vorobyev, A.P. Mekhovich, D.A. Kitarov // Problems of Physics, Mathematics and Technics. – 2026. – № 1 (66). – P. 39–42. – DOI: [https://doi.org/10.54341/20778708\\_2026\\_1\\_66\\_39](https://doi.org/10.54341/20778708_2026_1_66_39) (in Russian). – EDN: PFRWCWZ

### Введение

В настоящей работе все рассматриваемые группы конечны. В определениях и обозначениях следуем [1]. Описание структурных свойств алгебры классов Фиттинга и строения канонических подгрупп связано с применением понятия произведения классов Фиттинга (см. например, главы IX, XI [1]). Напомним, что класс групп  $\mathfrak{F}$  называется классом Фиттинга [1, гл. IX], если выполняются следующие два условия:

- 1) если  $G \in \mathfrak{F}$  и  $N \trianglelefteq G$ , то  $N \in \mathfrak{F}$ ;
- 2) если  $N_1, N_2 \trianglelefteq G$ , и  $N_1, N_2 \in \mathfrak{F}$ , то  $N_1 N_2 \in \mathfrak{F}$ .

Напомним, что для любой группы  $G$  существует единственная максимальная нормальная подгруппа, принадлежащая  $\mathfrak{F}$ . Ее называют  $\mathfrak{F}$ -радикалом  $G$  и обозначают  $G_{\mathfrak{F}}$ .

Класс групп  $\mathfrak{F}$  называют *классом Фишера* [2], если выполняются следующие условия:

- 1)  $\mathfrak{F}$  – класс Фиттинга;
- 2) если  $G \in \mathfrak{F}$  и  $N \trianglelefteq G$ ,  $N \leq T \leq G$  и  $T/N$  –  $p$ -группа для некоторого простого числа  $p$ , то  $T \in \mathfrak{F}$ .

В теории классов Фиттинга конечных разрешимых групп известен результат Локетта [3]

о том, что произведение двух любых классов Фишера является классом Фишера.

Используя понятие множество Фиттинга группы  $G$ , Дёрк и Хоукс [1, гл. VIII, определение 2.1] определили понятие множества Фишера  $G$ . Напомним, что непустое множество  $\mathcal{F}$  подгрупп группы  $G$  называется *множеством Фиттинга группы  $G$* , если выполняются следующие три условия:

- 1) если  $T \trianglelefteq S \in \mathcal{F}$ , то  $T \in \mathcal{F}$ ;
- 2) если  $S, T \in \mathcal{F}$  и  $S, T \trianglelefteq ST$ , то  $ST \in \mathcal{F}$ ;
- 3) если  $S \in \mathcal{F}$  и  $x \in G$ , то  $S^x \in \mathcal{F}$ .

Множество Фиттинга  $\mathcal{F}$  группы  $G$  называется *множеством Фишера  $G$*  [1, гл. VIII, определение 4.3] если из условий:  $N \trianglelefteq S \in \mathcal{F}$ ,  $N \leq T \leq S$  и  $T/N$  –  $p$ -группа для некоторого простого числа  $p$  следует, что  $T \in \mathcal{F}$ .

В [1, гл. VIII, пример 2.2(a)] установлено, что каждому классу Фишера  $\mathfrak{F}$  соответствует множество Фишера  $\mathcal{F}$  группы  $G$  – его след в группе  $G$ , т. е. множество  $\mathcal{F} = \{T \leq G : T \in \mathfrak{F}\}$ , хотя обратное в общем случае неверно.

Для изучения алгебры множеств Фиттинга будем использовать понятие произведения множества Фиттинга и класса Фиттинга, которое было определено Н.Т. Воробьевым, Го Вэньбином и Яном Наньбином в работе [4]. Пусть  $\mathcal{F}$  – множество Фиттинга группы  $G$  и  $\mathfrak{X}$  – класс Фиттинга. Множество  $\mathcal{F} \odot \mathfrak{X} = \{T \leq G : T/T_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{X}\}$  называется *произведением множества Фиттинга группы  $G$  и класса Фиттинга*. В [4] доказано, что произведение  $\mathcal{F} \odot \mathfrak{X}$  является множеством Фиттинга группы  $G$ . Кроме того, в [5] было показано, что если  $\mathcal{F}$  – множество Фишера группы  $G$  и  $\mathfrak{X}$  – класс Фишера, то их произведение является множеством Фишера  $G$ .

В работах А.Н. Скибы [6]–[8] был предложен  $\sigma$ -метод исследования групп и их классов при помощи разбиения множества простых чисел  $\sigma$ . Основополагающие результаты по развитию и применению этого метода в теории локальных классов Фиттинга были получены Н.Т. Воробьевым, Го Вэньбином и Ли Жангом [9].

Напомним, что  $\sigma$  – некоторое разбиение множества всех простых чисел  $\mathbb{P}$ , т. е.  $\sigma = \{\sigma_i : i \in I\}$ , где  $\mathbb{P} = \bigcup_{i \in I} \sigma_i$ ,  $\sigma_i \cap \sigma_j = \emptyset$ , для всех  $i \neq j$ . Символом  $\mathfrak{N}_{\sigma_i}$  будем обозначать класс всех нильпотентных  $\sigma_i$ -групп.

**Определение 0.1.** *Класс Фиттинга  $\mathfrak{F}$  назовём  $\sigma$ -классом Фишера, если из условия  $G \in \mathfrak{F}$ ,  $N \trianglelefteq G$ ,  $N \leq T \leq G$  и  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  для некоторого  $\sigma_i \in \sigma$  всегда следует, что  $T \in \mathfrak{F}$ .*

В случае, если  $\sigma = \sigma^1 = \{\{2\}, \{3\}, \{5\}, \dots\}$ ,  $\mathfrak{F}$  называют классом Фишера [2].

Аналогично определим  $\sigma$ -множество Фишера группы  $G$ .

**Определение 0.2.** *Множество Фиттинга  $\mathcal{F}$  группы  $G$  назовём  $\sigma$ -множеством Фишера  $G$ , если из  $N \trianglelefteq S \in \mathcal{F}$ ,  $N \leq T \leq S$  и  $T/N$  является нильпотентной  $\sigma_i$ -группой для некоторого  $\sigma_i \in \sigma$  следует, что  $T \in \mathcal{F}$ .*

**Замечание 0.3.** *Очевидно, что всякое множество Фиттинга группы  $G$ , замкнутое относительно взятия подгрупп, является множеством Фишера  $G$ .*

**Замечание 0.4.** *В случае, если  $\sigma = \sigma^1 = \{\{2\}, \{3\}, \{5\}, \dots\}$  – минимальное разбиение  $\sigma$ , то  $\sigma^1$ -множество Фишера  $\mathcal{F}$  группы  $G$  совпадает с множеством Фишера этой группы.*

Основной результат работы следующая

**Теорема 0.5.** *Если  $\mathcal{F}$  –  $\sigma$ -множество Фишера группы  $G$  и  $\mathfrak{H}$  –  $\sigma$ -класс Фишера, то произведение  $\mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$  является  $\sigma$ -множеством Фишера  $G$ .*

### 1 Предварительные сведения

В качестве лемм приведем известные утверждения, которые будем использовать для доказательства основного результата.

**Лемма 1.1** [1, гл. А, теорема 2.1 (b), (c)]. *Справедливы следующие утверждения:*

1) *если  $U$  и  $N$  – подгруппы группы  $G$  и  $U$  нормализует  $N$ , то*

$$UN/N \cong U/U \cap N;$$

2) *если  $M, N$  – нормальные подгруппы группы  $G$  и  $N \leq M$ , то имеет место изоморфизм*

$$(G/N)/(M/N) \cong G/M.$$

**Лемма 1.2** [1, гл. А 1.3, (тождество Дедекинда)]. *Если  $U, V, W$  – подгруппы группы  $G$ , причем  $V \leq U$ , то справедливо равенство*

$$U \cap VW = V(U \cap W).$$

**Лемма 1.3** [1, гл. VIII, предложение 2.4 (d)]. *Если  $\mathcal{F}$  – множество Фиттинга группы  $G$  и  $N$  – нормальная подгруппа группы  $G$ , то*

$$N_{\mathcal{F}} = N \cap G_{\mathcal{F}}.$$

**Лемма 1.4** [1, гл. IX, лемма 1.13]. *Пусть  $N_1, N_2$  – нормальные подгруппы группы  $G$  такие, что  $N_1 \cap N_2 = 1$  и факторгруппа  $G/N_1N_2$  – нильпотентная группа. Если  $\mathfrak{F}$  – класс Фиттинга и  $G/N_1 \in \mathfrak{F}$ , то  $G \in \mathfrak{F}$  тогда и только тогда, когда  $G/N_2 \in \mathfrak{F}$ .*

**Лемма 1.5** [5, теорема 0.3]. *Если  $\mathcal{F}$  – множество Фишера группы  $G$  и  $\mathfrak{H}$  – класс Фишера, то произведение  $\mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$  является множеством Фишера  $G$ .*

**Лемма 1.6** [10, лемма 2.2]. *Пусть  $\mathfrak{F}$  –  $\sigma$ -класс Фишера. Тогда справедливы следующие утверждения:*

1)  $Char(\mathfrak{F}) = \sigma(\mathfrak{F})$ , где  $\sigma(\mathfrak{F})$  – множество всех простых делителей порядка всех групп из класса  $\mathfrak{F}$ ;

$$2) \mathfrak{N}_{\sigma(\mathfrak{F})} \subseteq \mathfrak{F}.$$

## 2 Доказательство теоремы 0.5

Пусть  $\mathcal{F}$  – множество Фишера группы  $G$  и  $\mathfrak{H}$  – класс Фишера. Тогда по лемме 1.5 их произведение  $\mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$  является множеством Фишера  $G$ . Для доказательства теоремы достаточно выяснить, что если  $T$  подгруппа группы  $G$ ,  $S \leq G$  и  $S$  – группа из  $\mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$  и  $N$  – ее нормальная подгруппа,  $N \leq T \leq S$  и  $T/N$  является нильпотентной  $\sigma_i$ -группой для некоторого  $\sigma_i \in \sigma$ , то  $T \in \mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$ .

Доказательство разобьем на несколько шагов.

(1) Если  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$ , то факторгруппы  $TS_{\mathcal{F}}/NS_{\mathcal{F}}$  и  $T \cap S_{\mathcal{F}}/N \cap S_{\mathcal{F}}$  являются нильпотентными  $\sigma_i$ -группами.

Так как  $N \trianglelefteq T$ , то  $N \trianglelefteq S$ , следовательно, подгруппа  $TS_{\mathcal{F}} = TNS_{\mathcal{F}}$ . По утверждению 1 леммы 1.1 имеет место изоморфизм

$$TS_{\mathcal{F}}/NS_{\mathcal{F}} = TNS_{\mathcal{F}}/NS_{\mathcal{F}} \cong T/T \cap NS_{\mathcal{F}}.$$

Следовательно, по утверждению 2 леммы 1.1 справедлив изоморфизм

$$(T/N)/((T \cap NS_{\mathcal{F}})/N) \cong T/T \cap NS_{\mathcal{F}}.$$

Поскольку  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  и класс нильпотентных  $\sigma_i$ -групп является формацией, то группа  $(T/N)/((T \cap NS_{\mathcal{F}})/N)$  является  $\sigma_i$ -группой. Следовательно, изоморфная ей группа  $T/T \cap NS_{\mathcal{F}}$  –  $\sigma_i$ -группа. Далее, ввиду изоморфизма

$$T/T \cap NS_{\mathcal{F}} \cong TS_{\mathcal{F}}/NS_{\mathcal{F}},$$

следует  $TS_{\mathcal{F}}/NS_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$ .

Покажем, что  $T \cap S_{\mathcal{F}}/N \cap S_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$ . Так как  $N \trianglelefteq T$ , то

$$T \cap S_{\mathcal{F}}/N \cap S_{\mathcal{F}} = (T \cap S_{\mathcal{F}})/(T \cap S_{\mathcal{F}}) \cap N.$$

Применяя утверждение 1 леммы 1.1, справедлив изоморфизм

$$T \cap S_{\mathcal{F}}N \cap S_{\mathcal{F}} \cong (T \cap S_{\mathcal{F}})N/N.$$

Так как  $(T \cap S_{\mathcal{F}})N/N$  – нормальная подгруппа группы  $T/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  и  $\mathfrak{N}_{\sigma_i}$  – класс Фиттинга, то группа  $(T \cap S_{\mathcal{F}})N/N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$ . Следовательно, и факторгруппа  $T \cap S_{\mathcal{F}}/N \cap S_{\mathcal{F}}$  является нильпотентной  $\sigma_i$ -группой.

(2)  $T/T \cap S_{\mathcal{F}}$  – нильпотентная  $\sigma_i$ -группа.

Для доказательства (2) будем использовать (1). Пусть  $\bar{S} = S/S_{\mathcal{F}}$ ,  $\bar{N} = NS_{\mathcal{F}}/S_{\mathcal{F}}$  и  $\bar{T} = TS_{\mathcal{F}}/S_{\mathcal{F}}$ . Тогда из  $S \in \mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$  следует, что

$\bar{S} \in \mathfrak{H}$ . Кроме того,  $\bar{N} \trianglelefteq \bar{S}$  и по утверждению 2 леммы 1.1  $\bar{T}/\bar{N} \cong TS_{\mathcal{F}}/NS_{\mathcal{F}}$ . Таким образом, ввиду (1)  $\bar{S} \in \mathfrak{H}$ ,  $\bar{N} \trianglelefteq \bar{S}$ ,  $\bar{N} \leq \bar{T} \leq \bar{S}$  и  $\bar{T}/\bar{N} \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$ . Поскольку по условию  $\mathfrak{H}$  –  $\sigma$ -класс Фишера, то  $\bar{T} = TS_{\mathcal{F}}/S_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{H}$ . Следовательно, по утверждению 1 леммы 1.1 справедлив изоморфизм

$$TS_{\mathcal{F}}/S_{\mathcal{F}} \cong T/T \cap S_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{H}.$$

Так как  $\mathfrak{H}$  – класс групп, то  $T/T \cap S_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{H}$ .

Утверждение (2) доказано.

$$(3) T_{\mathcal{F}} \cap (T \cap S_{\mathcal{F}})N = T \cap S_{\mathcal{F}}.$$

Вначале заметим, что

$$S_{\mathcal{F}} \in \mathcal{F}, N \cap S_{\mathcal{F}} \trianglelefteq S_{\mathcal{F}}, N \cap S_{\mathcal{F}} \leq T \cap S_{\mathcal{F}} \leq S_{\mathcal{F}},$$

то ввиду (1)  $T \cap S_{\mathcal{F}}/N \cap S_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$ . Поскольку  $\mathcal{F}$  –  $\sigma$ -множество Фишера группы  $G$ ,  $T \cap S_{\mathcal{F}} \in \mathcal{F}$ . Так как  $T \cap S_{\mathcal{F}} \trianglelefteq T$ , то определению  $\mathcal{F}$ -радикала группы  $T$  имеем  $T \cap S_{\mathcal{F}} \leq T_{\mathcal{F}}$ . Теперь, используя лемму 1.2, получаем равенство

$$T_{\mathcal{F}} \cap (T \cap S_{\mathcal{F}})N = (T \cap S_{\mathcal{F}})(N \cap S_{\mathcal{F}}).$$

Так как  $N \trianglelefteq T$ , то по лемме 1.3  $T_{\mathcal{F}} \cap N = N_{\mathcal{F}}$ . Следовательно,

$$T_{\mathcal{F}} \cap (T \cap S_{\mathcal{F}})N = (T \cap S_{\mathcal{F}})N_{\mathcal{F}}.$$

Очевидно,  $N_{\mathcal{F}} \leq T \cap S_{\mathcal{F}}$  и равенство (3) доказано.

$$(4) T/(T \cap S_{\mathcal{F}})N \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}.$$

Поскольку фактор  $\bar{T}/\bar{N} \in \mathfrak{N}_{\sigma_i}$  и класс  $\mathfrak{N}_{\sigma_i}$  является формацией, то по утверждению 2 леммы 1.1

$$(\bar{T}/\bar{N})/((T \cap S_{\mathcal{F}})N/N) \cong T/(T \cap S_{\mathcal{F}})N$$

и  $T/(T \cap S_{\mathcal{F}})N$  нильпотентная  $\sigma_i$ -группа. Ввиду теоремы Лангранжа, справедливо равенство

$$\begin{aligned} |T/(T \cap S_{\mathcal{F}})| &= \\ &= |T/(T \cap S_{\mathcal{F}})/((T \cap S_{\mathcal{F}})N/T \cap S_{\mathcal{F}})| \cdot \\ &\quad \cdot |(T \cap S_{\mathcal{F}})N/T \cap S_{\mathcal{F}}|. \end{aligned}$$

Следовательно, множество всех простых делителей  $\sigma_i$  является подмножеством множества всех простых делителей порядка группы  $T/(T \cap S_{\mathcal{F}})$ . Заметим, что, ввиду (2), факторгруппа  $T/(T \cap S_{\mathcal{F}})$  является нильпотентной  $\sigma_i$ -группой и поэтому  $\sigma_i \subseteq \sigma(\mathfrak{H})$ . Теперь, применяя лемму 1.6, получаем включение  $\mathfrak{N}_{\sigma_i} \subseteq \mathfrak{N}_{\sigma(\mathfrak{H})} \subseteq \mathfrak{H}$ , и поэтому  $T/(T \cap S_{\mathcal{F}})N \in \mathfrak{H}$ .

(5) *Заключительный шаг.*

Покажем, что  $T \in \mathcal{F} \odot \mathfrak{H}$ . Пусть:

$$\tilde{S} = T/T \cap S_{\mathcal{F}}, \bar{N}_1 = (T \cap S_{\mathcal{F}})N/T \cap S_{\mathcal{F}},$$

$\bar{N}_2 = T_{\mathcal{F}}/T \cap S_{\mathcal{F}}$ . Очевидно, что  $\bar{N}_1 \trianglelefteq \tilde{S}$  и  $\bar{N}_2 \trianglelefteq \tilde{S}$ . Рассмотрим пересечение

$$\bar{N}_1 \cap \bar{N}_2 = ((T \cap S_{\mathcal{F}})N / T \cap S_{\mathcal{F}}) \cap (T_{\mathcal{F}} / T \cap S_{\mathcal{F}}).$$

Ввиду (4), получаем

$$\begin{aligned} \bar{N}_1 \cap \bar{N}_2 &= ((T_{\mathcal{F}} \cap (T \cap S_{\mathcal{F}})N) / (T \cap S_{\mathcal{F}})) = \\ &= (T \cap S_{\mathcal{F}}) / (T \cap S_{\mathcal{F}}) = 1. \end{aligned}$$

Покажем, что фактор  $\tilde{S} / \bar{N}_1 \bar{N}_2$  нильпотентная группа. Действительно

$$\begin{aligned} \tilde{S} / \bar{N}_1 \bar{N}_2 &= \\ &= (T / T \cap S_{\mathcal{F}}) / ((T \cap S_{\mathcal{F}})N / (T \cap S_{\mathcal{F}})(T \cap S_{\mathcal{F}})) = \\ &= (T_{\mathcal{F}} / T \cap S_{\mathcal{F}}) / ((T \cap S_{\mathcal{F}})NT_{\mathcal{F}}) / (T \cap S_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

Поскольку в (3)  $T \cap S_{\mathcal{F}} \subseteq T_{\mathcal{F}}$ , по утверждению 2 леммы 1.1 получаем

$$\tilde{S} / \bar{N}_1 \bar{N}_2 = (T / T \cap S_{\mathcal{F}}) / (T_{\mathcal{F}}N / T \cap S_{\mathcal{F}}) \cong T / T_{\mathcal{F}}N$$

и  $\tilde{S} / \bar{N}_1 \bar{N}_2$  –  $\sigma_i$ -группа и группа  $\tilde{S} / \bar{N}_1 \bar{N}_2$  нильпотентная  $\sigma_i$ -группа.

Докажем, что  $\tilde{S} / \bar{N}_1$  является нильпотентной  $\sigma_i$ -группой. По утверждению 2 леммы 1.1 справедлив изоморфизм

$$\begin{aligned} \tilde{S} / \bar{N}_1 &= (T / T \cap S_{\mathcal{F}}) / ((T \cap S_{\mathcal{F}})N / (T \cap S_{\mathcal{F}})) \cong \\ &\cong T / (T \cap S_{\mathcal{F}})N. \end{aligned}$$

Но, ввиду (4),  $T / (T \cap S_{\mathcal{F}})N \in \mathfrak{H}$  и поэтому  $\tilde{S} / \bar{N}_1 \in \mathfrak{H}$ . Таким образом, все условия квази  $R_0$ -леммы выполняются. Теперь, ввиду (2),  $\tilde{S} \in \mathfrak{H}$  и по лемме 1.4 это равносильно тому, что  $\tilde{S} / \bar{N}_2 \in \mathfrak{H}$ . По утверждению 2 леммы 1.1 это означает, что

$$(T / T \cap S_{\mathcal{F}}) / (T_{\mathcal{F}} / T \cap S_{\mathcal{F}}) \cong T / T_{\mathcal{F}} \in \mathfrak{H}.$$

Следовательно,  $T \in \mathcal{F} \circ \mathfrak{H}$  и произведение  $\mathcal{F} \circ \mathfrak{H}$  является  $\sigma$ -множеством Фишера.  $\square$

В случае, если  $\sigma = \sigma^1 = \{\{2\}, \{3\}, \{5\}, \dots\}$ , мы получаем результат Н.Т. Воробьева и А.С. Войткевич, который приведем как

**Следствие 2.1** [5]. *Если  $\mathcal{F}$  – множество Фишера группы  $G$  и  $\mathfrak{X}$  – класс Фишера, то произведение  $\mathcal{F} \circ \mathfrak{X}$  является множеством Фишера группы  $G$ .*

### Заключение

В работе описывается метод построения  $\sigma$ -множеств Фишера конечной группы посредством произведения  $\sigma$ -множества Фишера и  $\sigma$ -класса Фишера.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Doerk, K. Finite soluble groups / K. Doerk, T. Hawkes. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1992.
2. Hartley, B. On Fischer's dualization of formation theory / B. Hartley // Proc. London Math. Soc. – 1969. – Vol. 3, № 2. – P. 193–207.
3. Lockett, F.P. On the theory of Fitting classes of finite soluble groups / F.P. Lockett. – Ph. D. thesis, University of Warwick, 1971.
4. Vorob'ev, N.T. On  $\mathcal{F}$ -injectors of Fitting set of a finite group / N.T. Vorob'ev, N. Yang, W. Guo // Comm. Algebra. – 2018. – Vol. 46, № 1. – P. 217–229.
5. Воробьев, Н.Т. О произведении множества Фишера конечной группы и класса Фишера / Н.Т. Воробьев, А.С. Войткевич // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2019. – № 3 (104). – С. 38–41.
6. Skiba, A.N. A generalization of a Hall theorem / A.N. Skiba // J. Algebra and Appl. – 2015. – Vol. 15, № 5. – P. 21–36.
7. Skiba, A.N. On  $\sigma$ -properties of Finite groups II / A.N. Skiba // Problems of Physics, Mathematics and Technics. – 2015. – № 3 (24). – P. 70–83.
8. Чу, Ч. О  $\Sigma_i^{\sigma}$ -замкнутых классах конечных групп / Ч. Чу, А.Н. Скиба // Украинский математический журнал. – 2018. – Т. 70, № 12. – С. 1707–1716.
9. Guo, W. On  $\sigma$ -local Fitting classes / W. Guo, L. Zhang, N.T. Vorob'ev // J. Algebra. – 2020. – Vol. 542, № 15. – P. 116–129.
10. Залесская, Е.Н. О произведениях классов Фишера / Е.Н. Залесская, С.Н. Воробьев // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2008. – № 3 (49). – С. 101–105.

Поступила в редакцию 12.01.2026.

### Информация об авторах

Воробьев Николай Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор  
 Воробьев Сергей Николаевич – к.ф.-м.н., доцент  
 Мехович Андрей Павлович – к.ф.-м.н.  
 Китаров Денис Андреевич – магистрант