

РЕДКИЕ, ОХРАНЯЕМЫЕ И ТЕ, ЧТО НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДЫ РАСТЕНИЙ В РАЗНЫХ ТИПАХ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Н. Лебедько

Наши исследования проводились на территории Кормянского лесничества Гомельского ПЛХО в апреле – сентябре 2004 г.

Цель исследований – определить места произрастания редких и охраняемых высших растений региона и их приуроченность к различным типам леса. Полевые исследования проводились маршрутным методом. Определение растений проводилось с использованием определителя высших растений Беларуси под редакцией В.И. Парфенова [1], типы леса по В.И. Саутину, П.Н. Райко, И.Д. Юркевичу [2, 3].

Всего было выявлено 20 видов растений – 19 сосудистых и 1 вид низших растений. Основное количество видов было обнаружено в 4 типах леса.

В черноольшаннике кочедыжниковом, расположенном в 2 км к северу от д. Кляпин Кормянского района, в понижении к ручью нами были обнаружены фиалка топяная (*Viola uliginosa*) и баранец обыкновенный (*Huperzia selago* L.). Данные виды растений произрастали разрозненно. Фиалка топяная образовала небольшие заросли (до 1% от общего проективного покрытия). Преобладали молодые и средневозрастные генеративные растения. Баранец обыкновенный образовал единичные куртины небольшого проективного покрытия.

Черноольшанник крапивный был расположен в 3 км к северу от черноольшанника кочедыжникового, на склоне к ручью у заболоченного берега. В изучаемом фитоценозе нами были обнаружены баранец обыкновенный (*Huperzia selago* L.), тайник яйцевидный (*Listera ovata* L.), пальчатокоренник пятнистый (*Dactylorhiza maculata* L.), волчегородник обыкновенный (*Daphne mezereum* L.), гнездовка настоящая (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.), хохлатка полая (*Corydalis bulbosa* L.), перелеска благородная (*Hepatica nobilis* Mill.), медвежий лук (*Allium ursinum* L.). Данные виды растений произрастали разрозненно за исключением медвежьего лука, который образовывал заросли. Преобладали средневозрастные генеративные растения. Баранец обыкновенный образовал единичные куртины в двух местах.

В 2 км к северо-западу от д. Кляпин в сосняке орляковом были собраны и описаны пыльцеголовник длиннолистный (*Cephalanthera longifolia* L.), дремлик широколистный (*Epipactis latifolia* All.), колокольчик персиколистный (*Campanula persicifolia* L.), любка двулистная (*Platanthera bifolia* (L.) Rich.). Данные виды растений произрастали разрозненно. Преобладали средневозрастные генеративные растения. Следует отметить что пыльцеголовник длиннолистный относится к исчезающим видам.

В ельнике дубняково-мшистом, расположенном в 6 км к юго-востоку от д. Кляпин нами были обнаружены наперстянка крупноцветковая (*Digitalis grandiflora* Mill.), водосбор обыкновенный (*Aquilegia vulgaris* L.). Преобладали вегетативные, молодые и средневозрастные генеративные растения которые встречались единично.

Ликоподиелла заливаемая (*Lycopodiella inundata* L.) была обнаружена на сыром грунтовом оголении в сосновом лесу.

Ирис сибирский (*Iris sibirica* L.) встречался в нескольких местах: на влажных лугах, на опушке соснового леса, на луговинах среди кустарников. Пальчатокоренник мясо-красный (*Dactylorhiza incarnata* L.) произрастал во многих местах на влажных лугах среди густого разнотравья; на заболоченном луге (среди болотно-луговой растительности); вдоль берега реки (довольно обильно, среди осок).

В притоке р. Сож (малая река Кляпинка) нами был обнаружен вид отдела красные водоросли – *Batrachospermum moniliforme* Roth. Данный вид ранее отмечался только на северо-западе Беларуси (оз. Нарочь). Водоросль встречалась на многих участках реки; чаще всего на открытых, хорошо освещенных местах с быстрым течением.

Таким образом, наши исследования показали довольно богатый спектр изучаемых растений. Нахождение довольно редких растений, выявление новых, ранее не отмеченных мест произрастания, показывает необходимость более детального исследования данного региона и проведения оценки состояния популяций этих видов для определения их жизнеспособности, чему и будут посвящены наши дальнейшие исследования.

1. Определитель высших растений Беларуси. /Под ред. В И Парфенова. – Мн.: Дизайн ПРО, 1999. – 472 с.

2. Саутин В.И., Райко П.Н. Определитель типов леса БССР. – Мн.: Государственное изд-во сельхоз. Литературы БССР, 1963. – 305 с.

3. Юркевич И.Д. Лесотипологические таблицы. Мн.: Наука и техника, 1969. – 52 с.