

Я. Г. БЕРКОВИЧ

# ПОДГРУППОВОЕ И НОРМАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ КОНЕЧНОЙ $p$ -ГРУППЫ

(Представлено академиком В. М. Глушковым 11 VI 1970)

1°. В структурной теории конечных  $p$ -групп центральное место занимает вопрос о существовании нормальных подгрупп экспоненты  $p$ . Известно, что если все нормальные подгруппы экспоненты  $p$  группы  $G$  имеют «малые» порядки, то  $G$  имеет несложное строение. Так, Ф. Холл (1) показал, что если  $p$ -группа  $G$  не содержит нормальной подгруппы порядка  $p^{p-1}$  и экспоненты  $p$ , то она регулярна. Глубокое обобщение этого результата получил Н. Блэкберн (2), давший полное описание  $p$ -групп без нормальных подгрупп экспоненты  $p$  и порядка  $p^2$ . Оказывается, что с рассматриваемым вопросом тесно связан вопрос о числе решений уравнения  $x^{p^n} = 1$  в  $p$ -группе (эту связь впервые подметил Ф. Холл (1)).

В настоящей заметке формулируется неформальное обобщение цитированной выше теоремы Блэкберна (теорема 1в); почти все результаты 2°, 3° выводятся из теоремы 1в. В 4° обобщается важная теорема Ч. Хоби, доказавшего, что если  $p$ -группа нечетного порядка содержит элементарную подгруппу порядка  $p^4$ , то она содержит нормальную элементарную подгруппу порядка  $p^4$  (6).

В заметке рассматриваются только конечные  $p$ -группы;  $p$  — всегда простое число;  $\Phi(G)$  — подгруппа Фраттини группы  $G$ ;  $p^{d(G)} = |G : \Phi(G)|$ ;  $|G|$  — порядок группы  $G$ ;  $p^i G = \langle x^{p^i} | x \in G \rangle$ ;  $\Omega_i(G) = \langle x | x \in G, x^{p^i} = 1 \rangle$ ;  $p$ -группа  $G$  абсолютно регулярна, если  $|G : pG| < p^p$  (абсолютно регулярные группы регулярны в смысле Ф. Холла; о регулярных  $p$ -группах см. в § 3.10 монографии (3)); группа  $G$  порядка  $p^m$ ,  $m > 1$ , и класса нильпотентности  $m - 1$  называется группой максимального класса (о  $p$ -группах максимального класса см. в § 3.14 монографии (3));  $c_n(G)$  — число циклических подгрупп порядка  $p^n$  в группе  $G$ .

Положим  $K_i(G) = G$ , для  $i > 0$  полагаем  $K_{i+1}(G) = [G, K_i(G)]$ .

2°. Лемма 1. Пусть  $G$  — группа максимального класса и порядка  $p^n$ .

а) Если  $H$  — подгруппа в  $G$  с  $d(H) > p - 1$  и  $p > 2$ , то  $G$  изоморфна силовой  $p$ -подгруппе симметрической группы степени  $p^2$ .

б) Если  $m > p + 1$ , то  $c_1(G) \equiv 1 + p + \dots + p^{p-2} \pmod{p^p}$ .

в) Если  $m > p + 1$ , то  $c_2(G) \equiv p^{p-2} \pmod{p^{p-1}}$ .

г) Если  $n > 2$ ,  $p > 2$ , то  $c_n(G) \equiv 0 \pmod{p^{p-1}}$ .

Лемма 1а) обобщает такой результат Блэкберна: если  $\varphi$  — эпиморфизм  $p$ -группы  $G$  максимального класса и нечетного порядка на силовскую  $p$ -подгруппу симметрической группы степени  $p^2$ , то  $\varphi$  — изоморфизм.

Теорема 1. Пусть  $p$ -группа  $G$  не абсолютно регулярна и не группа максимального класса. Тогда

а)  $c_1(G) \equiv 1 + p + \dots + p^{p-1} \pmod{p^p}$ ;

б) если  $n > 1$ , то  $c_n(G) \equiv 0 \pmod{p^{p-1}}$ ;

в)  $G$  содержит сравнимое с 1 по модулю  $p$  число подгрупп порядка  $p^p$  и экспоненты  $p$ .

Теорема 2. Пусть  $p$ -группа  $G$  не является группой максимального класса,  $n > p + 1$ . Тогда  $G$  содержит кратное  $p^2$  число подгрупп максимального класса и порядка  $p^n$ .



Ранее автор доказал теоремы 1 и 2 для 2-групп (<sup>4</sup>); см. также в (<sup>5</sup>) принадлежащую Дж. Томпсону теорему 6.2, в которой доказана теорема 1а) для 2-групп.

В. Г. Беркович, используя теоремы 1 и 2 (для частного случая 2-групп), доказал такой полезный результат:

**Теорема 3 (В. Г. Беркович).** Пусть группа  $G$  порядка  $p^n$  допускает автоморфизм порядка  $p^{n-1}$ . Тогда, если  $n > 3$ , справедливо одно из утверждений:

- 1)  $G$  — циклическая нечетного порядка;
- 2)  $G$  — обобщенная группа кватернионов,
- 3)  $G$  — группа диэдра.

**Теорема 4.** Пусть  $p$ -группа  $G$  не является группой максимального класса;  $H$  — такая ее подгруппа, что  $|H: pH| \geq p^{p-1}$ ;  $n > p + 1$ ;  $|H| < p^n$ . Тогда число заключенных между  $H$  и  $G$  подгрупп максимального класса и порядка  $p^n$  кратно  $p$ .

В ходе доказательства теоремы 4 используются представляющие некоторый интерес леммы.

**Лемма 2.**  $p$ -группа  $G$  тогда и только тогда является группой максимального класса, когда нормализатор некоторой ее подгруппы является группой максимального класса.

**Лемма 3.** Пусть  $H$  — такая подгруппа  $p$ -группы  $G$ , что  $|H: pH| = p^{p-1}$ ;  $G$  не абсолютно регулярна и не группа максимального класса;  $p^n > |H|$ . Тогда между  $H$  и  $G$  содержится кратное  $p$  число абсолютно регулярных подгрупп порядка  $p^n$ .

**Лемма 4.** Пусть  $p$ -группа  $G$  не абсолютно регулярна и не группа максимального класса,  $n > p - 1$ . Тогда  $G$  содержит кратное  $p$  число абсолютно регулярных подгрупп порядка  $p^n$ .

Очевидно, лемма 4 обобщает теорему 1в).

Одним из применений теоремы 1в) является теорема 5, дающая прозрачное описание широкого класса  $p$ -групп.

**Теорема 5.** Пусть подгруппа Фраттини  $p$ -группы  $G$  абсолютно регулярна. Положим  $\Omega_1(\Phi(G)) = \Phi_0$ ,  $|\Phi_0| = p^k$  (так что  $k < p$ ). Тогда  $G = AB$ , при этом:

1)  $\Phi(G) \leq B$  и  $B$  абсолютно регулярная или нерегулярная группа максимального класса;

2)  $A$  порождена  $\Phi_0$  и всеми содержащими  $\Phi_0$  и нормальными в  $G$  подгруппами порядка  $p^{k+1}$  и экспоненты  $p$ ;

3) если  $B$  нерегулярна, то она максимального класса и  $p = k + 1$ .

3°.  $p$ -группу  $G$  назовем  $R_n^k$ -группой, если для любых двух ее неинцидентных подгрупп  $H$  и  $F$  индексов  $p^n$  и  $p^{n+k}$  в  $G$  соответственно их пересечение  $H \cap F$  абсолютно регулярно. Абсолютно регулярные  $p$ -группы, а также  $p$ -группы порядка, меньшего  $p^{n+k+p+1}$ , назовем тривиальными  $R_n^k$ -группами. Если в определении  $R_n^k$ -групп вместо абсолютной регулярности подставить циклическость, то получим  $I_n^k$ -группы (см. (<sup>4</sup>)). Множество всех  $R_n^k$ -групп обозначим  $R_n^k$ .

**Теорема 6.** Пусть  $G$  — нетривиальная  $R_n^0$ -группа. Тогда справедливо одно из утверждений:

1)  $|\Omega_1(G)| = p^p$  и факторгруппа  $G|\Omega_1(G)$  циклическая;

2)  $G$  — группа максимального класса;

3)  $p = 2$ ,  $n = 1$ ,  $G = \langle a, b | a^{2^{n+1}} = b^8 = b^{-4}a^{2^n} = 1, a \cdot a^b = a^{i \cdot 2^n}, i = 0, 1 \rangle$ .

**Теорема 7.**  $R_n^1 = R_{n+1}^0$ .

**Теорема 8.** Пусть  $G$  — нетривиальная  $R_n^2$ -группа. Тогда справедливо одно из утверждений:

1)  $n = 1$ ,  $p = 2$ ;  $\Omega_1(G)$  имеет порядок 4 или 8 и лежит в  $\Phi(G)$ ; в первом случае  $G|\Omega_1(G)$  метациклическая порядка 16 и экспоненты 4, во втором случае  $G|\Omega_1(G)$  — обычная группа кватернионов. В оставшихся четырех случаях  $\Omega_1(G)$  имеет порядок  $p^p$ ;



- 2)  $G|\Omega_1(G)$  метациклическая порядка  $p^4$  и экспоненты  $p^2$ ;
- 3)  $p=3, n=1, 2; G|\Omega_1(G)$  — группа максимального класса и порядка  $3^{n+3}$  с четырьмя подгруппами порядка 3;  $\Omega_1(G) < \Phi(G)$ ;
- 4)  $p=2, n=1, G|\Omega_1(G) - R_2^0$ -группа порядка 32 без циклической подгруппы индекса 2;  $G$  метациклическая;
- 5)  $p=2, n=2, G|\Omega_1(G)$  — минимальная неметациклическая группа порядка 32.

Из теоремы 8 легко получается описание  $I_n^2$ -групп. Очевидно, в классе 2-групп справедливо равенство  $R_n^k = I_n^k$ . Поэтому достаточно найти  $I_n^2$ -группы нечетного порядка. Оказывается, что последние исчерпываются  $I_{n+2}^0$ -группами и метациклическими группами порядка  $p^6$  и экспоненты  $p^3$ .

Напомним, что абелева  $p$ -группа называется специальной, если ее центр элементарен и совпадает с коммутантом и подгруппой Фраттини. Специальная  $p$ -группа с центром порядка  $p$  называется экстраспециальной (о специальных и экстраспециальных  $p$ -группах см. § 3.13 книги (3)).

Теорема 9 обобщает теорему Блэкберна о минимальных неметациклических  $p$ -группах.

Теорема 9. Пусть  $p$ -группа  $G$  такова, что для любых ее нециклических подгрупп  $H$  и  $F$  равных порядков имеем  $d(H) = d(F)$ . Тогда справедливо одно из утверждений:

- 1)  $|G| < p^5$ ;
- 2)  $G$  элементарна;
- 3) все собственные подгруппы группы  $G$  метациклические;
- 4)  $G$  экстраспециальная порядка 32;
- 5)  $G$  специальная порядка 64 с центром порядка 4. Все максимальные подгруппы группы  $G$  минимальные неметациклические и поэтому изоморфны;
- 6)  $G$  — 3-группа максимального класса.

4°. В теории простых групп важные приложения находят  $p$ -группы с «малыми» абелевыми нормальными подгруппами. Значение этих групп особенно отчетливо проявилось в последних работах Дж. Томпсона. Первые результаты в этом направлении получили П. Рокетт, описавший все  $p$ -группы без нормальных подгрупп типа  $(p, p)$  (см. § 3.7 в (3)), и Н. Блэкберн, описавший все  $p$ -группы нечетного порядка без нормальных подгрупп типа  $(p, p, p)$  (см. (2)). Отметим, что до сих пор полностью не классифицированы 2-группы без нормальных подгрупп типа  $(2, 2, 2)$ . Полезную информацию о таких группах дает

Теорема 10. Пусть  $H$  — нормальная подгруппа 2-группы  $G$ , при этом  $H$  не содержит  $G$ -допустимой подгруппы типа  $(2, 2, 2)$ . Предположим, что  $H$  нециклическа и не группа максимального класса. Если  $H$  содержит  $G$ -допустимую абелеву подгруппу  $A$  типа  $(4, 4)$ , то централизатор  $A$  в  $H$  метациклическа. Если же  $H$  не содержит такой подгруппы, как  $A$ , то  $H$  содержит  $G$ -допустимую абелеву подгруппу  $B$  типа  $(4, 2)$ , и централизатор  $B$  в  $H$  содержит циклическую подгруппу индекса 2. В частности, производная длина группы  $H$  не превосходит четырех.

В (7) анонсировано такое обобщение теоремы Блэкберна: в  $p$ -группе нечетного порядка число подгрупп типа  $(p, p, p)$  равно 0 или сравнимо с 1 по модулю  $p$ . Более глубокий результат содержит

Теорема 11. В  $p$ -группе нечетного порядка число элементарных подгрупп порядка  $p^4$  равно 0 или сравнимо с 1 по модулю  $p$ .

Теорема 11 обобщает цитировавшийся во введении результат Хоби.

5°. В этом параграфе мы сформулируем две теоремы, дающие новые характеристики  $p$ -групп максимального класса достаточно больших порядков.

Теорема 12. Пусть группа  $G$  порядка  $p^m$  не является группой максимального класса,  $p+1 < n < m$ . Тогда  $G$  содержит кратное  $p$  число нормальных делителей  $D$  индекса  $p^n$  таких, что  $G/D$  максимального класса.

Теорема 13. Пусть фактор-группа  $G/p^2G \cdot K_{p+2}(G)$  максимального класса. Тогда справедливо одно из утверждений:



1) подгруппа  $pG$  циклическа и  $|G/pG| \leq p^2$ ;

2)  $G$  — группа максимального класса.

Заметим, что при доказательстве теоремы 1 автор существенно использовал цитированную во введении теорему Блэкберна, а также построенную Блэкберном теорию  $p$ -групп максимального класса. Эти же результаты он использовал в ходе доказательства теорем 2, 12 и 13.

6°. Дж. Альперин <sup>(8)</sup> предположил, что для фиксированного  $n$  и достаточно большого  $p$  все  $p$ -группы  $G$  обладают следующим свойством:

( $\mathfrak{A}_n$ ). Если  $G$  содержит абелеву подгруппу индекса  $p^n$ , то она содержит нормальную абелеву подгруппу того же индекса. В связи с этим предположением интерес представляет следующая

Теорема 14. Если  $p > 3$ , то существует группа порядка  $p^{1+2p}$ , не удовлетворяющая ( $\mathfrak{A}_{\frac{1}{2}(p+3)}$ ). Существует группа порядка  $3^{10}$ , не удовлетворяющая ( $\mathfrak{A}_4$ ).

В частности, теорему Альперина из <sup>(8)</sup> нельзя улучшить для  $p < 7$ .

7°. Теорема 15 обобщает основную теорему из <sup>(9)</sup> (см. также лемму в <sup>(7)</sup>).

Теорема 15. Пусть  $A < A_1$  — абелевы подгруппы одинаковой экспоненты  $p^n > 2$  в произвольной конечной группе  $G$ . Тогда между  $A$  и  $G$  содержится сравнимое с 1 по модулю  $p$  число абелевых подгрупп экспоненты  $p^n$  и порядка  $p|A|$ .

8°. Теорема 16 полезна при рассмотрении 2-групп с двумя образующими.

Теорема 16. В неметациклической 2-группе с двумя образующими число максимальных подгрупп с двумя образующими всегда четно.

Ростовский инженерно-строительный  
институт

Поступило  
4 VI 1970

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> P. Hall, Proc. London Math. Soc., 36, 468 (1936). <sup>2</sup> N. Blackburn, Proc. London Math. Soc., 11, 1 (1961). <sup>3</sup> B. Huppert, Endliche Gruppen, I, 1967. <sup>4</sup> Я. Г. Беркович, Сиб. матем. журн., 9, 6, 1284 (1968). <sup>5</sup> T.-Y. Lam, J. Algebra, 9, 1, 94 (1968). <sup>6</sup> C. Hobby, Pacific J. Math., 12, 4, 1343 (1962). <sup>7</sup> Я. Г. Беркович, ДАН, 187, № 3, 499 (1969). <sup>8</sup> J. L. Alperin, Trans. Am. Math. Soc., 117, 10 (1965). <sup>9</sup> J. L. Alperin, J. Algebra, 1, 110 (1964).