

В. Л. СУДАКОВ

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИТОХРОМНОЙ СИСТЕМЫ  
В ЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКАХ ГОРОХА ПРИ ДЕЙСТВИИ  
ДЛИТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРАСНЫМ СВЕТОМ**

(Представлено академиком А. Л. Курсановым 7 IV 1976)

Объектом для спектрофотометрического исследования динамики фитохрома ( $P$ ) обычно служат этиолированные проростки различных растений (<sup>1</sup>, <sup>2</sup>). Это удобный материал для изучения последствий воздействия на фитохромную систему кратковременных (минуты) всплесков света. Выяснение действия более длительного облучения на  $P$  затруднено из-за интенсивного образования хлорофилла, маскирующего максимум поглощения  $P$  в области 660 нм. По этой причине исследование динамики изменения содержания  $P$  в тканях растений возможно только в течение нескольких первых часов облучения, максимальная длительность которого определяется чувствительностью спектрофотометрической установки. Такое исследование было проведено на этиолированных проростках гороха сорта Неистошмий.

Методики выращивания проростков и приготовления образцов описаны ранее (<sup>3</sup>). Количественная оценка содержащегося в тканях растений общего фотообратимого фитохрома  $P = P_{FR} + P_R$  и активной формы  $P_{FR}$  проводилась с использованием двухдлинноволнового дифференциального спектрофотометра (<sup>4</sup>) методом трех отсчетов. Суть этого метода состоит в трех последовательных измерениях разности в оптической плотности материала  $\Delta OD = OD_{730} - OD_{660}$ , где  $OD_{730}$  и  $OD_{660}$  — оптическая плотность исследуемых тканей при  $\lambda = 730$  и  $\lambda = 660$  нм;  $n_1 \sim \Delta OD_1$  — показания выходного прибора спектрофотометра без облучения кюветы с образцом,  $n_2 \sim \Delta OD_2$ ,  $n_3 \sim \Delta OD_3$  отсчеты после облучения образца ДК и К светом соответственно (<sup>4</sup>, <sup>5</sup>). Значение  $P_{FR}$  определяются как  $P_{FR} \sim n_2 - n_1$ , а  $P \sim n_2 - n_3$ . Облучение проростков проводилось в контролируемых температурных условиях. Источник К (красного) света был изготовлен из восьми 15-ваттных люминесцентных ламп в комбинации со светофильтром, состоящим из двух слоев красной ацетатной пленки, красного стекла типа КС-13 и 1 см слоя раствора 2%  $\text{CuCl}_2$  в 10%  $\text{HCl}$ . Доля длинноволнового ( $\lambda > 700$  нм) излучения такого источника не превышает 1%. Интенсивность света в ходе эксперимента варьировалась нейтральными пленками.

Экспериментальные кривые, отражающие изменение содержания  $P$  и  $P_{FR}$  в тканях этиолированных проростков гороха сорта Неистошмий при действии длительного облучения К светом при температуре 26° и  $I_1 = 0,072$ ,  $I_2 = 0,045$  и  $I_3 = 0,017$  Вт/м<sup>2</sup> приведены на рис. 1.

Для анализа полученных экспериментальных результатов использовалась система уравнений, предложенная для описания динамики фитохромной системы при действии света произвольного спектрального состава (<sup>5</sup>).

$$\begin{aligned} \dot{P} &= \alpha(P_{OR} - P) - (\beta_2 - \alpha)P_{FR}; \\ \dot{P}_{FR} &= \Phi_1 P - (\Phi_1 + \Phi_2 + \beta_1 + \beta_2)P_{FR}, \end{aligned}$$

где  $\alpha$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  — соответственно константы скоростей ресинтеза (новообразования)  $P$  — реверсии  $P_{FR} \rightarrow P_R$  и деструкции  $P_{FR}$ , а  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  — функционалы

вида  $\Phi_{1,2} = k \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} I(\lambda) \sigma_{1,2}(\lambda) d\lambda$ , определяющие количество лучистой энергии, поглощенной данной формой фитохрома, и динамику фотохимической реакции конверсии  $P_{FR} \rightleftharpoons P_R$ . Принимая во внимание, что экспериментально измеренные зависимости  $P(t)$  и  $P_{FR}(t)$  не зависят от новообразования, поскольку минимальный уровень измеренного  $P$  выше  $P_{кр}$ , при котором включается процесс ресинтеза  $P_R$  (<sup>6</sup>, <sup>7</sup>), решение системы уравнений при начальных условиях  $P_{FR}|_{t=0}=0$ ;  $P|_{t=0}=P_{max}=P_0$  записывается в виде

$$P = \frac{P_0}{k_2 - k_1} (k_2 l^{-k_1 t} - k_1 l^{-k_2 t}); \quad P_{FR} = \frac{P_0 k_1 k_2}{\beta_2 (k_2 - k_1)} (l^{-k_1 t} - l^{-k_2 t}).$$

Значения констант  $\beta_1$  и  $\beta_2$  определены из специальной серии экспериментов и равны  $\beta_1 = 0,35 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1}$ ,  $\beta_2 = 1,85 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1}$ . Значения  $\Phi_1^{(2)}$  и  $\Phi_2^{(2)}$  при действии света с  $I_2 = 0,045 \text{ Вт/м}^2$  рассчитывались из соотношений




Рис. 1. Изменение содержания  $P$  и  $P_{FR}$  в тканях этиолированных проростков гороха при действии облучения красным светом: а —  $I = 0,072 \text{ Вт/м}^2$ , б —  $I = 0,045 \text{ Вт/м}^2$ , в —  $I = 0,017 \text{ Вт/м}^2$

$\Phi_1 = k_1 k_2 / \beta_2$ ;  $\Phi_2 = k_1 + k_2 - \Phi_1 - \beta_1 - \beta_2$ . Необходимые для расчета величины  $k_1$  и  $k_2$  определялись из экспериментальных кривых  $P_{FR}(t)$  или  $P(t)$  (рис. 1).

Значения  $\Phi_1^{(1,3)}$  и  $\Phi_2^{(1,3)}$  для  $I_1 = 0,072$  и  $I_3 = 0,017 \text{ Вт/м}^2$  были определены расчетом из условия пропорциональности значения  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  интенсивности облучающего потока при его неизменном спектральном составе

$\Phi_{1,2}^{(1,3)} = \Phi_{1,2}^{(2)} I_{1,3} / I_2$ . В результате найдены следующие значения  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ :

$$I_2 = 0,045 \text{ Вт/м}^2, \quad \Phi_1^{(2)} = 1,17 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1}, \quad \Phi_2^{(2)} = 1,04 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1};$$

$$I_1 = 0,078 \text{ Вт/м}^2, \quad \Phi_1^{(1)} = 1,88 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1}, \quad \Phi_2^{(1)} = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1};$$

$$I_3 = 0,017 \text{ Вт/м}^2, \quad \Phi_1^{(3)} = 0,45 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1}, \quad \Phi_2^{(3)} = 0,4 \cdot 10^{-2} \text{ мин}^{-1}.$$

Построенные с использованием рассчитанных значений  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  зависимости  $P_{FR}(t)$  и  $P(t)$ , обозначенные на рис. 1а, б, в знаком (+), сравнивались с экспериментально снятыми кривыми  $P_{FR}(t)$  и  $P(t)$ . Ориентируясь на близкое совпадение вычисленных зависимостей  $P_{FR}(t)$  и  $P_{общ}(t)$  для случая длительного облучения этиолированных проростков гороха К светом с экспериментально снятыми кривыми  $P_{FR}(t)$  и  $P(t)$  для всех трех используемых в эксперименте интенсивностей К света, по-видимому, можно считать, что динамика фитохромной системы при непрерывном

(до 9 час.) воздействию К светом низкой интенсивности определяется двумя фотохимическими процессами: фотоконверсией  $P_{FR} \rightleftharpoons P_R$  и двумя нефотохимическими процессами — реверсией  $P_{FR} \rightarrow P_R$  и деструкцией  $P_{FR}$ .

Агрофизический научно-исследовательский  
институт ВАСХНИЛ  
Ленинград

Поступило  
5 IV 1976

#### ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> W. S. Hillman, Ann. Rev. Plant Physiol., v. 18, 301 (1967). <sup>2</sup> H. Furuya, W. S. Hillman, Planta, v. 63, 1, 31 (1964). <sup>3</sup> В. Л. Судаков, Бюлл. научно-технич. информ. по агрономической физике, № 14, Л., 1970, стр. 23. <sup>4</sup> В. Л. Судаков. Сб. тр. по агрономической физике, в. 21, 1970, Л., стр. 114. <sup>5</sup> Л. Я. Фукишанский. Сб.: Колебательные процессы в биологических и химических системах, М., 1967, стр. 384. <sup>6</sup> D. P. Clarkson, W. S. Hillman, Nature, v. 213, 5075, 468 (1967). <sup>7</sup> В. Л. Судаков, ДАН, т. 206, № 5, 1250 (1972).