

С. И. БЕЙЛИН, С. Б. ГОЛЬШТЕЙН, академик Б. А. ДОЛГОПОЛОС

**ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНОГО ТИТАНА
ПРИ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИИ СОЕДИНЕНИЙ
ТРЕХВАЛЕНТНОГО ТИТАНА**

Ранее ⁽¹⁾ была показана возможность получения стабильного соединения TiR_4 при взаимодействии $TiCl_4$ с триметилсилилметиллитием (LiR) или $RMgCl$. В работе ⁽²⁾ эта реакция была использована для получения стабильных органогалогенпроизводных четырехвалентного титана общей формулы R_nTiHal_{4-n} . Представлялось важным изучить возможность синтеза металлоорганических соединений трехвалентного титана при взаимодействии LiR с треххлористым титаном. Реакцию проводили в реакторе с магнитной мешалкой, вводя гексановый раствор LiR в суспензию $TiCl_3$ в толуоле; LiR получали по методу ⁽³⁾, $TiCl_3$ — восстановлением $TiCl_4$ литийалкилом. Все операции проводили в условиях, исключавших попадание в систему кислорода и влаги.

При соотношении $LiR/TiCl_3 < 3$ следовало ожидать образования смешанных металлоорганических производных трехвалентного титана, содержащих один и два атома хлора, а при избытке LiR — образования TiR_3 . Однако исследование состава образующихся продуктов показало, что в обоих случаях образуются только соединения TiR_4 и TiR_2 . При недостатке LiR в раствор переходит только TiR_4 , а TiR_2 остается в осадке. При избытке LiR TiR_2 также переходит в раствор, по-видимому, вследствие образования комплексов TiR_2 с LiR .

В табл. 1 приведены данные по изучению состава образующихся соединений при мольном соотношении $LiR/TiCl_3 = 1,5$. В этом случае реагировал весь LiR . Ионы хлора в растворе отсутствовали. Состав продуктов определяли раздельно в растворе и в осадке. Титан определяли трилонометрически ⁽⁴⁾.

Для количественного определения соотношения R/Ti после удаления растворителя испарением в вакууме вводили обескислороженный 5% водный раствор серной кислоты. Хроматографически показано, что выделяющийся при этом газ содержит только тетраметилсилан (TMS). Полученное соотношение TMS/Ti (см. табл. 1) свидетельствует об образовании TiR_4 . Это подтверждается спектрами я.м.р., которые идентичны ранее полученным ⁽¹⁾ для TiR_4 . При разложении осадка разбавленной серной кислотой выделяется смесь газов, которая, по данным масс-спектрометрии, состоит из TMS и H_2 . Количество TMS определяли хроматографически. Количество H_2 определяли волюмометрически после конденсации TMS. Количество двухвалентного титана определяли по содержанию водорода. Из полученных данных следует, что в осадке находится TiR_2 . В осадке содержатся также $LiCl$ и непрореагировавший $TiCl_3$, количество которых рассчитывали из данных по общему содержанию титана и хлора и по выходу водорода.

При соотношении $LiR/TiCl_3 = 10$ почти весь титан переходит в раствор (табл. 2). При этом в растворе остается непрореагировавший LiR , содержание которого определяли титрованием кислотой; ионы хлора в растворе отсутствуют. После удаления в вакууме при комнатной температуре рас-

Таблица 1

Состав продуктов реакции при исходном соотношении $\text{LiR}/\text{TiCl}_3=1,5$

$t, ^\circ\text{C}$	Продолжительность реакции, час.	Исходное количество Ti , ммол.	TiR_4 в растворе, ммол.	Состав продуктов после разложения, ммол.				
				раствора TMC/Ti	осадка			
					H_2	Ti(II)	$\text{TMC}/\text{Ti(II)}$	TiCl_3
20	2	1,0	0,26	3,9	0,14	0,28	2,1	0,45
20	2	0,8	0,18	4,05	0,1	0,20	2,2	0,40
20	2	0,8	0,20	—	0,09	0,18	2,0	0,40
-30	4	2,0	0,51	—	—	—	—	—

Таблица 2

Состав (в ммол.) продуктов реакции при исходном соотношении $\text{LiR}/\text{TiCl}_3=10$ и 20°C

Исходное количество Ti	$\text{Ti}_{\text{общ}}$ (раствор)	LiR (раствор)	Ti^{2+} (раствор)	Выделившийся H_2	Ti (осадок)
0,5	0,47	3,3	0,22	0,11	0,04
0,6	0,6	3,9	—	—	0,02

творителя (из профильтрованного раствора) остаток разлагали разбавленной серной кислотой. Количество TiR_2 , рассчитанное по количеству выделившегося водорода, составляет 47% от общего содержания титана; остальное, по данным я.м.р., составляет TiR_4 .

Авторам работы ⁽⁵⁾ при использовании в качестве комплексообразователя триэтиламина и более объемного лиганда $\text{R}'-\text{CH}[\text{Si}(\text{CH}_3)_2]$ удалось получить соединение TiR_3' с выходом 5%. Нами установлено, что при использовании в качестве растворителя тетрагидрофурана реакция TiCl_3 с $\text{LiCH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ протекает так же, как в углеводородной среде, и не приводит к образованию металлоорганических соединений трехвалентного титана. Нами был синтезирован $\text{Ti}[\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3]_3$, минуя стадию образования органотитанхлоридов. Это соединение оказалось стабильным в углеводородных растворителях при обычной температуре. Этот факт, а также приведенные данные свидетельствуют о том, что диспропорционирование трехвалентного титана происходит, по-видимому, на стадии образования галоорганопроизводных.

Институт нефтехимического синтеза
Академии наук СССР
Москва

Поступило
4 II 1976

ЛИТЕРАТУРА

- ¹ M. R. Collier, M. F. Lappert, R. Pearce, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1973, 445.
² С. И. Бейлин, Г. Н. Бондаренко и др., ДАН, т. 218, 1347 (1974). ³ H. L. Liwis, T. L. Brown, J. Am. Chem. Soc., v. 92, 4664 (1970). ⁴ Р. Прибл, Комплексоны в химическом анализе, ИЛ, 1960. ⁵ G. K. Barker, M. F. Lappert, J. Organomet. Chem., v. 76, 45 (1974).